

VARIANTA A

- 1) Pro foramen humerotricipitale neplatí:
- a) horní ohraničení tvoří m. teres minor
 - b) mediální ohraničení tvoří humerus a jeho svaly
 - c) obsahem je vasa circumflexa humeri posterior a n. axillaris
 - d) náleží do regio scapularis
 - e) žádná odpověď nevyhovuje

2) Doplňte:

Za mediálním kotníkem procházejí struktury následovně: m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, _____, n. tibialis, _____.

VARIANTA B

- 1) Pro foramen infrapiriforme neplatí:
- a) kraniální ohraničení tvoří m. piriformis
 - b) vystupuje zde n. gluteus inferior
 - c) vystupuje zde n. pudendus
 - d) vystupuje zde n. cutaneus femoris lateralis
 - e) žádná odpověď nevyhovuje

2) Doplňte:

Skrze foramen omotricipitale prochází _____. Nervus suprascapularis prochází _____ ligamentum transversum scapulae.

VARIANTA C

- 1) Pro fossa poplitea neplatí:
- a) vena saphena magna se zde zanořuje do vena poplitea
 - b) kaudální ohraničení tvoří m. gastrocnemius
 - c) kraniální ohraničení tvoří svaly zadní strany stehna
 - d) jejím obsahem je také n. tibialis
 - e) žádná odpověď nevyhovuje

2) Doplňte:

Hlavním obsahem trigonum suboccipitale je _____ a _____.

VARIANTA D

- 1) Pro trigonum deltoideopectorale (clavipectorale) neplatí:
- a) na jeho ohraničení se podílí m. pectoralis major
 - b) do hloubky se zde zanořuje v. cephalica
 - c) na povrch zde proráží a. thoracoacromialis
 - d) na jeho ohraničení se podílí clavicula
 - e) žádná odpověď nevyhovuje

2) Doplňte:

Za laterálním kotníkem prochází v. saphena parva, _____ a _____.

VARIANTA E

- 1) Pro lacuna vasorum neplatí:
- a) prochází zde vasa femoralia
 - b) kraniální ohraničení tvoří ligamentum inguinale
 - c) prochází zde r. genitalis n. genitofemoralis
 - d) leží zde lymphonodus Cloqueti
 - e) žádná odpověď nevyhovuje

2) Doplňte:

Kaudální ohraničení trigonum lumbale Petiti tvoří _____. Jeho spodinu tvoří _____.

VARIANTA F

- 1) Pro lacuna muscularorum neplatí:
- a) hlavním obsahem je m. iliopsoas
 - b) prochází zde nervus femoralis
 - c) leží laterálněji než lacuna vasorum
 - d) prochází zde r. femoralis n. genitofemoralis
 - e) žádná odpověď nevyhovuje

2) Doplňte:

Senzitivní inervaci laterální části předloktí obstarává n. cutaneus antebrachii lateralis, což je pokračování _____. Zadní stanu předloktí pak senzitivně inervuje _____, větev z n. radialis.