

Životní prostředí

Pro 2. semestr studia lékařství

Mgr Aleš Peřina, PhD., Doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Ústav ochrany a podpory zdraví

8. února 2016

- ▶ Vnější prvky a podmínky, které obklopují člověka a vytvářená podmínky pro život a vývoj jedince nebo populace (*MeSH*)
- ▶ Člověk a prostředí vytvářejí dynamický systém
- ▶ Neustálá interakce vytváří podmínky a příležitosti pro ochranu a tvorbu životního prostředí jak v pozitivním tak i negativním smyslu

Vztah mezi životním prostředím a zdravím

Podíl životního prostředí na nemocech

Na celkové úmrtnosti se faktory ŽP podílejí cca z 20 %, s rozptylem 14 – 54.

Důvod se tím zabývat

HDI Evropy v posledních letech stagnuje a je to spojováno s nižší ochranou životního prostředí

Nízké příjmy

Zvyšují rizika z faktorů životního prostředí až 5x

HDI = Human Development Index = index, snažící se do jednoho čísla integrovat délku života, zdraví, znalosti a životní úroveň

Motivace pro lékaře

Definice zdraví WHO, 1948

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody (wellbeing), nejen stav nepřítomnosti nemoci nebo vady.

Program „Zdraví 2020“

Zdraví nevzniká v nemocnicích, ale všude tam, kde lidé žijí a pracují, odpočívají a stárnou. Úlohou lékařů je nejen léčit nemoci, ale i připomínat hodnotu zdraví, posilovat je, rozvíjet a chránit

Primární prevence

Je disciplína, která se zabývá vytvářením a upevňováním zdraví, charakterizovaná především komunitním zaměřením

Nebezpečí × riziko

Nebezpečí

Charakterizuje vlastnosti škodliviny. Příklady:

- ▶ Mikroorganismus je patogenní
- ▶ Chemická látka má toxické účinky
- ▶ Záření vyvolává tvorbu volných radikálů ve tkáních

Riziko

Je funkcí nebezpečí

- ▶ určuje pravděpodobnost (v případě kladných změn šanci) změny zdravotního stavu
- ▶ závisí na kvalitě a kvantitě expozice lidí faktoru (i vlivech práce, životního stylu apod.) i vlastnostech jedinců (věk, pohlaví, fyziologický stav, přítomnost chorobných procesů)
- ▶ matematicky se vyjadřuje jako **p** na škále
 - ▶ 0 – 1
 - ▶ 0 % – 100 %

Příčiny vzniku chorob

Rozeznáváme

- vnitřní** vlastnosti člověka od dědičné informace, i část memů atd. až po rezidua po prodělaných chorobách a úrazech
- zevní** co na člověka působí z jeho okolí (bezprostředního až extrémně vzdáleného – např. kosmické záření), které se dělí na dvě skupiny faktorů
 - ▶ životního prostředí
 - ▶ životního stylu

Poznámka

Je třeba si uvědomit, že toto je „pedagogicky analytické“ rozdělení, v praxi některé složky takto „učebnicově“ oddělit nelze.

V současné době budeme probírat životní prostředí, životním stylem a dalšími faktory se budeme zabývat ve vyšších ročnících.

Vymezení životního prostředí

- ▶ Vnější prvky a podmínky, které obklopují člověka a vytvářejí podmínky pro život a vývoj jedince nebo populace
- ▶ Člověk a prostředí vytvářejí dynamický systém
- ▶ Neustále spolu interagují a do těchto interakcí zapadá i vznik rizik na straně jedné a příležitostí životní prostředí zlepšit na straně druhé

Dělení životního prostředí

Vymejujeme je podle *složek* a podle *faktorů*

Vymezení složek životního prostředí

▶ Přírodní

- ▶ Ovzduší, voda, půda
- ▶ Živé organismy

Abiogenní a biogenní složky se prolínají a vzájemně oboustranně ovlivňují (viz např. složení půdy a složení mikroflóry v ní i rostlin na ní rostoucí)

▶ Antropogenní a sociální

Vzniká infrastruktura, vytvářející *funkční celek* z pohledu lidí, jako jsou sídla, města, obytné zóny, rekreační oblasti, nákupní centra, průmysl, dopravní stavby apod.

Vymezení faktorů životního prostředí

▶ Fyzikální (hluk, termický komplex, záření ...)

▶ Chemické

- ▶ kontaminující látky, záměrně přidávané látky
- ▶ zdroje – technologie, průmysl, potravinářství, farmacie, ale také přírodní faktory, ovlivněné člověkem (mykotoxiny ve špatně obhospodařovaných plodinách, i pouhé nahromadění velkého množství lidí na jednom místě a problémy např. s ženskými hormony v moči)

▶ Biologické

- ▶ priony
- ▶ viry
- ▶ bakterie
- ▶ jednobuněčná eukaryota
- ▶ mnohobuněčné organismy (od plísní po synantropní živočichy, též problematika zavlečených, invazivních, druhů)

Faktory poškozující zdraví

Přehled

▶ Fyzikální

- ▶ Hluk (a vibrace)
- ▶ Záření
- ▶ Další

▶ Chemické

- ▶ Z hlediska individua
- ▶ Z hlediska prostředí a jeho vlivů na zdraví

▶ Biologické

▶ Psychosociální

Co je to hluk

Fyzikální definice

Chvění vzduchu, případně jiného média, které se může přenést na sluchový aparát člověka = **zvuk**


Vznik

Chvěním pevných těles + přenosem na další média

Oprava na subjektivitu

Hluk je zvuk, který je vnímán negativně; poškozuje zdraví (to druhé nemusí 100% platit)

Fyzikální charakteristika



Měření intenzity

- ▶ Primárně se jedná o **tlak** zvukových vln na předměty
- ▶ Měří se v decibelech, existují i další (ne běžné) jednotky, které zohledňují různou citlivost ucha pro různé vlnové délky
- ▶ Lze měřit **aktuální hladinu** hluku (hlukoměr) a lze měřit **vážený průměr** (hlukoměr + hlukový dozimetr), na ten jsou stanoveny normy

Příklady intenzity

- kapající voda 10 dB
- lidský hlas 40 – 50 dB
- limit pracovní prostředí 85 dB
- školní tělocvična 90 – 100 dB
- techno hudba 110 dB
- letecké motory 130 dB
- práh bolesti 150 dB

Typy podle trvání

- ▶ ustálený
- ▶ proměnlivý
- ▶ pulsní

Proč rozlišujeme

Ochrana vnitřního ucha reflexním napětím MUSCULUS STAPEDIUS, MUSCULUS TENSOR TYMPANI

funguje hluk ustálený, ne příliš rychle proměnlivý

selhává hluk pulsní, proměnlivý s prudkými skoky

Důsledek selhání: Vysoké energie se dostanou do vnitřního ucha ⇒ poškození smyslových buněk

Účinky

Fyziologické

- ▶ pozadí (bylo prokázáno, že 0 vede ke stresu)
- ▶ informační, komunikační

Škodlivé

- ▶ Obtěžování, rušení (mírnější intenzity, více závisí na charakteru činnosti), narušování komunikace
- ▶ Poškození zprostředkované sluchovým ústrojím – různá psychosomatická a neurotická poškození.
- ▶ Poškození sluchového ústrojí (akutní – akutrauma, poškození středního ucha + bubínku; chronické – poškození smyslových buněk)
- ▶ Poškození jiných tkání (u velmi vysokých intenzit)



Poškození sluchu

- ▶ Na hraně poškození, v některých případech může vadit: Vlna o vyšší intenzitě zabrání vnímání následujících o nižší intenzitě (úroveň zlomků sekund)
 - ▶ Může zakrýt výstražné akustické signály
 - ▶ Využití – ztrátové zvukové formáty typu mp3
- ▶ Ohlušení – posun zvukového prahu na desítky minut až hodin
- ▶ Akutrauma – překročila se fyzická odolnost ucha, především středního
- ▶ Chronické nevratné poškození sluchu – dlouhodobé působení vysokých intenzit (měsíce až léta, velmi vysoké interindividuální rozdíly): Cílovou tkání je smyslový epitel ve vnitřním uchu



Celkové účinky na nervovou soustavu

Může vyvolat

psychický stres (obecně)

neurotické projevy zejména poruchy spánku, pocit napětí, poruchy soustředění

neurózy pestrá psychická a somatická symptomatologie

Může zhoršit, vyvolat krizi

psychózy obecně zhoršuje průběh

epilepsie může vyvolat akutní záchvat



Vztah k úrazům

Úrazy

Sluchového ústrojí – přímo vyvolává

Ostatní – zvyšuje riziko úrazu různými mechanismy, od snižování schopnosti soustředění až po maskování výstražných signálů a blokování schopnosti je postřehnout (ztráty sluchu).



Vztah k psychosomatickým chorobám

Kardiovaskulární nemoci

Především zhoršuje hypertenzi a ischemickou chorobu srdeční, přeneseně i další.

Nemoci GIT

Především příspěvek k rozvoji vředové choroby žaludku a dvanáctníku, ale i dalším chronickým onemocněním této soustavy.

Diabetes mellitus

Zhoršuje průběh obou hlavních typů cukrovky „hýbe“ s potřebou inzulínu, a to oběma směry.

Psoriasis

Zhoršuje průběh lupénky i dalších systémových onemocnění.

Zhoršuje průběh všech závažných chronických chorob.



Vliv na vývoj plodu

Poškození plodu

- ▶ Rodí se s nižší porodní hmotností (rizika)
- ▶ Může dojít k předčasnému porodu (rizika)
- ▶ Může mít už z prenatálního období poškozený sluch, především vnitřní ucho



Hygienické limity

Pracovní prostředí

Základní hodnota

75 dB

Korekce podle délky expozice

až + 20 dB

Korekce podle psychické náročnosti práce

-40 až + 10 dB

Korekce podle ochranných pomůcek

- ▶ Kolik pomůcka hluku ubere, o tolik lze korigovat k vyšším hodnotám
- ▶ Účinky pomůcek se částečně sčítají
- ▶ Při vysokých hodnotách je nutno chránit nejen zvukovod, ale i kost skalní nebo celou lebku



Hygienické limity

Životní prostředí

Podle charakteru prostředí

Základní limity jsou stanoveny podle charakteru zástavby – prostředí (např. obytná zóna, průmyslová a nákupní zóna, rekreační oblast apod.)

Korekce podle denní doby

V noci je prováděna korekce směrem k nižším hodnotám.

Zdroj problémů a kontraverzí

Hudba, zejména v nočních hodinách.



Protihluková opatření 1

Technická

- ▶ Snížit produkci hluku ve zdroji, tento odstranit, přesunout
- ▶ Snížit vedení hluku od zdroje do prostředí

Organizační

(především průmyslová sféra)

- ▶ zkrátit expozici hluku
- ▶ zabránit zbytečným expozicím

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Protihluková opatření 2

Individuální

chrániče zvukovodu vata, speciální vaty, speciální zátky
chrániče ucha různé typy mušlových cháničů, podsobnóu ochranu zčásti poskytnou i mušlová sluchátka
ochrana hlavy protihlukové přílby

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Mikroklima

Definice

Mikroklima představuje soubor fyzikálních faktorů prostředí, které ovlivňují výměnu tepla mezi organismem a prostředím.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Co sem spadá

Faktory mikroklimatu:

teplota ovzduší měřena opravdu teplota vzduchu, ochrana teploměru před sálavým teplem
přítomnost tepelného sálání měří se *výsledná teplota*, která je součtem sálavého tepla a teploty vzduchu
vlhkost vzduchu relativní = kolik vody je schopen vzduch ještě pobrat
proudění vzduchu ovlivňuje jak odpařování, tak výměnu tepla mezi tělem a vzduchem

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Ovlivnění ze strany člověka

Produkce tepla organismem

Teplo produkují všechny metabolicky aktivní tkáně, v klidu nejvíc játra, při pracovní – pohybové aktivitě kosterní svaly.
Metabolismus:
bazální × klidový × při zátěži

Přenos tepla v organismu

Děje se především *krevním oběhem*, přičemž se transportuje nejen teplo, ale i voda nutná k ochlazení pocením

Oděv

Výměnu tepla mezi organismem a okolím ovlivňuje *Termický odpor oděvu*, závislý nejen na kvalitě oděvu ale i počtu mezivrstev.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Důsledky mikroklimatu

Mikroklima a aktivita + oděv ovlivňují umístění na škále:

- ▶ Fatální nedostatek tepla, vedoucí k vychladnutí organismu pod fyziologický limit a smrti chladem (lze přežít dočasný pobyt)
- ▶ Dyskomfort z nedostatku tepla, dlouhodobě snesitelný
- ▶ Tepelný komfort
- ▶ Dyskomfort z nadbytku tepla, dlouhodobě snesitelný
- ▶ Fatální nadbytek tepla, vedoucí k přehřátí organismu nad fyziologický limit a smrti na přehřátí (opět lze přežít dočasný pobyt)

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Kdy jsou důsledky neoptimální teploty fatální:

Limity tělesné teploty

- ▶ Neudrží-li organismus teplotu **nad** cca 21 – 22 °C, dojde k zástavě srdce
- ▶ Neudrží-li organismus teplotu **pod** cca 42 – 43 °C, dojde k denaturaci nejcitlivějších bílkovin

Aktivita

Je nutno zdůraznit, že i produkce tepla má zásadní vliv: Kdo v mrazu usne, umrzne; už stav „*při vědomí*“ vede ke zvýšení metabolismu → zvýšené produkci tepla, tedy přežití i za teploty, kdy by usnutí bylo fatální; *zvýšená aktivita* = tolerance ještě nižší teploty.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Hodnocení únosnosti zátěže

Přímo

Měříme teplotu a extrapolujeme křivku. Pokud má tendenci se ustálit uvnitř rozumného rozmezí (výše uvedené limity jsou vitální), je zátěž *dlouhodobě únosná*, pokud ne, vyčteme z křivky dobu, po níž je zátěž *krátkodobě únosná*.

Nepřímo

Přehřívání lze odhadovat prostřednictvím tepové frekvence, která v sobě integruje jednak tepelnou zátěž, jednak fyzickou zátěž spojenou s konkrétní prací. Opět rozlišujeme krátkodobě a dlouhodobě únosnou zátěž z horka (zda se tepová frekvence ustálí pod fyziologickou hranicí, nebo má tendenci pokračovat přes ni).

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Organismus se ohřívá

horkým vzduchem který přímo ohřívá povrch těla (dtto horké předměty – i ohřátý oděv, horká kapalina)

infražářením z velmi horkých předmětů v okolí

mikrovlnami, proudy jen za zvláštních okolností (např. léčebné – lázeňské procedury)

horké jídlo a nápoje mohou mírně ovlivnit, limitující je odolnost sliznic GIT, mohou poškodit GIT



Vliv oděvu

Pojem:

Termický odpor oděvu

Představuje odpor proti prostupu tepelné energie skrze oděv, a to oběma směry. Tj. chrání nejen před chladem, ale i před extrémními teplotami (kde ovšem hrozí přehřátí vlastním metabolickým teplem).

Za normálních okolností se na t. odporu podílejí jednotlivé vrstvy i jednotlivé mezery mezi nimi. Některé typy oděvů mají více vrstev, další mají vrstvy s vlastnostmi mezivrstvy (dutá vlákna apod.). Proti přehřívání se uplatňuje i odrazová zevní vrstva (Al folie apod.), případně vrstvy blokující IR záření.



Mechanismus ochlazování

Periferní vasodilatace

Roztáhnou se cévy v končetinách a na povrchu těla.

Dojde:

- ▶ přenosu tepla z tělesného jádra na povrch těla (odvod kontaktem se vzduchem a sáláním)
- ▶ umožnění pocení

Pocení

Voda, která je součástí potu, se odpařuje a skupenské teplo je odebíráno povrchu těla (proto jeho záhřev vasodilatací) a bezprostředního okolí. Nefunguje při vysoké relativní vlhkosti (sauna, tropy). Vodu a minerály do potu je nutno dodávat nápoji a potravou.



Regulace mimo rozmezí

V případě velkého přehřívání

Před totálním kolapsem z horka se objevuje paradoxní reakce, která se projeví periferní vasokonstrikcí.

Jedná se o projev nastupujícího šoku, který se dále může prohlubovat až k úmrtí. Tedy je nutné postiženého za každou cenu dostat do chladnějšího prostředí.

Smrt může nastat jednak z hypertermie, jednak z oběhového kolapsu (šok).



Organismus se ochlazuje

chladným vzduchem přímo ochlazujícím povrch těla

sáláním z povrchu těla do chladného okolí
Obojí ovlivňuje oděv

evaporací odpařováním vody na povrchu těla – nejprve neviditelné, posléze viditelné pocení
Ovlivňuje relativní vlhkost vzduchu a proudění vzduchu (tím i oděv)

dýcháním a exkrementy nejsme schopni ovlivnit tak, aby to napomohlo termoregulaci, jen počítáme do tepelné bilance

studené jídlo a nápoje ochladí, mohou ale mít nepříznivé dopady na GIT



Řízení termoregulace

Centrum

Nachází se v hypothalamu. V přední části je čidlo, reagující na teplotu krve, v zadní je nervové centrum se zapojením do vegetativního / hormonálního / nervového řízení odpovědí na přehřátí nebo podchlazení.

Umístění čidla

V malé vzdálenosti od klenby nosohltanu, proto může být ovlivněno studenými nebo horkými nápoji a pokrmy, které zde místně působí. V některých případech pozitivní, v jiných negativní jev.

Důsledek:

Teplota v ústech (případně zvukovodu), pokud se vyloučí vliv potravy a nápojů je nejvalidnější vůči teplotě tělesného jádra.



Vedlejší účinek pocení

Souvislost potních žláz s dalšími

Protože mléčné žlázy jsou přeměněné žlázy potní, všechny podněty vyvolávající pocení zvyšují aktivitu mléčných žláz (využití pro „rozkojení“), naopak regulační mechanismy ovlivňující ejekci mléka mají vedlejší účinek na potní žlázy.



Důsledky aktivního ochlazování

Pro organismus:

Ochlazování organismu představuje značnou zátěž pro kardiovaskulární systém

- ▶ přepumpování značného množství vody po těle
- ▶ kompenzace snížení periferního odporu zvýšením srdeční práce
- ▶ při dlouhodobém stavu mají problémy i ledviny
- ▶ problémy mohou být i u dětí a těhotných

Pro společnost:

Existuje řada kontraindikací pro práci / pobyt v horku, které jsou řešeny legislativními úpravami na různé úrovni (zákony, prováděcí vyhlášky).



Pitný režim 1

- ▶ Přibližně 2/3 tekutin doplňujeme během směny, 1/3 po jejím skončení
- ▶ Tekutiny by měly být různorodé (různé typy nápojů, bujony)
- ▶ Tekutiny by neměly obsahovat mnoho minerálů (zátěž na ledviny), ale ani čistá voda není dobrá (má méně minerálů, než kolik procent minerálů je v potu)



Zvládání zátěže chladem

Fyziologické reakce

1. Zvýšení metabolismu (zevně nepozorujeme)
2. Tvorba tepla svalovým třesenem
Na oba tyto body je třeba mít dostatek energie → roste spotřeba energie, výživový stav se promítá do odolnosti vůči chladu.
3. Centralizace tepla v těle – udržuje se teplota „tělesného jádra“, zahrnujícího trup od jater včetně nahoru, vnitřek krku a vnitřek hlavy. V ostatních částech těla teplota klesá
Důsledky: Snadno vznikají omrzliny, případně poškození z nízkých teplot ale nad nulou – „zákopová noha“



Adaptace na horko

V zásadě podobnými mechanismy jako adaptace na chlad, ale v opačném gardu termoregulace.

Adaptace objemem

Velká zvířata v tropech (nestačí se v horkém období dne vyhřát na nebezpečnou teplotu).

U člověka pozor na to, že dítě poloviční výšky má sice 1/4 plochu, přes kterou do něj vstupuje teplo, ale jen 1/8 objemu, který je vyhříván.



Záření – rozdělení a základní pojmy

Podle typu částic

korpuskulární jedná se o proud částic o definované hmotnosti a rychlosti

elektromagnetické jedná se o proud fotonů, popsatelných jako elektromagnetické záření určité vlnové délky a intenzity

Podle působení na hmotu

ionizující vytváří v ozařované hmotě elektricky nabitě částice – ionty

neionizující elektricky nabitě částice nejsou vytvářeny



Pitný režim 2

- ▶ Tekutiny by neměly obsahovat kofein (odchází z organismu pomaleji než voda, hrozí předávkování, snižuje pocit žízně). Snižování pocitu žízně platí i pro některé drogy. Také zvyšuje produkci moče.
- ▶ Nemělo by jít o alkoholické nápoje – některá průmyslová odvětví mají zažito pivo. Naopak nealkoholická piva se blíží „ideálnímu iontovému nápoji“. Alkohol rovněž snižuje pocit žízně a zvyšuje produkci moče.
- ▶ Kolik se vypotí zjistíme vážením (před a po, při zohlednění moče, případně stolice, a příjmu potravy / tekutin)
- ▶ Musí se zhodnotit i otoky z hypertermie – váží na sebe vodu, která pak chybí v krevním řečišti.



Nachlazení

Následky celkového podchlazení

Dojde k omezení imunity.

Vzhledem k nižší teplotě se mohou lavinovitě pomnožit i organismy, vůči kterým má člověk druhovou imunitu, danou tělesnou teplotou.

Pojem aklimace

Aklimatizace na mikroklima se nazývá *aklimace*



Ovlivnění aklimace

Faktory

- ▶ Věk
- ▶ Fyziologický stav
- ▶ Otužování
- ▶ Zdravotní stav
 - ▶ kardiiovaskulární soustava
 - ▶ kožní
 - ▶ ledviny a vývodné cesty
 - ▶ celková chronická onemocnění



Typy záření

Typy ionizujícího záření

Mezi ionizující typy záření patří záření částicová (alespoň běžné typy, jako jsou proudy jader hélia (α záření), elektronů (β záření), pozitronů (β^+ záření), neutronů, protonů atd.) a elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má ultrafialové světlo.

Typy neionizujícího záření

Mezi neionizující záření patří elektromagnetické záření o vyšší vlnové délce.



Neionizující záření

UV záření

Rozlišujeme UV-A (320 – 400 nm), UV-B (280 – 320 nm) a UV-C (pod 280 nm). UV záření lze považovat za dolní hranici (vzhledem k vlnové délce) neionizujícího záření, protože při vyšších intenzitách už jeho vlivem nastává tvorba O_3 ve vzduchu a volných radikálů v některých materiálech. UV-C (které se kolem nás vyskytuje pouze výjimečně) se dá považovat už za velice slabě ionizující.

Zdroje UV záření

- ▶ předměty zahřáté na vysokou teplotu, např. elektrický oblouk, Slunce.
- ▶ různé typy výbojek

UV-A a UV-B jsou součástí slunečního záření a i při zamračené obloze pronikají až na zemský povrch. UV-C je atmosférou filtrováno s vysokou účinností.

◀ ▶ ↻ 🔍

Účinky UV záření

- ▶ baktericidní účinky
- ▶ z cholesterolu kolujícími v krvi provitamin D
- ▶ příznivý vliv na některé kožní infekce i některá neinfekční onemocnění kůže (např. lupénka)
- ▶ iritace kůže až zánět a nekróza (důsledek – pigmentace dle fototypu)
- ▶ rakovina kůže melanom + karcinomy
- ▶ poškození spojivky a sítnice

Na produkci vitamínu D plně postačuje denně cca 1 hodina v lehkém oděvu v polostínu zejména v jižnějších zemích v časném dopoledni nebo pozdním odpoledni, vyšší expozice žádný další pozitivní efekt nepřináší.

◀ ▶ ↻ 🔍

Viditelné světlo

- ▶ Má rozmezí vlnových délek přibližně 400 – 760 nm.
- ▶ Citlivost zrakových receptorů vůči světlu na krátkovlnném konci spektra velice strmě klesá, na dlouhovlnném je pokles pozvolný.
- ▶ Osoby adaptované na tmou byly s to detekovat záření o vlnové délce přes 1000 nm.
- ▶ Zdrojem mohou být zahřáté předměty (spojité spektrum, charakterizované stupni Kelvina) i výbojky (čárové spektrum).

◀ ▶ ↻ 🔍

Viditelné světlo

Význam 1

- ▶ Viditelné světlo se účastní vidění.
- ▶ Osvětlení se měří v luxech (intenzita světla dopadajícího na osvětlenou plochu)
- ▶ Hygienické normy zohledňují:
 - ▶ zrakovou náročnost prováděné činnosti
 - ▶ oslnění, popř. střídání světla a tmy (především pokud pracovníci musejí přecházet z jednoho místa na druhé)
 - ▶ některé práce je nutno provádět po několik desítek minut trvající adaptaci na tmou
 - ▶ speciální normy pro práci s lasery

◀ ▶ ↻ 🔍

Viditelné světlo

Význam 2

- ▶ U zářivek a výbojek existuje stroboskopický efekt
- ▶ Barva světla má význam pro psychickou pohodu, barevné řešení interiéru pro využití světla, na intenzitě přirozeného osvětlení se podílí i tvar oken
- ▶ Intenzivní viditelné světlo vyvolává na kůži fotodermatitidu a může přispívat i k zánětu spojivek (tzv. „sněžná slepota“ při dlouhodobém pobytu bez ochrany v krajinně zapadane sněhem; na ní se ovšem spolupodílí i UV záření).
- ▶ Společně s IR zářením se podílí na vzniku úžehu (viz dále).

◀ ▶ ↻ 🔍

Infračervené záření

Opět rozeznáváme pásma IR-A (760 – 1400 nm), IR-B (1400 – 3000 nm) a IR-C (nad 3000 nm)

Pozor: Rozložení je symetrické kolem viditelného světla. Je to tedy seřazeno podle vlnové délky následovně: UVC – UVB – UVA – viditelné světlo – IRA – IRB – IRC.

Jeho zdrojem jsou zahřáté předměty, IR-A a IR-B jsou složkou slunečního záření, dopadajícího na povrch Země.

◀ ▶ ↻ 🔍

Infračervené záření

Účinek na zdraví

- ▶ Při vysokých intenzitách tepelný efekt až akutní popáleniny
- ▶ Zákal oční čočky. Vyskytoval se především u pracovníků, vystavených sálání z pecí nebo horkého materiálu *sklářská katarakta*.
- ▶ Úžeh vzniká celkovým přehřátím organismu viditelným i IR zářením. Podílí rovněž teplota vzduchu, relativní vlhkost a proudění vzduchu, tedy celý tzv. *termický komplex*. Vzniká celkové přehřátí organismu, doprovázené nevolností a zvracením.
- ▶ Úpal je zapříčiněn především přehřátím hlavy, přičemž dlouhovlnná složka IR-B může pronikat skrze povrchové struktury a dráždit mozkové obaly. Příznaky jsou podobné úžehu, více v popředí je však nevolnost a silné bolesti hlavy.

◀ ▶ ↻ 🔍

Infračervené záření

Účinek na zdraví

- ▶ Oba stavy mohou u disponovaných jedinců vyvolat epileptické nebo epileptiformní křeče. Prevencí obou:
 - ▶ vyhýbání se otevřenému prostranství na slunci
 - ▶ dostatečný pitný režim,
 - ▶ prevencí úpalu pak navíc dbání o nošení pokrývky hlavy
 - ▶ je nutno zvlášť hlídat děti s epilepsií, chorobami ledvin a kardiovaskulárního systému, cukrovkáře apod.!
- ▶ Chronické vlivy IR záření: Byly diskutovány možné vlivy extrémně dlouhých expozic stále stejných míst na kůži, nicméně riziko nádorů apod. je velice nízké.

◀ ▶ ↻ 🔍

Záření o vyšších vlnových délkách

- ▶ Mikrovlny a vlny používané v radiokomunikacích, mají účinky především tepelné (ohřev pokrmů v mikrovlnné troubě).
- ▶ Diskuse o negativním zdravotním účinku
 - ▶ riziko některých zhoubných nádorů mozku
 - ▶ ohřev a krvácení mozkové tkáně při intenzivní expozici
- ▶ Příznivé účinky:
 - ▶ nejšetnější možný ohřev potravy
 - ▶ dostupnost rychlé pomoci při úrazech a v nemoci
- ▶ Vyšší výskyt nádorů kolem vedení VN a VVN byly vysvětleny elektrostatickým koncentrováním iontů, nespojují s mikrovlnami

◀ ▶ ↻ 🔍

Pronikavost záření

Aby záření uškodilo, musí:

- ▶ Proniknout do živé tkáně
- ▶ Tam alespoň částečně interagovat se hmotou a předat jí svou energii (nebo její část)

Málo pronikavá záření

Z neznámějších záření α .

Zastaví je jakákoli pevná hmota, i list papíru, i mrtvé buňky na povrchu kůže. Uplatní se jen za specifických okolností.

Vysoce pronikavá záření

Extrémem jsou neutrina.

Projdou hmotou, aniž by s ní interagovaly = nijak neškodí.

Pronikavost „mezi“

Právě tato záření předají svou energii živé hmotě a jsou zdrojem rizika.

◀ ▶ ↻ 🔍

Zdroje ionizujícího záření

Umělé zdroje ionizujícího záření

- ▶ Uměle nakoncentrované přírodní radioizotopy
- ▶ Uměle vytvořené radioizotopy
- ▶ RTG zařízení
- ▶ Další technická zařízení, částicové urychlovače apod.
- ▶ γ -lasery

◀ ▶ ↻ 🔍

Měření ionizujícího záření

Průběžné

Dopady částic (ale i fotonů o dostatečné energii) je možno měřit různými typy čidel. Velmi známý je *Geiger-Müllerův počítač*, jehož čidlo je tvořeno trubicí s velmi zředěným plynem, jehož vodivost se průletem částice ionizujícího záření na okamžik změní, což navazující elektronické obvody převedou „klasicky“ do charakteristického cvakání ve sluchátkách nebo reproduktorku, modernější pak počítají průlety částic a vztahují je k časové ose. Z principu není podobnými měřidly možné zjišťovat částice s velmi malou pronikavostí (především α), protože ty nemohou proletět stěnou trubice.

◀ ▶ ↻ 🔍

Ionizující záření

Patří mezi ně:

- ▶ elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než UV-C,
 - ▶ rentgenové záření
 - ▶ γ záření
 - ▶ kosmické záření
- ▶ záření α (jádra atomů helia)
- ▶ záření β (proud elektronů, popř. jako β^+ proud pozitronů)
- ▶ neutronové záření

Některá částicová záření neionizují, např. neutrina, která volně bez interakce projdou hmotou celé planety, jiná jsou vysoce exotická.

◀ ▶ ↻ 🔍

Zdroje ionizujícího záření

Přirozené zdroje ionizujícího záření

- ▶ Slunce a další podobné astronomické objekty
- ▶ Sekundární záření z Van Allenových pásů
- ▶ Exotické vesmírné objekty (γ záblesky apod.)
- ▶ Radioizotopy
 - ▶ Izotopy těžkých prvků na konci periodické soustavy – pozůstatky výbuchu supernovy před vznikem sluneční soustavy
 - ▶ Izotopy průběžně vznikající ve vysokých vrstvách atmosféry vlivem záření z vesmíru, např. ^{14}C , ^{40}K .

◀ ▶ ↻ 🔍

Charakteristika radioizotopů

Poločas rozpadu

je doba, za níž se rozpadne polovina atomů příslušného radioizotopu.

Aktivita

plyne z poločasu rozpadu atomů příslušného izotopu a jejich množství obsaženém ve sledovaném materiálu. Vyjadřuje se jednotkou Becquerel [Bq], což je jeden rozpad za sekundu. Nejčastěji se však pracuje s *měrnou aktivitou*, která se vztahuje ke hmotnosti, popř. objemu (tedy $\text{Bq}\cdot\text{kg}^{-1}$, $\text{Bq}\cdot\text{l}^{-1}$ (v případě některých kapalin) nebo $\text{Bq}\cdot\text{m}^{-3}$ (v případě některých plynů, včetně vzduchu)).

◀ ▶ ↻ 🔍

Měření ionizujícího záření

α -záření

Průběžně je možné měřit pouze v plynu a podmínkou je vysoká aktivita. Jinak jen povrchové záření z kapalin nebo pevných materiálů, přenesených do vakuované komory – měří se záblesky luminiforu ze ZnS – fotonásobič a příslušná elektronika.

◀ ▶ ↻ 🔍

Měření ionizujícího záření

Dozimetrie 1

Filmové dozimetry

Radiologických pracoviště, nošené na hrudníku. Jde o kousek speciálního fotografického filmu v obalu nepropouštějícím viditelné světlo. Části filmu jsou ještě překryty destičkami z kovu. Po expozici (týdny až měsíce, pokud nedojde např. k nehodě) je film vyvolán a vyhodnoceno zčernání fotografické emulze. Ze zčernání ploch krytých kovem je možno odhadnout pronikavost záření, jemuž byl pracovník vystaven, a z tohoto údaje dávkový ekvivalent pro hluboké tkáně.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Pronikavost záření

Málo pronikavé záření

Nepronikne oděvem, zrohovatělou vrstvou pokožky apod., není nebezpečné.

Velmi pronikavé záření

Proletí tělem, aniž by interagovalo s jeho hmotou, opět není nebezpečné.

Záření středně pronikavá

Zachytí se hmotou těla, vytváří ionty, poškozují makromolekuly, jsou zdrojem sekundárního záření (u fotonů tzv. Comptonův jev). Představují zdravotní riziko.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Biologický účinek

Jednotlivé typy záření mají různý biologický účinek. Proto se pro hodnocení ozáření živých objektů používá **dávkový ekvivalent**, jehož jednotka je Sievert [Sv], což je Gy násobený kvalitativním faktorem příslušného typu záření. Protože ve zdravotnictví se nejčastěji setkáváme s rentgenovým a γ zářením, které mají kvalitativní faktor 1, tudíž jsou dávka a dávkový ekvivalent numericky shodné, dochází někdy k jejich zaměňování.

Pro prognózování účinku je ještě nutno zohlednit různou citlivost ozářených tkání.

Existují dva typy účinků: *stochastické* a *nestochastické*.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Nemoc z ozáření

První stupeň : kostní dřeň a orgánů produkujících imunokompetentní buňky. Dochází k úmrtí na sekundární infekce, anémie apod. Lehké formy je možné přežít pod krytím antibiotik, s krevními transfúzemi, speciální dietou apod. Tuto formu nemoci z ozáření vytváříme uměle u pacientů s leukémií.

Druhý a třetí stupeň nemoci z ozáření mají infaustní prognózu.

Druhý stupeň je charakterizován rozpadem sliznic trávicího ústrojí s následnými stavy podobnými těžkému průběhu cholery, dysenterie apod. Postižení umírají zpravidla do několika dnů od ozáření.

Třetí stupeň je charakterizován narušením nervové činnosti, stavy zmatenosti až ztrátou vědomí. Smrt nastává do několika hodin, při vysokých intenzitách záření již v minutách.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Měření ionizujícího záření

Dozimetrie 2

Termoluminiscenční dozimetry

Lze umístit např. do prstenu a sledovat expozici rukou.

Dozimetry na α -záření

Plastový kotouček, po naleptání se zviditelní dopady α -částic.

Důležité upozornění:

Dozimetry nijak nevarují svého nositele o průběžně obdržované dávce!

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Jednotky měření radiace

Záření předává ozařované hmotě energii. Tuto energii nazýváme **dávka** a vyjadřujeme ji jednotkou Gray [Gy] (představuje jeden joule předaný kilogramu ozařované hmoty).

Výpočet dávky

Dávku lze relativně snadno propočítat pro homogenní tělesa pravidelných geometrických tvarů. Člověk tomu neodpovídá. Pro modelování slouží k propočtu dávek, které člověk získá z různých typů záření v různých režimech ozařování, se používají speciální loutky z umělé hmoty, napodobující vlastnosti lidských tkání, umožňující zasunout do jednotlivých částí „těla“ měřicí techniku, tzv. fantomy.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Účinky nestochastické

Mají práh a s dávkou (respektive dávkovým ekvivalentem) narůstá mohutnost těchto účinků.

- ▶ Nemoc z ozáření (I. až III. stupeň)
- ▶ Místní nekróza tkáně („rentgenové vředy“)
- ▶ Katarakta
- ▶ Poškození gonád

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Stochastické účinky

Vznikají náhodně, jejich intenzita není závislá na dávce; na dávce je závislá pravděpodobnost, že účinky nastanou.

- ▶ nádory u ozářených a jejich potomstva (prakticky se zohledňují dvě následující generace)
- ▶ vrozené vývojové vady u potomstva ozářených (opět ve více generacích).
- ▶ praktickým projevem může být porucha plodnosti

Horní mez stochastických účinků je dána nástupem nestochastických účinků. Pod touto mezí byla experimentálně prokázána lineární závislost mezi dávkou (dávkovým ekvivalentem) a jejími následky. Dolní mez je dána přirozenou radioaktivitou prostředí.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Hormeze

Znamená zvýšení vitality po malých dávkách záření (totéž i pro některé zdravé škodlivé chemikálie).

Byla prokázána u bakterií, jednobuněčných eukaryotů, rostlin a některých nižších živočichů. U vyšších živočichů prokázána nebyla, ač se po ní pátralo pokusy dnes z etických důvodů nepřijatelnými (40. a 50. léta min. stol.).

Lineární model

Zatím všeobecně přijímaný, umožňuje odhad poškození zdraví i při nerovnoměrném ozáření populace.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Radon

Zdroje

Izotopy rádia v uranové rudě. Pro uvolnění je nutno jejich rozptýlení v pórézní nebo krystalické hornině.

Charakteristika

Izotopy radonu mají poločas rozpadu od několika hodin do několika dní. Rozpadají se α rozpadem, vzniká z nich izotop s velmi krátkým poločasem rozpadu a následně opět α rozpadem izotop stabilnější. Z atomu radonu tedy, když se začne rozpadat, vyjdou dvě částice α .

Nebezpečnost

Hlavně výskyt ve vdechovaném vzduchu, jako inertní plyn se nechytá do filtrů. Vyvolává rakovinu plic.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Radon – redukce rizika

- ▶ Izolace budov
- ▶ Radonové studny
- ▶ Sledování Rn ve stavebních materiálech
- ▶ Sledování Rn v podzemních vodách
- ▶ Šarže zemního plynu s vyšším obsahem Rn jdou do průmyslových kotelen a vytopen

Podmínkou redukce rizika je jeho správná detekce.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Umělé zdroje

Havním zdrojem je RTG vyšetření, prevencí je náhrada za jiné typy vyšetření a technická opatření, aby při vyšetření byl pacient ozářen co nejméně.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Radiační zátěž populace

Zdroje radiační zátěže se liší podle životních podmínek populace. Pro naši populaci (tu část, která nemá profesionální expozici ionizujícímu záření) platí, že přibližně třetina celoročního dávkového ekvivalentu je realizována z radonu, o další třetinu se dělí záření z okolí (radioizotopy ve stavebních materiálech, vzduchu, půdě apod.) a radioizotopy z našeho vlastního organismu (včetně zmínovaného C^{14}), o zbylou pak kosmické záření a umělé zdroje.

Radon – rizika pro populaci

Výrony radonu z podloží

Velmi významné tehdy, jestliže jdou do nitra budov. Dochází k nejvyšším známým koncentracím radonu.

Výrony ze stavebního materiálu

Jen některé typy škvár kontaminovaných uranovou rudou.

Voda, plyn

Jen v případě kontaminace podzemních zdrojů.

Měření

Měří se aktivita vzduchu v $Bq \cdot m^{-3}$, protože Rn má více izotopů o různé aktivitě, tak jeho obsah (chemicky) riziko necharakterizuje.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Další preventabilní zdroje

Záření z Van Allenových pásů

Dávkový ekvivalent roste s nadmořskou výškou a se vzdáleností od rovníku.

Černobylské skvrny

Dodnes nebyla zveřejněna mapa černobylských skvrn, kde je vyšší kontaminace izotopů Sr a Cs, které mají vysokou afinitu k organismu.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Problematika radiofobie

Do značné míry je dána smyslovou nezjistitelností záření. Mnohdy vyvolávána záměrně z politických důvodů (Temelín). Někdy jsou vyvolávány fámy na základě jiných účinků než záření (např. projevy toxicity uranu).

Mnohdy vzniká jako reakce na zatajování a desinformace z oficiálních zdrojů (Černobyl).

Někdy se za „radiofobii“ označují zcela oprávněné obavy, např. z rizika útoku teroristů na sklad jaderného odpadu, opět z politických důvodů.

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

◀ ▶ ↺ ↻ 🔍

Vlivy na zdraví 1

- ▶ Podmínkou účinku je expozice v dostatečné dávce po dostatečně dlouhou dobu
- ▶ **Emise** uvolněná ze zdroje proniká do životního prostředí, podléhá prostorovému rozptýlu a vyvolává interakce se životním prostředím. Působí na receptor, stává se **imisi** a může ovlivnit zdraví lidí
- ▶ Typy účinků – obecně
 - ▶ inertní
 - ▶ iritační, alergizující
 - ▶ toxické
 - ▶ narušení genetického materiálu



Vlivy na zdraví2

- Krátkodobá expozice:** Především iritace, vyvolávající zánětlivou odpověď organismu. U vnímavých jedinců alergická reakce (velmi různá)
- Dlouhodobá expozice:** Chronická zánětlivá reakce, vyvolávající aktivaci agresivních volných radikálů a touto cestou oxidativní stres
- Důsledky:** Nárůst nemocnosti, úmrtnosti, zkrácování délky plnohodnotného života, zvýšení incidence chorob (přibývají důkazy o vztahu vůči kardiovaskulárním onemocněním, metabolickým onemocněním, poruchám reprodukce ...)



Problémy a výzvy

- Suspendované částice:** Plošná expozice komplexní směsí látek, nárůst jemných a ultrajemných frakcí ($< 1\mu m$) vlivem rozvoje nových technologií a dopravy
- Nakládání s odpady:** Nejsou vždy respektována pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami, na úrovni jednotlivce třídění odpadů
- Kvalita rekreačních vod:** Mírně se zlepšující stav, také vlivem tlaku veřejnosti
- Média a vnímání veřejnosti:** Ovzduší ve městech, hormony ve vodě a potravinách, záření... (pozor na rozlišení pojmu nebezpečí a riziko!)



Původ chemických látek

- ▶ Člověk a jeho činnost
- ▶ Příroda ovlivněná člověkem
- ▶ Příroda nezávislá na člověku



Člověk a jeho činnost

Látky v přírodě vzácné nebo pro ni nové. Rizika nulová až vysoká. Hlavní problém: Nedostatečné prozkoumání nových látek a jejich interakcí.

REACH

registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek



Příroda ovlivněná člověkem

Od nepřírodných ekosystémů po nepřírozené zacházení s živými potravinami.

Vznik nežádoucích látek v ekosystémech

např. tvorba toxinů v člověkem ovlivněných nádržích a vodotečích

Reakce rostlin na „špatné“ zacházení

např. tvorba fytoalexinů

Neživá příroda

např. odkryvy hornin obsahujících toxické kovy



Příroda nezávisle na člověku

Nejrůznější přírodní toxiny, ale také anorganické látky (od sopečných plynů až po dioxiny v kouři přirozených požárů)



Zdroje

Bodové

Lze lokalizovat místo, kde dochází ke vzniku nebo nežádoucí přeměně látek. Výhodné z hlediska detekce i ochranných opatření.

Plošné, případně liniové

Chemické látky vznikají nebo jsou aplikovány na větší ploše, případně podél nějaké linie (velice často dopravní cesty).



Vznik stále nových látek, jejich rozšiřování v ekosystémech (až přechod zcela mimo systém, v němž se původně nacházely).

Koloběhy prvků

Až na výjimky procesy velice pomalé (stovky, tisíce i miliony let).
Výhody × nevýhody

- ▶ Rozvinutý průmysl a doprava
- ▶ Relativně bohatá ekonomika
- ▶ Zátěže z předchozí éry, dodnes nedořešené
- ▶ Paradoxy sanačních opatření

◀ ▶ ↻ 🔍

◀ ▶ ↻ 🔍

Obecné hodnocení stavu

V současné době spíše převládají výhody nad nevýhodami.

Přírodní zdroje chemických látek

- ▶ Procesy v neživé přírodě
 - ▶ Procesy v atmosféře
 - ▶ Procesy v zemské kůře
- ▶ Procesy v rostlinách a živočiších – toxické látky jako součást kompetice, i velmi sofistikované (baccharinoidy), u nás Hasivka orličí

◀ ▶ ↻ 🔍

◀ ▶ ↻ 🔍

Baccharis megapotamica



◀ ▶ ↻ 🔍

Hasivka orličí



Zdroj: <http://botany.cz/cs/pteridium-aquilinum/>

◀ ▶ ↻ 🔍

Chemofobie, environmentální hysterie

Nadměrný strach z chemizace, neodpovídající reálným rizikům, jak poznaným, tak i odhadovaným.

Šíření

Řada ekologických organizací

Důvod

- ▶ ekologická ideologie
- ▶ byznis

Metody šíření

- ▶ vyslovené nesmysly
- ▶ polopravdy a nadhodnocování reálných rizik

Škodlivost

- ▶ diskreditace celé problematiky
- ▶ tlak na nesmyslné výdaje, prostředky chybí jinde

◀ ▶ ↻ 🔍

◀ ▶ ↻ 🔍

Látky poškozující zdraví

Typy poškození

- ▶ obecně škodlivé
- ▶ toxické
- ▶ specificky toxické



Látky poškozující zdraví

Typy poškození

- ▶ obecně škodlivé
- ▶ toxické
- ▶ specificky toxické

Obecně škodlivé

Nějak poškozují zdraví, včetně poškození nespecifických nebo vázaných na specifické vlastnosti organismu poškozeného



Látky poškozující zdraví

Typy poškození

- ▶ obecně škodlivé
- ▶ toxické
- ▶ specificky toxické

Obecně škodlivé

Nějak poškozují zdraví, včetně poškození nespecifických nebo vázaných na specifické vlastnosti organismu poškozeného

Toxické

jed je látka se specifickou aktivitou k definované cílové struktuře



Látky poškozující zdraví

Typy poškození

- ▶ obecně škodlivé
- ▶ toxické
- ▶ specificky toxické

Obecně škodlivé

Nějak poškozují zdraví, včetně poškození nespecifických nebo vázaných na specifické vlastnosti organismu poškozeného

Toxické

jed je látka se specifickou aktivitou k definované cílové struktuře

Specificky toxické

Praktický význam mají látky genotoxické pro některé odlišné přístupy v legislativě



Alergie

Na alergie je nutno hledět jako na zvláštní případ, kdy je citlivá pouze část populace.

Některé látky typicky alergizují, proto je vyžadováno zvláštní zacházení s nimi, ale nealergikovi bezprostřední riziko nehrozí.



Charakteristika jedů

- ▶ LD₅₀



Charakteristika jedů

- ▶ LD₅₀
- ▶ ADI



Charakteristika jedů

- ▶ LD₅₀
- ▶ ADI
- ▶ Konstrukce norem pro potraviny, spotřební koš



Znečištění ovzduší

- ▶ lokální znečištění (malé zdroje, konfigurace terénu)
- ▶ oblastní znečištění (smog)

◀ ▶ ↻ 🔍

Polétavý prach

Zdroje mohou být nejrůznější, nejčastěji doprava a některé druhy průmyslu.
Hlavní riziko spočívá v kontaminaci s chemickými látkami, schopných adice na prachová zrna.

◀ ▶ ↻ 🔍

Smog

Definice:
„smoke“ + „fog“ = „smog“

Typy smogu

◀ ▶ ↻ 🔍

Smog

Definice:
„smoke“ + „fog“ = „smog“

Typy smogu

londýnský = SO_2 , saze, další redukující látky, voda, sůl, oxidací vzniká H_2SO_4

- ▶ člověkem ovlivněné zdroje: spalování uhlí
- ▶ přírodní zdroje: mořská mlha

losangeleský = O_3 + oxidy dusíku

- ▶ člověkem ovlivněné zdroje: spalovací motory
- ▶ přírodní zdroje: vysoká intenzita a dlouhá doba expozice slunečního UV záření

◀ ▶ ↻ 🔍

Znečištění ovzduší

- ▶ lokální znečištění (malé zdroje, konfigurace terénu)
- ▶ oblastní znečištění (smog)
- ▶ globální znečištění
 - ▶ ozonová díra
 - ▶ skleníkové plyny
 - ▶ kyselá deště.

◀ ▶ ↻ 🔍

Smog

Definice:
„smoke“ + „fog“ = „smog“

◀ ▶ ↻ 🔍

Smog

Definice:
„smoke“ + „fog“ = „smog“

Typy smogu

londýnský = SO_2 , saze, další redukující látky, voda, sůl, oxidací vzniká H_2SO_4

- ▶ člověkem ovlivněné zdroje: spalování uhlí
- ▶ přírodní zdroje: mořská mlha

◀ ▶ ↻ 🔍

Londýnský smog



Příklad londýnského smogu

◀ ▶ ↻ 🔍

Ozonová díra 1

Definice:

Oslabení ozonové vrstvy nad oblastmi zemských pólů, šířící se až nad obydlené zeměpisné šířky

Faktory ovlivňující plochu a procento úbytku ozónu

- ▶ sezónní vlivy
- ▶ vzdálenost Země od Slunce
- ▶ konfigurace pevniny a moře v oblastí zeměpisných pólů
- ▶ čistota vzduchu



Ozonová díra 1

Definice:

Oslabení ozonové vrstvy nad oblastmi zemských pólů, šířící se až nad obydlené zeměpisné šířky

Faktory ovlivňující plochu a procento úbytku ozónu

- ▶ sezónní vlivy
- ▶ vzdálenost Země od Slunce
- ▶ konfigurace pevniny a moře v oblastí zeměpisných pólů
- ▶ čistota vzduchu
- ▶ ⇒ více se projevuje na jižní polokouli



Ozonová díra 1

Definice:

Oslabení ozonové vrstvy nad oblastmi zemských pólů, šířící se až nad obydlené zeměpisné šířky

Faktory ovlivňující plochu a procento úbytku ozónu

- ▶ sezónní vlivy
- ▶ vzdálenost Země od Slunce
- ▶ konfigurace pevniny a moře v oblastí zeměpisných pólů
- ▶ čistota vzduchu
- ▶ ⇒ více se projevuje na jižní polokouli

Zdravotní důsledky ozonové díry



Ozonová díra 1

Definice:

Oslabení ozonové vrstvy nad oblastmi zemských pólů, šířící se až nad obydlené zeměpisné šířky

Faktory ovlivňující plochu a procento úbytku ozónu

- ▶ sezónní vlivy
- ▶ vzdálenost Země od Slunce
- ▶ konfigurace pevniny a moře v oblastí zeměpisných pólů
- ▶ čistota vzduchu
- ▶ ⇒ více se projevuje na jižní polokouli

Zdravotní důsledky ozonové díry

- ▶ rakovina kůže



Ozonová díra 1

Definice:

Oslabení ozonové vrstvy nad oblastmi zemských pólů, šířící se až nad obydlené zeměpisné šířky

Faktory ovlivňující plochu a procento úbytku ozónu

- ▶ sezónní vlivy
- ▶ vzdálenost Země od Slunce
- ▶ konfigurace pevniny a moře v oblastí zeměpisných pólů
- ▶ čistota vzduchu
- ▶ ⇒ více se projevuje na jižní polokouli

Zdravotní důsledky ozonové díry

- ▶ rakovina kůže
- ▶ melanomy kůže



Ozonová díra 2

Příčiny ozonové díry



Ozonová díra 2

Příčiny ozonové díry

- ▶ sezónní výkyvy v proudění vzduchu



Ozonová díra 2

Příčiny ozonové díry

- ▶ sezónní výkyvy v proudění vzduchu
- ▶ fotochemické reakce v nejvyšších vrstvách atmosféry



Příčiny ozonové díry

- ▶ sezónní výkyvy v proudění vzduchu
- ▶ fotochemické reakce v nejvyšších vrstvách atmosféry
- ▶ dodávka tzv. „ozonových plynů“



Příčiny ozonové díry

- ▶ sezónní výkyvy v proudění vzduchu
- ▶ fotochemické reakce v nejvyšších vrstvách atmosféry
- ▶ dodávka tzv. „ozonových plynů“
 - ▶ freony (vybrané původně právě pro chemickou netečnost a další vhodné fyzikální a chemické vlastnosti)



Příčiny ozonové díry

- ▶ sezónní výkyvy v proudění vzduchu
- ▶ fotochemické reakce v nejvyšších vrstvách atmosféry
- ▶ dodávka tzv. „ozonových plynů“
 - ▶ freony (vybrané původně právě pro chemickou netečnost a další vhodné fyzikální a chemické vlastnosti)
 - ▶ metan (zčásti, nevíme jak velké, přírodního původu)



Příčiny ozonové díry


- ▶ sezónní výkyvy v proudění vzduchu
- ▶ fotochemické reakce v nejvyšších vrstvách atmosféry
- ▶ dodávka tzv. „ozonových plynů“
 - ▶ freony (vybrané původně právě pro chemickou netečnost a další vhodné fyzikální a chemické vlastnosti)
 - ▶ metan (zčásti, nevíme jak velké, přírodního původu)
 - ▶ minoritní podíl některých dalších látek



Skleníkové plyny


Princip

Krátkovlnnější záření pronikne na povrch Země, zahřeje ho a vzniklé dlouhovlnnější záření je pohlceno „skleníkovými plyny“ v atmosféře, zatímco pokud v ní nejsou, odešlo by volně do vesmíru i s energií, kterou obsahuje. Pohlcené zahřívá atmosféru a druhotně i Zemi.



Kyselá dešť

Z komínů odcházejí emise, které jsou reakcemi se složkami atmosféry a vlivem slunečního záření přeměňovány; na cílové oblasti pak tyto přeměněné látky dopadají jako imise



Biologická kontaminace ovzduší

Samočistící schopnosti venkovního ovzduší

- naředění** takže vdechované množství vzduchu neobsahuje nadprahové množství infekčních částic
- fyzikální ničení** především slunečním zářením
- konkurenční mikroflóra** likviduje hlavně usazené částice
- význam zeleně** mechanická filtrace + sídlo konkurenční mikroflóry



Biologická kontaminace ovzduší

Samočistící schopnosti venkovního ovzduší

- naředění** takže vdechované množství vzduchu neobsahuje nadprahové množství infekčních částic
- fyzikální ničení** především slunečním zářením
- konkurenční mikroflóra** likviduje hlavně usazené částice
- význam zeleně** mechanická filtrace + sídlo konkurenční mikroflóry

Zdroje kontaminace

- ▶ smetiště, živočišná výroba apod.
- ▶ chrání se před rozprašováním (u smetišť pýchování + krytí zeminou)
- ▶ zohledňuje se doletová vzdálenost hmyzu



