


Zevní fluoridace

metody pro použití v ordinaci

Prof. MUDr. M. Kukletová


V ordinaci

- ◆ roztoky (1 i 2%)
- ◆ profesionální pasty
- ◆ laky
- ◆ gely




Ordinace

Roztoky



fluorid sodný
fluorid cínatý
aminofluorid





NaF 2% (100x více než domácí)

SnF₂ 8 – 10%

Aminofluorid

ELMEX FLUID

1x

2x ročně



Použití

- ◆ není nutná depurace
- ◆ suché pole, osušení
- ◆ nanesení ELMEX FLUID
(pinseta, vat. smotek, event. inj. stříkačka)
- ◆ 2 min potírat, vyplivnout
!! nevyplachovat



Ordinace


Profesionální pasty


fluorid sodný

fluorid cínatý

kyselý fluorofosforečnan



- 
- ◆ k očištění povrchů
 - ◆ před aplikací fluoridů
účinnost diskutabilní
(psychologické hledisko)



Ordinace

Laky



fluorid sodný

fluorosilan

monofluorofosforečnan sodný





DURAPHAT 2,26%

FLUOR PROTECTOR 0,1%

DIFLUENA

stejné použití jako u roztoků

pomocí flosu do prostoru mezi zuby

- ◆ Ipí delší dobu na povrchu zubu
- ◆ déle trvající uvolňování F
(měsíce)

!!! užít až po skončení ošetřování,
alespoň po hlavním jídle

Ordinace


Gely



aminfluorid

kyselý fluorofosforečnan

fluorid sodný




Použití

- ◆ zubní kartáček
- ◆ lžice (optimální)

2x ročně
4x ročně

vhodná velikost,
co nejmenší množství





Fluoridace v ordinaci




ELMEX GELÉE 1,23 – 1,25%

PROTECT GEL 1,23

(thixotropní)

FLUORIDIN GEL N5

(thixotropní)

- 
- ◆ není nutné sušit
 - ◆ lze zavádět obě lžičky najednou
 - ◆ 1 min nebo 3-4 min
 - ◆ vyplivnout zbytek
 - ◆ nevyplachovat (nejíst, nepít)
do 30 min