

**Faktory ovlivňující účinek léčiv  
Nežádoucí účinky  
Výzkum a vývoj nových léčiv**

Mgr.Petra Amchová, Ph.D.  


M U N I  
M E D

# Faktory ovlivňující účinek léčiva




# Rozdělení faktorů

**Vztahující se k léčivému přípravku**



**Vztahující se k nemocnému**



**Vztahující se k léčivému přípravku i k nemocnému**





# Fyzikální a chemické vlastnosti léčiva

- ✓ **CHEMICKÁ KONFIGURACE** (velikost a tvar molekul)
- ✓ **ROZPUSTNOST V TUCÍCH**
- ✓ **ACIDOBAZICKÉ VLASTNOSTI** (disociační konstanta pK)
- ✓ **STEREOIZOMERIE**

Rozhodují o:

- specificitě (*vazba na konkrétní struktury*)
- prostupu přes membrány ->vhodná léková forma
- farmakokinetických parametrech léčiva (u některých látek)



# Chemická konfigurace

## velikost a tvar molekuly


Většina terapeuticky používaných léčiv – molekulová hmotnost mezi 100 – 1000 Da

## Prostup přes membránu

- malé polární molekuly bez náboje - ANO
- větší nabité molekuly a ionty - POUZE spřažený transport, transportérové systémy, iontové kanály
- velké proteiny - POUZE transportérové systémy závislé na ATP




# Nepatrná změna v chemické struktuře vede k významné změně v účinku léčiva



**noradrenalin**

- účinky převážně  $\alpha$ -mimetické



**isopropylnoradrenalin**

účinky převážně  $\beta_1$  a  $\beta_2$  mimetické



# Rozpustnost v tucích/ve vodě

## Látky hydrofilní

- dobře se vstřebávají z GIT
- příliš se **neváží na plazmatické bílkoviny**
- vylučují se většinou ledvinami

## Látky lipofilní

- hůře se vstřebávají z GIT, ale dobré kůží nebo sliznicemi
- lepší prostup přes membrány
- procházejí i HEB
- obvykle se více **váží na plazmatické bílkoviny**
- podléhají metabolismu v játrech, aby se staly hydrofilní



# Acidobazické vlastnosti


- většina léčiv jsou slabé báze/kyseliny, vyskytuje se tedy buď v **ionizované** nebo **neionizované** formě
- membránami lépe pronikají léčiva v **neionizované** formě
- absorbce, distribuce i exkrece jsou závislé na **pH**

**Disociační konstanta  $pK$**  = hodnota pH, při které je přesně polovina molekul léčiva ionizovaná a polovina neionizovaná



# Stereoizomerie (chiralita, optická izomerie)

- tzv. **opticky aktivní C** (chirální uhlík)- výskyt ve formě svých zrcadlových obrazů
- mohou mít rozdílné účinky (žádoucí/nežádoucí): jejich afinita k cílovým strukturám se může lišit
- některá léčiva mohou být ve formě racemátu (směs), jiné ve formě čistých enantiomerů (S, R)






# Léková forma, aplikáční způsoby

- Farmaceutická dostupnost = jaký podíl z podané dávky je k dispozici pro absorpci  
Technologické vlastnosti – např. rozpadavost tablety
- **Biologická dostupnost** = jaký podíl z podané dávky se absorbuje do krevního oběhu

Lékové formy - generace



# Věk



## Kvantitativní odlišnosti

- hmotnost, povrch těla, obsah vody v těle, odlišná distribuce, metabolická aktivita

## Kvalitativní odlišnosti

- enzymy, endokrinní vybavenost, imunitní systém, nezralost HEB

**ANTIHISTAMINIKA** vyvolají sedaci, ospalost, únavu X u dítěte k stimulaci CNS, neklid a křeče

**KYS. ACETYLSALICYLOVÁ** – rozvoj Reyova syndromu



# Pohlaví

**Ženy mívají nižší hmotnost a vyšší procento tělesného tuku než muži -> rozdíly v kinetice léčiv**

**TESTOSTERON** je induktorem některých P450 -> intenzita biotransformačních procesů je u mužů **vyšší** než u žen -> **ženy mají vyšší citlivost k toxickým účinkům léčiv**

**ESTROGENY** kolísají během menstruačního cyklu, snižují se v klimaktériu, zvyšují v graviditě -> ovlivnění nejen kinetiky, ale i dynamiky někt. léčiv (např. vyšší citlivost CNS na psychostimulancia, olanzapin má u žen nižší clearance)

# Těhotenství

- **Zvýšený** obsah tělesné vody až o 8 litrů
- **Zvýšený** objem plazmy
- **Zvýšený** průtok ledvinami a vzestup GFR
- **Hypoalbuminémie** a zvýšená vazba hormonů na plazm. proteiny
- Zpomalená žaludeční a střevní motilita
- Ovlivnění jaterních enzymů

# Těhotenství

## Přestup léčiva přes placentu

- Molekulová hmotnost (pod 1000 Da volný prostup)
- Vazba na plazmatické proteiny
- Lipofilita /hydrofilita

### Kdy žádoucí:

**DIGOXIN** – léčba supraventrikulární tachykardie plodu

**Některá antibiotika** - léčba infekce plodu (*Streptococcus agalactiae*)

# Těhotenství

## ~~Klasifikace léčiv z hlediska teratogenity - FDA~~

A –léky, které jsou otestované na souboru těhotných žen bez zjištěné teratogenity

B – léky, které jsou otestované na zvířatech bez zjištěné teratogenity

C – léky, které jsou ~~teratogenní u zvířat~~, u lidí se neví

D – léky, které jsou ~~teratogenní u lidí~~, ALE je možno je podat v kritických stavech pro jejich nenahraditelnost (*imunosupresiva, antiepileptika, cytostatika*)

X – léky, u nichž riziko převažuje nad prospěchem

Nově registrovaná léčiva: hodnocení je slovní, je uvedeno v SPC a týká se :

- **reprodukčního potenciálu mužů a žen** (vliv na fertilitu)
- **gravidity**
- **kojení**

# Laktace – přestup léčiv do mléka

- Léčiva s nižší MH (<500 Da)
- Léčiva rozpustná v tucích
- Léčiva s menší vazbou na plazmatické bílkoviny
- Léčiva s vyšším pK
  - Mléko je oproti plazmě slabě kyselé (7,0-7,1)

**Slabé kyseliny** v plazmě ionizovány – přestupují do MM HŮŘE

**Slabé báze** přestupují **SNADNĚJI** (alkaloidy, kofein, metronidazol,  
– lithium)

# Hmotnost a těl.konstituce



- dávkování bývá vztaženo na hmotnost (mg/kg, mg/kg/věk) ALE není upraveno např. pro osoby kachektické nebo obézní

**O kinetice LL rozhoduje množství těl. vody, tuku a svalstva**

- Obézní - zvýšit dávku lipofilních léčiv vážících se na tukovou tkáň (benzodiazepiny)
- Svalnatý jedinec - vyšší dávky léčiv vážících se na sval nebo ovlivňujících nervosvalovou ploténku (myorelaxancia)

# Cirkadiánní rytmus



## CHRONOFARMAKOLOGIE

=oblast farmakologie zabývající se souvislostmi mezi účinkem léků, metabolismem léků a časem jejich podání s ohledem na biorytmy


- také studuje biorytmy a patofyziologické děje (horečka v pozdním odpoledni, astmatické záchvaty v noci nebo těsně nad ráнем, jaro/podzim-ulcerozní kolitida, fototoxicita v létě)

**VNS, KVS, jaterní a renální funkce, hormony jsou pod vlivem cirkadiánních rytmů**



# Patologický stav, komorbidity

- rozhoduje o volbě léčiva, lékové formy, dávkování léčiva
- může být **podmínkou účinku** – např. horečka a antipyretika
- ovlivňuje **dynamiku i kinetiku** léčiva
- **KI** a relativní KI:
  - β-blokátory a bradykardie, blokády vedení vzruchů v ❤
  - parasympatolytika a glaukom
  - glukokortikoidy a vředová choroba
- ovlivnění **absorpce** – sliznice GIT
- patologie **eliminačních orgánů**:
  - postižení jater, ledvin
  - možnost intoxikace – nutnost úpravy dávkování
  - možnost nedostatečného účinku – proléčiva






# Genetické faktory

- bodové mutace zdrojem kinetické i dynamické **variability**

**genetický polymorfismus** – mutace zastoupená v populaci s frekvencí 1 % a vyšší

- stanovení genotypu (PCR)
- stanovení fenotypu (podání látky, detekce metabolitů)





# Dávka léčiva

**DOSIS THERAPEUTICA** – singula, pro die DTS, DTD

**DOSIS MAXIMA** – singula, pro die DMS, DMD

# Opakované podávání



- zesílení nebo zeslabení odpovědi na léčivo
- léková závislost

**Kumulace léčiva** – krátké intervaly mezi dávkami, které neodpovídají biol. poločasu

**Senzitizace** – zvýšená citlivost na léčivo po dlouhodobém užívání

**Tolerance** – nutnost zvyšovat dávku pro zachování účinku

**Tachyfylaxe** – zeslabení účinku po dobu setrvávání léčiva v organismu (např. nitroglycerin)



# Kombinace léčiv

## SYNERGISMUS

### **Sumace** (součet)

- kombinace analgetik, cytostatik, antihypertenziv

### **Potenciace** (více než součet)

- digoxin a thiazidová diureтика
- některá ATB

## ANTAGONISMUS

### **Na úrovni receptorů**

(farmakologický)

### **Fyziologický**

GKK a inzulín

### **Chemický**

Heparin a protamin sulfát

Pozor na LÉKOVÉ INTERAKCE

# Současně podávaná potrava

## Absorbce

- **zpomalení** - při současném podání léčiva a potravy
- Zvýšení – léčiva pomalu uvolňující LL
  - léčiva lipofilní spolu s vitaminami rozp.v tucích

Podávání léčiv **na lačno**: 0,5 – 1 h před jídlem, 1 – 3 h po jídle



## Snížení biologické dostupnosti


- Tetracykliny + mléčné výrobky
- Fluorochinolony + mléčné výrobky
- Železo + černý čaj

Ovlivnění clearance - změna pH moče

## Farmakodynamická interakce

- Warfarin + vitamin K

# Nežádoucí účinky léčiv



# Nežádoucí účinky léčiv

- = odezva na léčivý přípravek, která je **nepříznivá** a **nezamýšlená**
  - mohou způsobovat všechna léčiva
  - přínosy > riziko poškození
  - klasifikace NÚ:
    - Dle charakteru
    - Dle četnosti
    - Dle povahy
    - ...

# Různá klasifikace nežádoucích účinků

## dle frekvence výskytu

- Předvídatelné
- Nepředvídatelné
- závislé na dávce
- nezávislé na dávce

- **Velmi časté** (více než 1/10 pacientů)
- **Časté** (více než 1/100 pacientů)
- **Méně časté** (1/100 až 1/1 000 pacientů)
- **Vzácné** (1/1 000 až 1/10 000 pacientů)
- **Velmi vzácné** (1 na více než 10 000 pacientů)

## dle povahy

- známý
- dosud nepopsaný

- **A – augmented** souvisí s hlavním účinkem, závislé na dávce
- **B – bizarre** často je příčinou genetická změna, nezávisí na dávce
- **C – continuous** dané dlouhodobým užíváním léčiva
- **D – delayed** vyskytují se se zpožděním měsíců i let
- **E – end of use** objevují se po ukončení užívání léčiva

## dle charakteru

- Očekávané x Neočekávané
- Závažné – ohrožující život, vyžadující hospitalizaci, až končící smrtí

# NÚ - typ A (augmented)

- Vystupňování účinku léčiva až do toxicity
- 95 % všech NÚ léčiv
- Shodný mechanismus → **předvídatelnost + závislost na dávce**
- **Podání vysoké dávky:**
  - Předávkování antihypertenzivem → hypotenze
  - Předávkování antikoagulanciem → krvácení
- **Omezení eliminační schopnosti organismu:**
  - Předávkování při onemocnění jater ( $\downarrow$  metabolismu,  $\downarrow$  exkrece)
  - Předávkování při onemocnění ledvin ( $\downarrow$  exkrece)

# NÚ - typ B (bizzare)

Nezávislé na dávce a MÚ léčiva → **nepředvídatelnost**

Příčina: **genetické/imunologické pozadí** jednotlivce

**Idiosynkrazie** = kvalitativně odlišná reakce na léčivo

Mutace v genech pro enzymy, imunologické odlišnosti

Objeví se po **první** dávce léčiva

**Alergická reakce:**

Po opakováném podání léku (senzibilizace)

Interakce antigen-protilátka → humorální/buněčná odp.

Přítomnost protilátek v plazmě

**Nízká morbidita, ale vysoká mortalita**

# NÚ – typ C (chronic, continuous)

- Vyvolány **dlouhodobým užíváním** léčiva
- Vznik patologického stavu, navození tolerance, ev. závislosti

Příklady:

- Nesteroidní antiflogistika → nefropatie
- Nesteroidní antiflogistika → gastroduodenální vředy
- Opioidní analgetika → tolerance, závislost

# NÚ – typ D (delayed)

- Projevují po delší době latence nebo až u potomků léčených pacientů
- Zásahy do DNA, ireverzibilní změny

**Mutageneze** = genotoxicita, poškození DNA


**Teratogeneze** = poruchy prenatálního vývoje, vrozené vady

**Kancerogeneze** = vznik nádorového onemocnění

# NÚ – typ E (end of use)

- Projeví se při ukončení podávání účinné látky
- **Abstinencní syndrom** – látky vyvolávající závislost
- „**Rebound fenomén**“ – zhoršení pův. obtíží po vysazení léčiva nejčastěji z důvodu změny počtu/aktivity receptorů
  - Betablokátory – hypertenzní krize
  - $\beta$ 1-sympatomimetika – otok nosní sliznice
  - Antiepileptika – epi záchvat

# Systém hlášení nežádoucích účinků



**1. Informace o hlásícím**

Jméno a adresa osoby podávající hlášení  
(důvěrná informace - SÚKL nediskuje jiným subjektům) \_\_\_\_\_

Razítka:

den      měsíc      rok  
Datum tohoto hlášení      2 | 0 |

Hlášeno také držitele       ANO       NE  
Zdravotnický pracovník       ANO       NE

**2. Informace o pacientovi a nežádoucím účinku**

**INFORMACE O PACIENTOVÍ**

Initialy pacienta \_\_\_\_\_

Pohlaví       muž       žena

Datum narození      den      měsíc      rok

Věk      den      měsíc

Nástup reakce      den      měsíc      rok

**VYZNAČTE VSE, CO ODPOVIDÁ ZACHYCENÉ REAKCI**

- Pacient zemřel      den      měsíc      rok  
 Došlo k ohrožení života  
 Nežádoucí účinek byl důvodem hospitalizace nebo jejího prodloužení  
 Vznikly trvalé následky  
 Vrozená vada / perinatální poškození  
 Jiná lékařsky významná událost

Popis nežádoucího/cíh účinku/ů

Výsledky souvisejících vyšetření (včetně dat provedení)

Další podstatné anamnestické údaje

**3. Informace o léčivu / léčivech**




# Výzkum a vývoj nových léčiv

<http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html>



# Životní cyklus léčivého přípravku



Laboratorní  
výzkum

Preklinické  
hodnocení

Klinické  
hodnocení

Registrace

Propagace

Farmakovigilance




# 1. Farmaceutický výzkum a vývoj nových léčiv

- Na počátku je nutno vybrat vhodnou látku a připravit vhodnou lékovou formu.
- Klíčové je odhadnout účinky dané látky a její případnou toxicitu
- K tomu používáme odborné databáze, literaturu, „in silico“ testování - testování v PC, kdy počítač je např. schopen testovat interakce různých molekul
- Všechny nadějně molekuly procházejí screeningovými testy, kterými se dá zjistit např., na který systém v organismu látka působí, jakou bude mít vazbu na různé receptory...



# Potenciální léčiva jsou převážně vyhledávána:

- **Syntézou** analogů přirozeně se vyskytující látek (hormonů, mediátorů...)
- **Modifikací** struktury známých léčiv
- **Náhodným testováním** přirozených látek většinou živočišného nebo rostlinného původu
- Vyhledáváním **nových účinků** u již používaných léčiv




## 2. Preklinické hodnocení



= testování léčiv **in vitro** a na **zvířatech** s cílem **předpovědět terapeutický účinek a toxicitu potenciálního léčiva pro použití u člověka**

- Akutní toxicita - po jednorázovém podání
- Chronická toxicita – po opakovaném podání
- Toxikokinetika - osud toxinu v organismu
- Bezpečnostní farmakologie – popis nežádoucích účinků (NÚ) na jednotlivé orgánové systémy, odhad možných NÚ u člověka
- Specifické toxikologické testy: karcinogenita, genotoxicita, reprodukční toxicita, lokální toxicita, fototoxicita...



Talidomid - Contergan

sulfanilamide using diethylene glycol (DEG) as a solvent



### **3. Klinické hodnocení**

= systematické testování 1 nebo několika hodnocených léčivých přípravků s cílem ověřit bezpečnost nebo účinnost léčivého přípravku. Je prováděno na subjektech hodnocení za účelem:

1. zjistit nebo ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky
2. stanovit nežádoucí účinky
3. studovat absorpci, distribuci, metabolismus nebo vylučování

(Zákon o léčivech 378/2007 Sb.)


# Na kom je prováděno?

- Subjekt hodnocení - zdravý dobrovolník
  - pacient



# Kdo ho zadává a provádí?

- Zadavatel (sponzor) - fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za zahájení, řízení, popřípadě financování klinického hodnocení
- Zkoušející - lékař, který odpovídá za průběh klinického hodnocení v daném místě



# Informovaný souhlas pacienta

Já, níže podepsaný/á dobrovolně a svobodně souhlasím s účastí v klinickém hodnocení „.....“.

Povaha, cíl, rozsah a doba trvání této klinické studie mi byly řádně a srozumitelně vyšetřujícím lékařem vysvětleny.

Moje účast v této studii nebude nijak ovlivňovat moji další léčbu či pobyt ve zdravotnickém zařízení. Měl/a jsem možnost zeptat se na všechny nevyjasněné otázky. Obdržel/a jsem uspokojivou odpověď a plně rozumím všem informacím, kterých se mi dostalo.


S výsledky provedeného vyšetření bude zacházeno jako s citlivými údaji, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti a ochrany dle příslušných právních předpisů. V případě, že jich bude použito pro publikační účely, budou zveřejněny anonymně.

Jsem si vědom/a, že z projektu mohu kdykoliv odstoupit, aniž to bude mít jakýkoliv vliv na moji další léčbu.

Jméno pacienta: ..... Datum: ..... Podpis pacienta: .....

Jméno lékaře zodpovědného za provádění studie: ..... Datum: ..... Podpis lékaře: .....

# Fáze a trvání klinického hodnocení



# Fáze klinického hodnocení - I. fáze:

- První podání člověku
- Hodnotí se **bezpečnost, toxicita a farmakokinetika**
- **Zdraví dobrovolníci, případně pacienti** (tam kde jsou léčiva poměrně toxická)
- jednotky až desítky pacientů
- **Navrhuje se dávka a dávkovací schéma pro 2. fázi**
- Hodnotí se mechanismus působení

## Fáze klinického hodnocení - II. fáze :

- Pilotní studie
- 1. podání pacientům v předpokládané indikaci
- účinek, NÚ, farmakokinetika po opakovaném podání
- indikace x KI
- informovaný souhlas
- 100 a více pacientů
- bez finanční odměny

## Fáze klinického hodnocení - III. fáze:

- srovnává se účinnost a bezpečnost hodnoceného přípravku se **standardem** (nebo placebem) = kontrolovaná klin.studie
- ke konci III. fáze je nutno připravit dokumentaci k registraci (SPC, PIL)
- pacienti – stovky až tisíce
- single/double blind, randomizace, multicentrické hodnocení


## Fáze klinického hodnocení - IV. fáze:

- postregistrační studie, 5 let od registrace
- Ověřují se účinky a bezpečnost v přípravku v „reálném“ použití na **velkých a různorodých skupinách lidí** (vlivy jako interakce, chyby v užívání, projevení vzácných nežádoucích účinků...)
- Porovnání se standardem
- Možnost stažení z trhu

# 4. Registrace

= udělení povolení k uvedení léčiva na trh

- Na jedné straně je **SÚKL** = schvalovatel
- Na druhé straně je **budoucí držitel rozhodnutí o registraci**  
(většinou výrobce) = žadatel
- Předkládání dokumentů včetně **SPC**



# 5. Farmakovigilance


- Farmakon (řeck.) = léčivý přípravek
- Vigilare (lat.) = bdít

**Dohled nad léčivými přípravky směřující k zajištění bezpečnosti a co nejpříznivějšího poměru rizika a prospěšnosti léčivého přípravku**

- > detekce
- > zhodnocení
- > porozumění
- > prevence NÚ

# Vývoj léku

50 000 – nové látky



5 000 – testy in vitro

500 – testy in vivo

5 – klinické hodnocení

1 – použití v klinické praxi

Náklady na vývoj: cca 800 mil USD

Doba vývoje: **10 – 15 let** nový přípravek,  
cca 5 let generikum a „me too“

Úspěšnost: 0,005 - 0,001 %

