


KOSTERNÍ, SRDEČNÍ A HLADKÝ SVAL

Tato prezentace obsahuje pouze stručný výtah nejdůležitějších pojmu a faktů. V žádném případně není sama o sobě dostatečným zdrojem pro studium ke zkoušce z Fyziologie.

KOSTERNÍ, SRDEČNÍ A HLAĐKÝ SVAL



- **Strukturální charakteristické vlastnosti**
- **Elektrická a mechanická aktivita**
- **Molekulární mechanizmy kontrakce**
- **Biofyzikální vlastnosti svalů**
- **Mechanizmy stupňování a modulace kontrakce**
- **Přehled charakteristických vlastností kosterního, srdečního a hladkého svalu**



KOSTERNÍ SVAL

sarkolema

SRDEČNÍ SVAL

interkalární disky

HLADKÝ SVAL

(cévní systém, dýchací cesty,
gastrointestinální a
urogenitální systém)

ELEKTRICKÉ SPOJE „GAP JUNCTIONS“

ZÁKLADNÍ STRUKTURÁLNÍ ELEMENTY FUNKČNÍHO SYNCYTIA


CONEXON 1

„gap“ (mezera)
(extracelulární prostor)


CONEXON 2

MYOKARD

HLADKÝ SVAL




pH
 $[Ca^{2+}]_i$
membránové napětí



KOSTERNÍ, SRDEČNÍ A HLAĐKÝ SVAL

- Strukturální charakteristické vlastnosti
- ➡ ● Elektrická a mechanická aktivita
- Molekulární mechanizmy kontrakce
- Biofyzikální vlastnosti svalů
- Stupňování a modulace kontrakce
- Přehled charakteristických vlastností kosterního, srdečního a hladkého svalu




HLADKÝ SVAL

SPUŠTĚNÍ A MODULACE MECHANICKÝCH ODPOVĚDÍ

**VELKÁ ROZMANITOST
V ELEKTRO-MECHANICKÝCH VZTAZÍCH**





pomalé nepravidelné polarizační vlny s AP

POMALÉ VLNY V KONTRAKCI
(GIT)

↑ frekvence AP

TETANICKÝ STAHL

(ureter, ductus choledochus, uterus)

pomalé změny v polarizaci membrány

POMALÉ ZMĚNY V TONU SVALU

(např. m. ciliaris, iris, arterioly)

konstantní membránové napětí

POMALÉ ZMĚNY V TONU
(svalovina krevních cév)

NEUROHUMORÁLNÍ STIMULACE
(hlavně vazby LIGAND-RECEPTOR)

HLADKÝ SVAL

MECHANICKÉ ODPOVĚDI mohou být spuštěny/modulovány

- různými typy elektrické aktivity

ELEKTRO-MECHANICKÁ VAZBA

(nepravidelná pacemakerová aktivita)

ELEKTRICKÁ STIMULACE

- různými typy NEUROHUMORÁLNÍ STIMULACE -

NEUROTRANSMITERY (*acetylcholin, noradrenalin, ...*)

NERVOVÁ STIMULACE

HORMONY (např. *progesteron, oxytocin, angiotensin II, ...*)

LOKÁLNÍ TKÁŇOVÉ FAKTORY (*NO, adenosin, P_{CO2}, P_{O2}, pH, ...*)

HUMORÁLNÍ STIMULACE

- NATAŽENÍM SVALU (Ca²⁺- iontové kanály aktivované natažením)


MECHANICKÁ STIMULACE

KOSTERNÍ, SRDEČNÍ A HLADEKÝ SVAL

- Strukturální charakteristické vlastnosti
- Elektrická a mechanická aktivita
- ● Molekulární mechanizmy kontrakce
- Biofyzikální vlastnosti svalů
- Stupňování a modulace kontrakce
- Přehled charakteristických vlastností kosterního, srdečního a hladkého svalu

PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ SVAL

základní složky kontraktilelního systému



MYOZINOVÉ FILAMENTUM

MOLEKULA MYOZINU II



- vazebné místo pro AKTIN
- vazebné místo pro ATP
 $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$

AKTINOVÉ FILAMENTUM

REGULAČNÍ PROTEINY

TROPOMYOSIN-TROPONINOVÝ KOMPLEX

PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ SVAL




- Fibronectin and fibronectin/immunoglobulin repeats
- PEVK-enriched sequences
- Unique sequences
- Immunoglobulin domains
- Kinase domain

PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ SVAL


ELEMENTÁRNÍ CYKLUS KONTRAKCE A RELAXACE

MOLEKULÁRNÍ ÚROVEŇ



PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ SVAL


ELEMENTÁRNÍ CYKLUS KONTRAKCE A RELAXACE MOLEKULÁRNÍ ÚROVEŇ



PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ SVAL

ELEMENTÁRNÍ CYKLUS KONTRAKCE A RELAXACE

MOLEKULÁRNÍ ÚROVEŇ





KONTRAKCE

- přítomnost ATP
- $\uparrow [\text{Ca}^{2+}]_i$

RELAXACE

- přítomnost ATP
- $\downarrow [\text{Ca}^{2+}]_i$

PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ SVAL




Animace modelu interakce hlavy myozinu a aktinového filamenta („ pádlování “)

MYOZIN – MOLEKULÁRNÍ MOTOR

Využívá chemickou energii uvolněnou hydrolýzou ATP a přeměňuje ji v pohyb (mechanickou práci)


komplex
troponin–tropomyozin

HLADKÝ SVAL



POMALÉ IZOFORMY
➤ myozinové ATPázy
➤ transportních systémů Ca²⁺

ORGANIZACE CYTOSKELETU A MYOFILAMENTU



● DT - denzní tělíska
analogie Z linií

II elektrické spoje

TROPONIN CHYBÍ !!

REGULAČNÍ PROTEINY

TROPOMYOZIN


KALMODULIN (TNC)

KALPONIN

KALDESMON

HLADKÝ SVAL

KALMODULIN



Ca^{2+} /KALMODULIN-MLCK komplex
aktivovaná MLCK

2 ÚLOHY KOMPLEXU Ca^{2+} -KALMODULIN

TROPONIN není přítomný

KLIDOVÝ STAV

Ca^{2+} -KALMODULIN komplex

Ca^{2+} /KALMODULIN-MLCK
aktivovaná MLCK

(P) LEHKÝCH ŘETĚZCŮ MYOZINU


Ca^{2+} -KALMODULIN-kalponin komplex

INTERAKCE MYOZINU S AKTINEM

VARIANTY KONTRAKCE BUŇKY HLAĐKÉHO SVALU

1

FÁZOVÁ VARIANTA KONTRAKCE - režim opakovaných cyklů



- **P** lehkých regulačních řetězců myozinu je předpokladem **FÁZOVÉ** složky kontrakce
- **ATP** se spotřebovává



2

TONICKÁ VARIANTA KONTRAKCE - zablokovaný můstek



Defosforylace lehkých řetězců myozinu ve stavu KONTRAKCE při ↑MLCP

zpomalení DISOCIACE M.A komplexu

→ PRODLOUŽENÁ TONICKÁ kontrakce


ATP se šetří



HLADKÝ SVAL

1

FÁZOVÁ VARIANTA KONTRAKCE - režim opakovaných cyklů




Adaptováno podle Berne and Levi (2004)

12a

HLADKÝ SVAL

2

TONICKÁ VARIANTA KONTRAKCE - zablokovaný můstek



↓ MLCK* / MLCP


DEFOSFORYLACE
lehkých řetězců myozinu
VE STAVU KONTRAKCE

M.A dissociace probíhá
velmi pomalu i při ATP

TONICKÁ KONTRAKCE
modu zablokovaného můstku
“latch bridge”

ATP
se šetří

↑ MLCK* / MLCP



KOSTERNÍ, SRDEČNÍ A HLAĐKÝ SVAL

- Strukturální charakteristické vlastnosti
- Elektrická a mechanická aktivita
- Molekulární mechanizmy kontrakce
- ● Biofyzikální vlastnosti svalů
- Stupňování a modulace kontrakce
- Přehled charakteristických vlastností kosterního, srdečního a hladkého svalu

IZOMETRICKÁ A IZOTONICKÁ KONTRAKCE

KOSTERNÍ SVAL

KLIDOVÁ TENZE

IMK

IZOMETRICKÁ kontrakce

při KONSTANTNÍ DÉLCE
měří se změny v TENZI

ITK

IZOTONICKÁ kontrakce

při KONSTANTNÍ TENZI
měří se změny DÉLKY

AUXOTONICKÁ kontrakce

SRDEČNÍ SVAL


IZOVOLUMICKÁ FÁZE (IZOMETRICKÁ)

EJEKČNÍ FÁZE (IZOTONICKÁ) AUXOTONICKÁ

HLADKÝ SVAL

TONICKÁ KONTRAKCE (*tonus krevních cév*)

FÁZOVÁ KONTRAKCE (*kontrakce moč. měchýře*)



KE - kontraktile elementy


PE, SE – paralelní a sériová elasticita
(s kontraktilemi elementy)

PE – extracelulární a intracelulární elasticke komponenty (*titin* spojující M a Z linie)

SE - fibrózní tkáň úponu šlachy

ZÁVISLOST TENZE NA PROTAŽENÍ SVALU

KOSTERNÍ SVAL



PASIVNÍ tenze

tenze při postupném natahování nestimulovaného svalu (**ELASTICKÁ KOMPONENTA**)


CELKOVÁ tenze

IZOMETRICKÁ kontrakce (stimulovaného svalu)
při postupně se prodlužující **počáteční délce**

AKTIVNÍ tenze

rozdíl mezi **CELKOVOU** a **PASIVNÍ** tenzí - tenze tvořená **interakcí KONTRAKTILNÍCH elementů** (úměrná počtu vytvořených příčných můstků)

AKTIVNÍ TENZE příčně pruhovaného svalu v závislosti na POČÁTEČNÍ DĚLCE (PROTAŽENÍ) SARKOMERY



HLADKÝ SVAL

HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY

- **VÝRAZNÁ ROZTAŽNOST**

(např. myocyty **močového měchýře** se mohou natáhnout až na **200%**, myocyty **uteru** až na **1000%** na konci těhotenství ve srovnání s původní délkou svalové buňky)

- **PLASTICITA**

U myocytů hladké svaloviny **není přímý vztah** mezi **DĚLKOU** a **TENZÍ**. **Zvýšená tenze** po natažení téměř okamžitě spontánně **poklesne**

U dutých orgánů (*gastrointestinální trakt, močový měchýř, ...*)
obdobný vztah mezi OBJEMEM a TLAKEM






PLASTICITA HLDKÉHO SVALU

CYSTOMETROGRAM

močový měchýř

IZOLOVANÝ MYOCYT (jejunum člověka)



spuštění reflexu mikce

$$P = 2T/r$$

LAPLACEŮV ZÁKON

elektrofyziologická měření



Ca^{2+} -kanály aktivované natažením „stretch-activated channels“

$I_{Ca ms}$ ↓ DEPOLARIZACE




K^+ -kanály aktivované $[\text{Ca}^{2+}]_i$

$$I_{KCa}$$


REPOLARIZACE

↑ TONUS



↓ TONUS

$$\downarrow [\text{Ca}^{2+}]_i$$



PLASTICITA


KOSTERNÍ, SRDEČNÍ A HLADEKÝ SVAL

- **Strukturální charakteristické vlastnosti**
- **Elektrická a mechanická aktivita**
- **Molekulární mechanizmy kontrakce**
- **Biofyzikální vlastnosti svalů**
- ● **Stupňování kontrakce**
- **Charakteristické rysy kosterního,
hladkého a srdečního svalu**

KOSTERNÍ SVAL

HLAVNÍ FAKTORY STUPŇOVÁNÍ KONTRAKCE

- ↑ FREKVENCE EXCITACÍ v motorickém neuronu ⇒
→ FREKVENČNÍ SUMACE kontrakcí ve svalových buňkách
(TETANICKÁ KONTRAKCE)
- PROSTOROVÁ SUMACE - nábor ↑ počtu aktivovaných
MOTORICKÝCH JEDNOTEK (při zvýšeném volném úsilí)




KOSTERNÍ SVAL

GRADACE KONTRAKCE PŘI ZVYŠUJÍCÍ SE FREKVENCI STIMULACE

IZOLOVANÁ SVALOVÁ BUŇKA

OBLAST SUMACE



SRDCE

HLAVNÍ FAKTORY STUPŇOVÁNÍ KONTRAKCE

- ↑ **DIASTOLICKÁ NÁPLŇ KOMOR („preload“)** ⇒
↑ kontrakce komor, která je úměrná natažení kardiomyocytů na konci diastoly

FRANK-STARLINGŮV ZÁKON

- ↑ **FREKVENCE ELEKTRICKÉ AKTIVITY** srdečních buněk při modulaci *pacemakerové aktivity SA uzlu* ↑ *tonem sympatiku* ⇒ pozitivní **FREKVENČNÍ EFEKT**
- Vazba **LIGAND-RECEPTOR** s následující intracelulární sekvencí dějů ⇒ ↑[Ca²⁺]_i (noradrenalin, adrenalin, tyroxin, ...)



↑ [Ca²⁺]_i

HLADKÝ SVAL

HLAVNÍ FAKTORY STUPŇOVÁNÍ KONTRAKCE / TONU

- **DEPOLARIZACE MEMBRÁNY** (i bez spuštění akčních napětí)
⇒ aktivace napěťově závislých Ca^{2+} kanálů ⇒ $\uparrow [\text{Ca}^{2+}]_i$
- **FAKTORY NA POLARIZACI MEMBRÁNY NEZÁVISLÉ**
 - Vazba **ligand-receptor** s následující aktivační kaskádou ⇒ $\uparrow [\text{Ca}^{2+}]_i$
(např. aktivace PLC ⇒ $\uparrow \text{IP}_3$ ⇒ uvolnění Ca^{2+} ze SR)
 - **Protažení svalových buněk** ⇒ otevření Ca^{2+} kanálů **aktivovaných protažením membrány** („*stretch channels*“) ⇒ $\uparrow [\text{Ca}^{2+}]_i$



$\uparrow \text{Ca}^{2+}\text{-kalmodulin}$


KOSTERNÍ, SRDEČNÍ A HLADKÝ SVAL

- **Strukturální charakteristické vlastnosti**
 - **Elektrická a mechanická aktivita**
 - **Molekulární mechanizmy kontrakce**
 - **Biofyzikální vlastnosti svalů**
 - **Stupňování kontrakce**
- ● **Přehled charakteristických vlastností kosterního, srdečního a hladkého svalu**

KOSTERNÍ SVAL

HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- **Mnohojaderné dlouhé cylindrické buňky** (max. 20 cm)
- **Bohatě vyvinuté sarkoplazmatické retikulum**
- **Pravidelné uspořádání myozinových a aktinových filament do sarkomer (*příčné pruhování*)**
- **Aktivita silně závislá na nervovém zásobení** (přenos vzruchu **motorickou ploténkou**)
- Svalová vlákna **nejsou** navzájem propojena (žádné „gap junctions“)
- Motorické neurony se větví pro inervaci většího počtu buněk; (**motorická jednotka** definována jako jeden motorický neuron inervující 5-1000 buněk)
- Sumace kontrakcí při vysoké frekvenci excitace (**tetanus**)
- Aktivita pod **volní kontrolou**



TYPY MYOCYTŮ KOSTERNÍCH SVALŮ

TYP I

POMALÝ - ČERVENÝ

např. zádové svaly, *m. soleus*

- Pomalé kontrakce (zajišťující většinou postoj těla)
- Pomalé motorické jednotky s motorickými neurony s nižší rychlostí vedení impulzů (menší průměr)

Převážně AEROBNÍ METABOLIZMUS a ↑ ODOLNOST PROTI ÚNAVĚ

TYP II

RYCHLÝ (ČERVENÝ / BÍLÝ)

např. okohybné svaly,
svaly rukou

- Krátkodobé stahy pro jemné rychlé cílené pohyby
- Rychlé motorické jednotky s motorickými neurony s velkou rychlostí vedení vzruchů (větší průměr)

TYP IIa (RYCHLÝ-ČERVENÝ) a TYP IIb (RYCHLÝ-BÍLÝ)

Poměr AEROBNÍHO a ANAEROBNÍHO (glykolýza) METABOLIZMU určuje NÁCHYLNOST K ÚNAVĚ

Sportovní aktivitou se TYP IIb postupně mění na TYP IIa

HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- **Jednojaderné**, větvené a vzájemně propojené buňky **interkalárními disky** (max. délky 100 µm)
- **Středně vyvinuté** sarkoplazmatické retikulum
- Pravidelné uspořádání myozinových a aktinových filament do sarkomer (**příčné pruhování**)
- Excitace a kontrakce jsou **nezávisle** na nervovém zásobení (**pravidelný „pacemaker“** v SA uzlu, AV uzlu)
- Funkční syncytium (elektrická spojení – „**gap junctions**“)
- **Receptory pro neurotransmitery** (uvolňované z nervových zakončení) a **hormony** (přiváděné cirkulací); modulace **lokálními mediátory**
- Tetanická kontrakce **nemůže** vzniknout pro dlouhou refrakternitu akčního napětí
- Aktivita **nezávislá** na vůli

HLADKÝ SVAL

HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- **Jednojaderné vřetenovité** buňky variabilní délky (50-200 µm)
- Nepravidelné uspořádání myozinu a aktinu
- **Málo vyvinuté** sarkoplazmatické retikulum; T-systém chybí
- Kontrakce **viscerálního svalstva** nezávisí na nervovém zásobení (**nepravidelná pomalá nestabilní „pacemakerová“ aktivita**), **funkční syncytium (gap junctions)**
- Pomalý **fázový, tonický** i **tetanický** stah
- Četné **receptory** pro **neurotransmitery** (uvolňované z nervových zakončení) a **hormony** (přiváděně cirkulací). Modulace také **lokálními chemickými mediátory**
- Aktivita může být spuštěna natažením svalu (**membránové kanály aktivované protažením - „stretch-activated channels“**)
- Výrazná roztažnost a plasticita
- Aktivita **nezávislá** na vůli

TYPY HLAĐKÝCH SVALŮ

VISCIERÁLNÍ – JEDNOTKOVÝ

např. žaludek, střeva, uterus, ureter

- Funkční syncytium (*elektrické spoje „gap junctions“*)
- Nezávislost kontrakce na nervové stimulaci (pomalá nepravidelná nestabilní „*pacemakerová“ aktivita*)
- Vznik kontrakce v odezvě na natažení svalu (*vápníkové kanály aktivované natažením – „stretch channels“*)

VÍCEJEDNOTKOVÝ stimulovaný neurony

např. arterioly, m. ciliaris, m. iris , ...

- Stimulace *autonomními „motorickými“* neurony (*acetylcholin / norepinefrin*) - *autonomní „MOTORICKÉ“ jednotky*
- Svalové buňky nejsou propojeny „gap junctions“; AN **nevznikají**
- *Synapse* v průběhu nervových zakončení („*en passant*“)
- *Kontrakce* jsou *jemně stupňované a lokalizované*

