



HORMONY

- Tvorba v endokrinních žlázách
- Přenos krevní cestou na místo určení
- Velmi nízké koncentrace
- Specifické ovlivnění určitých buněk nebo orgánů



MÍSTO TVORBY HORMONŮ

- Specializované buňky
 - Specializovaná tkáň v jediném místě v těle
 - Žlázy s vnitřní sekrecí
- Disperzně rozmístěné v některém orgánu
 - Sliznice žaludku,
 - střeva, srdce, ledviny
- Buňky které nejsou specializované
 - Tukové buňky - leptin




MECHANIZMUS PŮSOBENÍ HORMONŮ


- Prostřednictvím receptorů
 - Specializované struktury s vysokou afinitou
- Umístění receptorů
 - Na buněčné membráně (hormony dřeně nadledvin)
 - Intracelulární
 - V cytoplasmě (růstový hormon, prolaktin)
 - V buněčném jádře (steroidy, štítnice)

REGULACE SEKRECE HORMONŮ

- Sekrece - není rovnoměrná, neuroendokrinní systém
 - Hypotalamo-hypofyzární systém
 - Systém zpětných vazeb
 - Hypothalamus - světlo, spánek
 - STH - ve spánku, ACTH - ráno
 - Zpětná vazba (negativní, pozitivní)
 - Glykémie - insulin
 - Kalcémie - parathormon
 - Přímá vazba mezi CNS a tvorbou hormonů (adrenalin, melatonin, antidiuretický hormon)

The diagram illustrates the Hypothalamo-Hypophyseal System. At the top, the Hypothalamus (yellow oval) contains 'liberiny, statiny' and releases hormones via arrows pointing down to the Adenohypophysis (adenohypophysis, blue oval). The Adenohypophysis releases several hormones: ACTH, TSH, FSH/LH, STH, and PRL. These hormones then stimulate various glands: Kúra nadledvin (adrenal cortex), Štítná žláza (thyroid gland), Vaječníky (ovaries), and Játra (liver). The thyroid gland produces Tyroxin- T4 and Trijodtyronin-T3. The ovaries produce Estrogeny and Gestageny (progesterone). The liver produces Somatotropin. Arrows indicate feedback loops from the target glands back to the Hypothalamus and Adenohypophysis.





ENDOKRINNÍ ŽLÁZY

- Hypothalamus
- Hypofýza
- Štítná žláza
- Příštítná tělíska
- Nadledviny: kůra, dřeň
- Pohlavní žlázy: varlata, ovaria
- Langerhansovy ostrůvky pankreatu

PŘÍKLADY DALŠÍCH MÍST VZNIKU HORMONŮ


- Žaludek
 - Gastrin
- Střevo
 - Sekretin, pankreozymin, serotonin
- Srdce
 - Natriuretické peptidy
- Ledviny
 - Erythropoetin, renin
- Tuková tkáň
 - Leptin
- Játra
 - Hepcidin

NEMOCI ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ


- Primární porucha funkce
 - Hyperfunkce, hypofunkce
 - Onemocnění žlázy, ve které se hormon vytváří
- Sekundární (hyperfunkce, hypofunkce)
 - Hyperfunkce, hypofunkce
 - Porucha „tropického“ (řídícího) hormonu

HORMONY HYPOTHALAMU

- Hypothalamus
 - Spojení s vyššími centry CNS a s hypofýzou
 - Integrace nervových a hormonálních regulací
- Releasing hormony pro hypofýzu
- Inhibiční hormony pro hypofýzu
- ADH, oxytocin



HORMONY HYPOTALAMU



HORMONY HYPOTALAMU

- **TRH** - Thyreotropin releasing hormon
 - TSH
- **CRH** - Corticotropin releasing hormon
 - ACTH
- **GHRH** - Growth hormon releasing hormon
 - STH
- **GnRH** - Gonadotropin releasing hormon
 - LH, FSH
- **Somatostatin**
- STH
- **Prolaktostatin (Dopamin)**
 - PRL

ADENOHYPOFÝZA


Tropic effects only:

FSH
LH
TSH
ACTH

Nontropic effects only:


Prolactin
MSH

Nontropic and tropic effects:
GH



STH, SOMATOTROPIN

- Růst organizmu
 - Stimulace proteosyntézy
 - Chrupavky, pojivové tkáně
 - Lipolýza




STH, SOMATOTROPIN

- Hypersekrece
 - Dětství - nadměrný vzrůst
 - Dospělost - akromegalie
- Nedostatečná sekrece
 - Dětství – porucha růstu, nanizmus, slabost, nevýkonnost
 - Dospělost - ztráta svalové hmoty, zvýšená kardiovaskulární mortalita


PRL, PROLAKTIN

- Význam
 - Laktace, gonadální funkce
- Hyperprolaktinémie
 - Ženy
 - Porucha menstruačního cyklu, amenorhea




TSH

- TSH, Thyreostimulační hormon
 - Je stimulován TRH
 - Stimuluje činnost thyreocytů
 - Význam při dg.thyreopatií




FSH, FOLIKULOSTIMULAČNÍ HORMON LH, LUTEOTROPNÍ HORMON

- Řízení normální funkce reprodukčního systému
 - Syntéza zvýšena od období puberty
 - Zvyšuje syntézu steroidních hormonů
 - Rozvoj sekundárních pohlavních znaků
- Muži
 - Stimulace spermatogeneze, syntéza testosteronu
- Ženy
 - Zrání folikulů, konverze androgenů na estrogy




ACTH

- Prohormon, před sekrecí štěpen na
 - ACTH, MSH, beta-lipotropin
- ACTH, Adrenokortikotropin
 - Stimulace kůry nadledvin
 - Glukokortikoidy
 - Androgeny
- MSH - melanostimulační hormon
 - Zvýšená pigmentace při nadprodukci ACTH




NEUROHYPOFÝZA

- Výchylka hypothalamu
 - Vasopresin
 - Oxytocin




VASOPRESIN

- Antidiuretický hormon, ADH, adiuretin
- Syntetizovaný v hypothalamu
 - Uvolňován v hypofýze
- Funkce
 - Retence vody v ledvinách
- Podnět pro sekreci
 - Vzestup osmolality
 - Osmoreceptory
 - Pokles cirkulujícího objemu těla
 - Volumo a baroreceptory




OXYTOCIN

- 1 Suckling stimulates nerves in the nipple and areola that travel to the hypothalamus.
- 2 In response, the hypothalamus stimulates the posterior pituitary to release oxytocin and the anterior pituitary to release prolactin.
- 3 Oxytocin stimulates lobules in the breast to let down (release) milk from storage. Prolactin stimulates additional milk production.




ŠTÍTNÁ ŽLÁZA



- Anatomie

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

59. Mikroskopická stavba štítné žlázy




1 Váček vyplněný koloidem, obsahuje
thyreoglobulin
Folikul
2 Epitelové folikulární buňky

3 Vazivová membrána
Lamina basalis
4 Parafollikulární buňky produkující hormon
kalcitonin

HORMONY ŠTÍTNICE - SYNTÉZA


- Řízení sekrece: TRH - TSH
 - Zpětná vazba



- Jód - nezbytný pro syntézu T4, T3
- Selen
 - Trijod thyronin, tetrajod-thyronin

HORMONY ŠTÍTNICE - METABOLIZMUS

- Zásobní forma ve štítnici
 - Tkáňová peroxidáza – oxidace jodidů na molekuly jódu
 - Thyreoglobulin
- Krev - transportní proteiny
 - TBG (thyroxin binding globulin), albumin, prealb.
 - Volné hormony - aktivní



ŠTÍTNÁ ŽLÁZA: T3, T4

- Ovlivňuje metabolismus všech buněk v těle
- Zvyšuje spotřebu kyslíku a energetickou přeměnu
- Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin, zvýšení glykémie
- Stimuluje růst a zrání buněk, syntéza růstového hormonu
- CNS: Dozrávání neuronů, myelinizace
- Bazální metabolismus, zvýšení produkce tepla
- Druhá nejčastější endokrinopatie v populaci

HYPOFUNKCE ŠTÍTNICE - HYPOTHYREÓZA

- Příčina
 - Získaná
 - Autoimunitní zánět
 - Nedostatek jódu
 - Odstranění štítné žlázy
 - Po ozáření
 - Způsobená léky ...
 - Vrozená hypothyreóza – porucha vývoje CNS (mentální retardace, porucha růstu a vývoje (novor. screening TSH)

HYPOTHYREÓZA

- Příznaky (nespecifické)
 - Ospalost
 - Zimomřivost
 - Únava
 - Suchá kůže
 - Otoky, prosáknutí podkoží
 - Poruchy menstruačního cyklu
 - Poruchy CNS – ztráta soustředěnosti, poruchy paměti
 - Zpomalení srdeční činnosti, zpomalení nervosvalového přenosu

SUBKLINICKÁ HYPOTHYREÓZA

- Klinicky se vůbec nemusí projevit
- Zvýšení TSH, normální fT4
- Zvýšení celkového cholesterolu, zvýšené AS riziko (IM, CMP)
- Nebezpečná v těhotenství
- Spojitost s DM I.typu, chronický zánět žaludku s perniciozní anémií, celiakie, vitiligo


HYPOTHYREÓZA

- Centrální hypothyreóza
 - Snížení fT4, fT3
- Periferní hypothyreóza
 - Snížení fT4, zvýšení TSH

HYPERTHYREÓZA

- Příčina
 - Autoimunitní zánět (přítomnost protilátek stimuluující receptory pro TSH na povrchu folikulárních buněk)- GB choroba
 - Adenom
 - Léky, amiodaron
- Projevy
 - Urychlení metabolismu ,úbytek hmotnosti, pocity horka, bušení srdce, nespavost, zvýšené pocení, zvýšená teplota
 - Endokrinní orbitopatie
 - Struma

Endokrinní orbitopatie



struma

THYREOPATIE - LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

- TSH
- fT4
- fT3
- Protilátky proti
 - TSH receptoru
 - Anti TPO - protilátky proti peroxidáze
 - Thyreoglobulinu
- Jodurie
- Thyreoglobulin - Tu marker

- Dívka 9 let
- Odeslána k vyšetření z imunologie, kde je sledována pro alergickou rýmu, zjištěna vysoká hladina TSH a vysoké hladiny protilátek proti štítné žláze
- Subj: poslední 3 měsíce výraznější únava
- Ultrazvuk štítné žlázy: nález zánětu s vysokou vaskularizací

| | | | |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| Na = 141 | Gluk= 6.4+ | IgE = 9.5 | aTPO= 541.0+ |
| K = 4.2 | Chol= 4.4 | TSH => 100.0 | AKR =* Metod |
| Cl = 107 | TG = 0.96 | FT4 = 6.2- | PSM = 3596.0 |
| Ca = 2.39 | ALT = 0.37 | FT3 = 3.53 | K_LA= 61 |
| P = 1.22- | AST = 0.60 | CPEP= 1847.0 | R_ex= 2018 |
| Mg = 0.93+ | GGT = 0.18 | SIH = 2.00 | M_ex= 6 |
| Urea= 3.0 | CRP =< 1.0 | SIL = 3.00 | D_ex= 20 |
| Krea= 49 | IgG = 13.25 | SII = 18.00 | h_ex= 10 |
| BilT= 5.2 | IgM = 0.66 | PrVz= 1.00 | m_ex= 50 |
| BilD= 2.5 | IgA = 1.24 | aTg = 431.0+ | K_S = 61 |

- Dg: Autoimunitní thyreoiditidis s hypofunkcí
- Terapie: substituce hormonů štítné žlázy (Euthyrox)

- Dívka 11 let
- Stěžuje si na bušení srdce a třes HKK asi 2 měsíce, vyšetřena na kardiologii, záchyt sinusové tachykardie, jinak bez patologie
- Ultrazvuk štítné žlázy – zvětšení štítné žlázy, struktura nehomogenní, zvýšena vaskularizace
- Oční vyš: levý bulbus lehce v protruzi



| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Chol= | 3.3 | aTg = 187.0+ |
| TG = | 1.45+ | aTPO= 420.0+ |
| HDLC= | 1.4 | AKR =* Metod |
| LDLV= | 1.3 | PSM =1667.0 |
| nHDL= | 1.9 | K_LA= 12 |
| TSH =< 0.01 | | R_ex= 2018 |
| FT4 => 100.0 | | M_ex= 7 |
| FT3 = 49.60+ | | D_ex= 30 |
| TRAK= 23.2+ | | h_ex= 14 |

Laboratorní známky tyreotoxikózy,
pozitivní autoprotilátky

RES: Autoimunitní tyreotoxikóza

PARATHORMON

- Sekrece je regulována hladinou ionizovaného Ca
- Funkce: regulace homeostázy kalcia
 - Kost
 - Ledviny
 - Tenké střevo



KASUISTIKA -HYPERPARATHYREÓZA


- Žena 68 let
- Asi 10let sledována a léčena pro nefrolithiasu, opakované renální koliky
- Zjištěna hyperkalcémie, hyperkalciurie, hypofosfatémie
- Susp. adenom přištítých tělisek vpravo
- dg. primární hyperparathyreóza, osteoporóza
- Th: Vigantol, bisfosfonáty, zatím odmítá operační řešení (odstranění přištítného tělíska)
-

| (cer mazac) | | (č. dokt.) | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| Vyšetření | Jedn. | 2018 17.08 06:44 | 2018 09.01 06:45 | 2017 07.07 07:31 | 2017 13.01 06:40 | 2016 17.08 08:50 | 2016 30.06 07:49 | 2015 29.12 07:05 | 2015 05.06 07:15 | |
| Cl | mmol/l | | | | | | | | | |
| Ca | mmol/l | | | 2.7 | 2.8 | 2.64 | 2.75 | 2.8 | 2.73 | 2.63 |
| P | mmol/l | | | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 0.66 |
| U _u | mmol/l | | | | | | | | | 0.75 |
| (cer mazac) | Jedn. | 2018 17.08 06:44 | 2018 09.01 06:45 | 2017 07.07 07:31 | 2017 13.01 06:40 | 2016 17.08 08:50 | 2016 30.06 07:49 | 2015 29.12 07:05 | 2015 05.06 07:15 | |
| TSH | mU/l | | | | | | | 2.66 | 1.18 | |
| FT4 | pmol/l | | | | | | | 11.3 | 11 | |
| BMI | | | | | | 26.6 | | | | |
| PTH | pmol/l | 10.8 | 9.4 | 10 | 11.5 | | 9.1 | 11.1 | 9.3 | |
| > CAS-SBER 24 hod (-) > DIUREZA 2350 ml (-) > dUKreat. 18.66 mmol (6 - 13) H > dUCa 11.1 mmol (2.4 - 6.2) VH | | | | | | | | | | |


Dat., čas odb.: 17.08.2018 06:44 Mat.: Termín: R Žád.: 2018842453

| Vyšetření Textový výsledek | Výsledek | Jednotka | Meze | Hodnocení |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | |
| > Ca | 2.70 | mmol/l | (2.15 - 2.55) | H |
| > P | 0.67 | mmol/l | (0.87 - 1.45) | L |
| > vit.D | 59.8 | nmol/l | (50 - 200) | . |
| > PTH | 10.8 | pmol/l | (1.6 - 6) | H |

NADLEDVINY




HORMONY NADLEDVIN



MINERALOKORTIKOIDY

- Aldosteron
 - Zvýšení reabsorpce Na^+ v distálním tubulu ledvin
 - Retence vody v těle



GLUKOKORTIKOIDY

- Kortizol

REGULATION OF SECRETION

Regulation of glucocorticoids




Figure 77-6

Mechanism for regulation of glucocorticoid secretion. ACTH, adrenocorticotropic hormone; CRF, corticotropin-releasing factor.




Figure 77-7

Typical pattern of cortisol concentration during the day. Note the oscillations in secretion as well as a daily secretory surge an hour or so after awaking in the morning.


stimulating hormone (MSH), β -lipotropin, β -endorphin, and a few others (Figure 77-8). Under normal

KORTIZOL

- Ovlivňuje přeměnu základních metabolitů (jaderné steroidní receptory)
 - Glukoneogeneze
 - Proteolýza
 - Lipolýza
 - Účinek antialergický, antiedematozní, protizánětlivý (stabilizace lysozomálních membrán, snižuje propustnost kapilár, snižuje migraci leukocytů, redukuje reprodukci lymfocytů, potlačuje horečku)

ZVÝŠENÁ PRODUKCE KORTIZOLU


- Cushingův syndrom
- Způsobeno nadprodukcí kortisolu (adenom...)
- Potlačena diurnální sekrece kortizolu v krvi
- Zvýšeno vylučování volného kortizolu v moči za 24 hod



NEDOSTATEČNÁ SEKRECE KORTIZOLU

- Addisonova choroba

- ↓ kortizol
- ↑↑↑ ACTH




POHLOVNÍ HORMONY NADLEDVIN


- Není hlavní místo produkce androgenů a estrogenů
- Androstendion, dehydroepiandrosteron
 - V perif. tkáních měněny na testosteron
 - Anabolický, virilizační účinek
- Estriol
 - Minimální tvorba

Klinický význam – vrozená porucha v syntéze steroidních hormonů – nedostatečná tvorba kortisolu, nadprodukce ACTH – zbytnění nadledvin – zvýšená sekrece androgenů (novorozenecký screening)

HORMONY DŘENĚ NADLEDVIN- KATECHOLAMINY

Význam hormonů dřeně nadledvin






HORMONY DŘENĚ NADLEDVIN- KATECHOLAMINY

- Feochromocytom - nadprodukce katecholaminů
- Laboratorní vyšetření
 - Krev
 - Adrenalin, Noradrenalin, metanefriny
 - Moč
 - Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin
 - Metabolity: metanefriny, normetanefriny, kyselina homovanilová

POHLAVNÍ HORMONY




TESTES

- **Žláza endokrinní**
 - **Leydigovy buňky** – testosteron – vývoj mužských pohlavních orgánů, vývoj sekundárních pohlavních znaků
stimulace sekrece testosteronu pomocí LH
- **Žláza exokrinní**
 - **Sertoliho buňky**, semenotvorné tubuly - spermatogeneza
 - stimulace sekrece pomocí FSH a testosteronu

ANDROGENY


- Testosteron – Leydigovy buňky varlat
- Krev - vazba na transportní proteiny
 - Transkortin, albumin, SHBG
- Účinky
 - Anabolické účinky
 - Vývoj mužských pohlavních orgánů
 - Zrání spermíí



OVARIA

- Sekrece ženských pohlavních hormonů – estrogenů a progesteronu
- Reprodukční funkce – zrání folikulů a ovulace
- Od puberty cyklickým způsobem, řízeny hypotalamo - hypofyzárním systémem
- Menstruační cyklus – 2 fáze – folikulární a luteální
- Folikulární fáze – růst folikulu, ovulace – zralý Graafův folikul – vznik žlutého tělíska
- Luteální fáze – 14 dní

PROGESTERON + ESTROGENY



OVARIA

- **Estrogeny**
- Tvorba a udržování primárních a sekundárních pohlavních znaků
- **Progesteron**
- Tvoří se postovulačně ve žlutém tělisku, v těhotenském žlutém tělisku a v placentě
- Příprava sekreční fáze endometria a udržování placenty během těhotenství

ESTROGENY, GESTAGENY

- Estrogeny
 - Estradiol, estron
- Gestageny
 - Progesteron

