

# sacharidy

původ slova cukr


Postupně z výrazu pro **cukrovou třtinu** (cukr z cukrové řepy máme jen 200 let).

**Arabové** dovezli třtinu na Pyrenejský poloostrov, takže **přes arabské *as-sukkar***

→ španělský *azúcar* → italské *zucchero* → německý *zucker* → cukr.

Arabové vzali *as-sukkar* z indického *šakara*.

Sacharidová větev: ruský výraz *sachar* z řeckého *sákcharon* (~cukr, sladkost)



## Sacharidy

### struktura sacharidů

- polyalkoholy (aldehydy  $-C=O$ , ketony  $-CO-$ )
- alespoň 3 uhlíky
- + deriváty

### sacharidy v přírodě

- v přírodě vznikají v buňkách fotoautotrofů (fotosyntézou), heterotrofové je získávají z autotrofů nebo glukoneogenezí  
⇒ 90 % sušiny rostlin ✗ jen několik % živočišných tkání



### význam sacharidů

- zdroj **energie** (buněčné palivo, 17 kJ/g)  
**kryjí 50-60 % denního energetického příjmu** člověka  
(z toho 80-90 % by měly tvořit polysacharidy, nejvýše 20 % oligo- a monosacharidy)  
**rezerva** energie (škrob, glykogen, inulin)
- **strukturní složky buněk**, tkání a pletiv (celulosa, chitiny)
- **biologicky aktivní látky**  
(nukleotidy, kofaktory, oligosacharidy mléka OMM ...)



## klasifikace sacharidů

- monosacharidy (~~glycidy~~)  
dle počtu uhlíků: triosy, tetrosy, pentosy, ...
- oligosacharidy (~~glycidy~~)  
2-10 monosacharidů, spojených glykosidovou (poloacetalovou) vazbou
- „z toho cukry“ = mono- a disacharidy
- polysacharidy (~~glykany~~)  
>10 monosacharidů, počet nebývá vždy stejný
- komplexní sacharidy  
komplexní, konjugované,  
obsahují navíc peptidy, proteiny, lipidy, ...




sacharidy  
**monosacharidy**

# monosacharidy


## triosy

oxoskupiny jsou značně reaktivní




D-glyceraldehyd


stáčí rovinu polarizovaného světla  
doprava ⇒ (+)-glyceraldehyd



dihydroxyaceton



**D-(+)-glyceraldehyd (D-glycero-triosa)**







**L-(-)-glyceraldehyd**




optické isomery (enantiomery)

D/L, R/S

d/l, +/-


**racemát** ~ racemická směs = opticky neaktivní směs D + L (1:1)






Glukosa  
D

Tollensův vzorec




Haworthova projekce




α-anomer  
33% , β=67%

## mutarotace




v krystalickém stavu výhradně cyklické struktury ( $\alpha$ - či  $\beta$ - anomery)

po rozpuštění se přes acyklickou formu ustavuje rovnováha





## fotosyntéza



kyslík: z vody

světlo: 400-750 nm

zisk energie: 479 kJ/mol CO<sub>2</sub> (tzn. 10,8 kJ/g)

1 g CO<sub>2</sub> ... 0,4 g sušiny

první výskyt fotosyntézy

anoxygenní: ~ 3.5 mld let

oxygenní: ~ 2 mld let

## milníky výzkumu fotosyntézy

17. stol: nárůst hmotnosti zeminy při pěstování rostliny (voda)

18. století: část hmotnosti musí pocházet i ze vzduchu

1771, Priestley: rostliny napravují vzduch poškozený dýcháním – flogistonovaný




1842: Mayer: fotosyntéza přeměňuje světelnou energii na chemickou

1941: Ruben/Kamen pomocí H<sub>2</sub><sup>18</sup>O dokázali, že zdrojem O<sub>2</sub> je voda



## monosacharidy

### hexosy - glukóza



## Glukosa

(hroznový cukr, škrobový cukr, dextrosa)

hlavní monosacharid většiny potravin (s fruktózou)

v rostlinách fotosyntézou, savci potravou a glukoneogenezí

glykémie = koncentrace D-glukózy v krvi (běžně 3,9–5,6 mmol/l nalačno)

aktivní resorpce (spolu s galaktózou ve formě P-esterů) v tenkém střevě,  
do buněk pomocí inzulínu (jeho antagonistu: glukagon)

základ energetického metabolismu člověka

mozek+krvinky spotřebují cca 150 g denně

zdroje: příjem / glykogen / glukoneogeneze / bílkoviny svalů

když v krvi málo  $\Rightarrow$  produkce glukagonu a adrenalinu

ukládána: játra, svaly

výroba fruktózy enzymaticky

disacharid glc-glc = maltóza

### L-Glukóza

produkt kosmického výzkumu

Stejná chuť jako D-Glukóza, ale není fosforylována. Látka byla navržena spin-off firmou NASA jako nekalorické sladidlo. Bohužel sladidlo stálo víc než zlato a neprosadilo se. (citace [1](#), [2](#))

## glukosa - glykémie, glykemický index


příjem glukózy a galaktózy → zvýšení hladiny glukózy v krvi

hladina glukózy v krvi (glykémie): 3,9–5,6 mmol/l nalačno  
po jídle nižší než 10 mmol/l,

běžně do 30 min po jídle, po cca 2 hodiny

GI: poměr ploch pod křivkou: potravinu / glukóza

fruktóza a další přednostně metabolizovány v játrech, bez inzulínu  
fruktóza ~ poloviční sekrece inzulínu




nízký GI <55	střední GI 56-69	vysoký GI 70+
jablko ovesná kaše sladká brambora jogurt hořká čokoláda	ananas pizza sýr celozrnné pečivo těstoviny	cornflakes bílé pečivo hranolky med cukr

**příklad**

Pokud má pacient v krvi koncentraci glukózy 5,6 mmol/l, jaká je její hmotnostní a procentuální koncentrace?

( $M_{\text{Glc}} = 180,16 \text{ g/mol}$ )





## monosacharidy

### důkaz cukrů




### Tollensovo činidlo

redukce stříbrných iontů v amoniakálním prostředí



*Redukující cukry\* redukují v amoniakálním prostředí stříbrné ionty Tollensova činidla na kovové stříbro (vzniká zrcátko).*




*\* redukující cukry obsahují alespoň jeden poloacetalový hydroxyl  
([video](#))*





## monosacharidy

### hexosy - fruktóza



### Fruktóza

(ovocný cukr, levulosa)

výskyt: volně v ovoci a medu, vázaná s glc v sacharóze (1:1)

sladší než glukóza (cca 1,5x)

v ovoci bohatém na vlákniny – jahodách, ostružinách, borůvkách

GI ~ 20 (dříve doporučované náhradní sladidlo)

### odbourávání v játrech


- Fru-6-P → glykogen
- Acetyl-CoA → syntéza mastných kyselin

výroba: třtina, řepa, kukuřice +enzymatická přeměna Glc

polemika o její souvislosti s obezitou, diabetem

## spotřeba kukuřičného sirupu

kg/os/rok (2011), státy s nejvyšší spotřebou



## HFCS

*high-fructose corn syrup*

levný a sladší než sacharóza, od 70. let se postupně prosazuje

výroba **enzymatickým štěpením** kukuřičného škrobu  
s následnou izomerací  $\text{Glc} \rightarrow \text{Fru}$   
proměnlivé složení fruktosy (5-90%)

bez výrazného biologického rozdílu oproti cukru


polemika o souvislosti s obezitou a diabetem

technologická výhoda: **tekutý**

→ nápoje (rychlý průchod žaludkem, nedostatečný výlev leptinu -h.nasycení)

## U.S. per capita sweetener availability, 1970-2014

Pounds per person, dry-weight



Notes: Corn sweeteners include high-fructose corn syrup (HFCS), glucose syrup, and dextrose. Edible syrups include sorgo (sweet sorghum), maple and sugarcane syrup, edible molasses, and edible refiners' syrup.

Source: USDA, Economic Research Service, Food Availability Data.

## Zpracování fruktózy


fruktóza: **GI 20**

- malý a pozvolný růst glykémie
- nestimuluje sekreci inzulínu
- přechod do krve však rychlý
- z portálního oběhu vychytávána játry

**metabolizace - kam se fruktóza poděje?**

- buď: složitě začleněna do glykogenu
- nebo: odbourána na laktát a acetyl-KoA
- příp.: syntéza tuku v játrech, VLDL

obavy ze slazených nápojů (rychlý průchod a vstřebání),  
(přitom těžko prokazatelný vliv na zdraví)



## monosacharidy v potravinách

**běžně** ve většině potravin, **proměnlivý** obsah, nejčastěji **hexosy a pentosy**  
často **přidávány** (ve formě glukózo/fruktózových sirupů)

### Ovoce

- podle zralosti, skladování
- např. jablka: při sklizni stopy škrobu (postupná degradace škrobu, hemicelulóz, pektinu)
- glukóza, fruktóza, v menší míře manóza, galaktóza



hrozny	~ 8 %
vinný mošt	120-250 g/l
Glc:Fru	0,5-0,9
suchá vína	< 4 g/l
sladká vína	> 45 g/l


málo obvyklé cukry:  
jeřabiny (sorbóza),  
jahody (heptulózy),  
avokádo (heptu-, oktu-, nonulózy až 5 %)  
sušené fíky ~ 60 % cukrů (bílý povlak je glukóza)



Nutrition Facts	
Serving Size 1 Apple (125 g)	
Amount Per Serving	
Calories 65	Calories from Fat 2
% Daily Value*	
Total Fat 0g	0%
Saturated Fat 0g	0%
Trans Fat	
Cholesterol 0mg	0%
Sodium 1mg	0%
Total Carbohydrate 17g	6%
Dietary Fiber 3g	12%
Sugars 13g	
Protein 0g	
Vitamin A 1%	Vitamin C 10%
Calcium 1%	Iron 1%

\*Percent Daily Values are based on a diet of other people's misdeeds.  
Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.

## monosacharidy hexosy - manóza



### Manóza

*optický epimer glukózy (=liší se konfigurací jediného uhlíku)*

- optický izomer glukózy
- Stavební blok rostlinných polysacharidů (pektin, celulózy, hemicelulózy)
- volně ve víně a dalších ovocných šťávách (desítky ppm)
- chutná hořkosladce (sladivost 59 %).



víno obsahuje pestrou směs cukrů

Ripe grapes contain equal amounts of glucose and fructose, while fructose predominates in overripe or botrytised berries.

In addition L-arabinose (ca. 1 g/l), rhamnose (up to ca. 400 mg/l), galactose (up to ca. 200 mg/l), D-ribose (ca. 100 mg/l), D-xylose (ca. 100 mg/l) and mannose (up to ca. 50 mg/l) are present. Saccharose (ca. 10 g/l) is detectable only if the saccharase is inhibited during pressing. Other oligosaccharides present are: raffinose (up to ca. 200 mg/l), maltose (ca. 20 mg/l), melezitose (ca.

Ovoce	Glukosa	Fruktosa	Sacharosa	Cukry celkem	Sušina
jablka	1,8	5,0	2,4	11,1	16,0
hrušky	2,2	6,0	1,1	9,8	17,5
třešně	5,5	6,1	0,0	12,4	18,7
švestky	3,5	1,3	1,5	7,8	14,0
meruňky	1,9	0,4	4,4	6,1	12,6
broskve	1,5	0,9	6,7	8,5	12,9
jahody	2,6	2,3	1,3	5,7	10,2
maliny	2,3	2,4	1,0	4,5	13,9
rybíz červený	2,3	1,0	0,2	5,1	16,4
rybíz černý	2,4	3,7	0,6	6,3	19,7
hrozny <sup>a)</sup>	8,2	8,0	0,0	14,8	17,3
pomeranče	2,4	2,4	4,7	7,0	13,0
grapefruity	2,0	1,2	2,1	6,7	11,4
citrony	0,5	0,9	0,2	2,2	11,7
ananas	2,3	1,4	7,9	12,3	15,4
banány	5,8	3,8	6,6	18,0	26,4
datle	32,0	23,7	8,2	61,0	80,0
fiky	5,5	4,0	0,0	16,0	22,0

**zelenina**

převážně Glc a Fru

zřídka arabinosa, xyloza

běžně <10 %

kukuřice ale i 16 %

také v luštěninách (Fru v sóji až 3 %)

okopaniny a kořenová: škrob

**maso**

- glykogen (živočišný škrob) 0,02 až 1 %

→ rychlá posmrtná degradace

→ 0,x % monosacharidy, fosforečné estery (glc-6-P)

**mléčné výrobky**

- monosacharidy stopově

- spíše disacharid laktóza

**vejce**

v sušině ~ 1 % (hlavně v bílku)

většina volných monosacharidů = glukóza

cca. polovina vázaná na glykoproteiny (hl. galaktóza)

Zelenina	Glukosa	Fruktosa	Sacharosa
brokolice	0,73	0,67	0,42
špenát	0,09	0,04	0,06
endivie	0,07	0,16	0,07
mrkev	0,85	0,85	4,24
řepa salátová	0,18	0,16	6,11
okurka	0,86	0,86	0,06
rajčata	1,12	1,34	0,01
cibule	2,07	1,09	0,89

## Med

### základní složení

složka	obsah [%]
fruktóza	38
glukóza	31
voda	17*
maltóza	7,3
vyšší cukry	1,5
sacharóza	1,3
minerální látky	0,17

\*obsah vody je významný parametr kvality medu, neměla by překročit 18 % (fermentace)




### důležité fyzikálně-chemické vlastnosti medu

- **voda** < 18 % - refraktometricky
- **hydroxymetylfurfural** - aldehyd vznikající rozkladem sacharidů medu (signalizuje nešetrné zahřívání)
- obsah aminokyselin (zejména **prolinu**, ukazuje vyzrállost, malý obsah naopak falšování) - ninhydrinová reakce
- **vodivost** (dána obsahem minerálních látek, lesní medy vyšší)
- **enzymatická aktivita** (invertáza, diastáza), nízká aktivita značí nevhodné zahřívání nebo skladování
- obsah volných kyselin (vysoký ~ známka fermentace)




## HOW DO BEES MAKE HONEY?




**SUCROSE**  
primary sugar in  
many nectars

When bees harvest nectar, it is stored in their honey stomachs, separate from their normal stomach. The nectar is mixed with enzymes which break down the larger sugars in the nectar, such as sucrose, into the smaller sugars glucose and fructose.

The forager bee then passes it on to a house bee, who regurgitates and re-drinks the nectar over a 20 minute period, breaking down the larger sugars further.



**GLUCOSE**




**FRUCTOSE**


The nectar is deposited in the honeycomb, and the bees fan it to hasten water evaporation, until the water concentration falls to around 17%.



## WHY DOESN'T HONEY GO OFF?



**GLUCONIC ACID**



**HYDROGEN PEROXIDE**

Honey has such a low water content, it draws water from its surrounding environment, meaning it can dehydrate bacteria, thus preventing spoilage.

Gluconic acid is the dominant acid in honey, produced by the action of bee secretions on glucose. It, and other acids, give honey a low pH of between 3 and 4; this, along with the fact it also contains small amounts of hydrogen peroxide, makes it too hostile for bacterial growth.

## aktivita vody $a_w$ (water availability)

„dosažitelná voda, která není chemicky vázaná“

poměr tlaku vodních par nad potravinou  
ku tlaku par nad čistou vodou


$$0 < a_w < 1$$

potraviny: velmi vlhké  $> 0,9$   $>$  středně vlhké  $> 0,6$   $>$  suché  
znalost  $a_w$  umožňuje odhadnout, kdy potravina  
vlhne/vysychá (závisí na rel. vlhkosti vzduchu)

### aktivita vody v potravinách

potravina	$a_w$
čerstvé maso, vejce, zelenina, ovoce	0,97-0,98
sýry, chléb	0,97
trvanlivé výrobky obecně	$< 0,93$
marmelády	0,82-0,94
uzeniny	0,82-0,85
med	0,6
chipsy a extrudáty	0,35-0,5
cukr	0,1

Aktivitu vody lze snížit za účelem prodloužení trvanlivosti:  
sušení (ovoce, zelenina, maso), proslazování (sirupy) nebo solení potravin  
(solené maso, ryby, zelenina, houby). Proto, aby mohl být masný výrobek  
označen jako trvanlivý, musí být jeho aktivita vody nižší nebo rovna 0,93.



potraviny suché  
( $< 0,6$ )

středně vlhké  
( $0,6-0,9$ )

velmi vlhké  
( $0,9-1$ )

aktivita vody potřebná k růstu:

bakterie  $> 0,94$

kvasinky  $> 0,9$

plísně  $> 0,75$

máloco roste při  $a_w < 0,6$

# invertní cukr

„umělý med“


ekvimolární směs glukózy a fruktózy  
 vyráběn kyselou hydrolýzou/enzymaticky  
 mírně sladší než sacharóza  
 nižší aktivita vody než původního cukerného roztoku

## využití

- cukrovinky (hygroskopický → vláčnost)
- zmrzliny (zvyšuje jemnost)
- výroba umělých sladidel
- falšování medu (odhalitelné)
  - kontrola: hydroxymethylfurfural, prolin, el. vodivost, enzymatická aktivita




*proč je invertní?*



## Polarimetrie

jedna z metod vhodných ke stanovení cukrů





běžné světlo je nepolarizované (kmitá všemi směry)

**polarizace** světla může nastat:


- odrazem
- dvojlomem
- polaroidem

## Polarimetrie







string vibrates in all directions -  
up-and-down, side-to-side, and  
every direction in-between



vibrations still get  
through second slit



only vertical vibrations  
get through slit



string is now  
completely still

## Polarimetrie





schéma subjektivního polarimetru



## Polarimetrie

$$\alpha = [\alpha]_D^{20} \cdot l \cdot c$$

- $[\alpha]_D^{20}$  měrná otáčivost (20 °C, vlnová délka sodíkového dubletu, 589 nm)  
 $\alpha$  úhel otočení roviny polarizovaného světla  
 $l$  tloušťka vrstvy opticky aktivní látky v dm  
 $c$  koncentrace látky v g/cm<sup>3</sup>



## Polarimetrie: Příklad

Při stanovení procentuálního obsahu glukózy v sirupu byl naměřen úhel otočení  $12,86^\circ$ . Navážka vzorku 20 g byla rozpuštěna a doplněna v odměrné baňce na objem 100 ml, polarimetrická trubice měla délku 20 cm.

$$\alpha = [\alpha] \cdot l \cdot c$$

$$12,86 = 52,74 \cdot 2 \cdot c$$

$$12,86/52,74/2 = c$$

$$c = 0,122 \text{ g/cm}^3 \sim 12,2 \% \cdot 5$$

$$\text{(zředění)} = 61 \% \text{ glc v sirupu}$$

specifická otáčivost cukrů	
cukr	$[\alpha]_D^{20}$
fruktóza	-93,78
glukóza	+52,74
sacharóza	+66,53
invertní cukr	-20,59

## Polarimetrie

### využití polarimetrie

- studium opticky aktivních látek
- cukrovarnictví  
(sacharimetry - přímo uzpůsobené pro stanovení sacharózy)
- kontrola chirální čistoty látek
- bílkoviny v moči, steroidy, ...



## Agávový sirup

- ze sukulentů Jižní Ameriky
- sladivost ~2krát vyšší než cukr
- nízký glykemický index 20-30 (protože neobsahuje tolik glukózy)
- vysoký poměr fruktózy (z inulinu)
- problémy spojené s vysokým obsahem fruktózy
- obsah dalších látek, např. minerálních, vyšší než v cukru, ale stále zanedbatelný



glukóza


60-90 % fruktóza

fruktóza



## fyziologie, výživa

sacharidy celkově ~ 55 % energie  
z toho jednoduché ideálně <20 %



## zpracování sacharidů

**polysacharidy**: štěpení amylasami

→ **oligosacharidy**: hydrolyzovány glykosidasami

→ **monosacharidy**

→ resorpce v tenkém s. (glukóza-P a galaktóza-P aktivně, ostatní difúzí)

→ transformace na glukózu v játrech

→ **glukóza** metabolizována ve svalech

→ oxidací až na vodu a  $\text{CO}_2$  (přebytek: glykogen)


Glukóza (i galaktóza, která se na ni metabolizuje) má výrazný vliv na hladinu krevní glukózy. Fruktóza a ostatní metabolizovány hlavně v játrech bez účasti inzulinu.

# Deriváty sacharidů

sacharidy jsou díky kyslíku reaktivní → množství derivátů


redukcí karbonylové skupiny → **cukerné alkoholy** (alditoly, cyklitoly)


**glycerol**, nejjednodušší alditol



- sladký
- přirozeně (i nepřirozeně) ve víně: třetí hlavní složka, 5-20 g/l, vytváří plnou a jemnou chuť.
- v potravinách jako E422
- jedovatý jen ve vyšších dávkách (orální LD<sub>50</sub> několik gramů/kg)
- kosmetika (zvlhčující účinek – pouze zředěný), nemrznoucí směs







vznik glucitolu redukcí glukózy


*podobně mnohé další (přípona -itol);  
erythritol z erythrosy, ribitol z ribosy, xylitol z xylosy, .....*

D-glucitol spolu s D-mannitolem  
nejrozšířenější alditoly

V potravinách:

- přirozeně  
glucitol a ribitol v ovoci, glycerol ve  
víně, erythritol v mošttech, ...
- přídatné látky  
cukrovinky (sladké a vláčné dezerty),  
nápoje, léčiva, sladidla pro diabetiky  
(malý vliv na glykémii), snižují aktivitu  
vody  $a_w$ , ...

## D-glucitol (=sorbitol)



D-glucitol

náhradní sladidlo, cca 50% sladivost (E420),

přirozeně v ovoci (jeřabiny, sušené švestky)

výroba ze sacharózy

využití: léky, zubní pasty (nekariogenní / slabě kariogenní)


### obsah D-glucitolu (sorbitolu) v ovoci

ovoce	obsah % (čerstvé hmotnosti ovoce)
švestky	0,6–13,9
hrušky	1,2–2,8
jablka	0,2–0,8
třešně	0,1
broskve	0,03–0,047
hroznové víno	<0,03





## WHY DO PRUNES HELP WITH CONSTIPATION?



SORBITOL

PRUNES

**15g**

CHEWING GUM

**30g**

VS

(SORBITOL CONTENT PER 100 GRAMS)

Prunes are dried plums, and are often cited as a home remedy for constipation. This is due to their relatively high natural levels of the known laxative compound sorbitol (approximately 15g per 100g). Sorbitol is also responsible for the laxative effect of some chewing gums. Phenolic compounds, such as neochlorogenic acids, and the high fibre content of prunes may also aid the laxative effect.

# Sacharidy

## Xylitol

březový cukr, v ovoci a zelenině  
nekariogenní (naopak prevence zubního kazu) –  
bakterie zubního povlaku ho neumí zpracovat;  
vysoká hodnota endotermní rozpouštěcí entalpie  
= *chladivý pocit při rozpouštění v puse*

### praktické využití


potravinářství (žvýkačky)  
farmacie (zubní pasty, ústní vody)

### nevýhody

projíímavé účinky (>40 g)  
nebezpečný pro psy



# SWEET BITES XYLITOL GUM HOW IT HELPS PREVENT TOOTH DECAY



### Xylitol

**Molecular Formula:**  $C_5H_{12}O_5$

**Discovered:** 1890

Found in low concentrations in a range of fruits & vegetables. The industrial production of xylitol involves extraction of xylan from hardwood or corncobs. This is hydrolysed, then hydrogenated, to produce xylitol.

### How Does Chewing Xylitol Gum Help Prevent Tooth Decay?



Unlike sugar, bacteria cannot use xylitol as an energy source, and it also prevents bacterial growth and reproduction.



Chewing helps bring saliva to the mouth, which acts as a natural cleanser, & xylitol also increases salivary pH, combatting acidity.



Chewing gum can help dislodge food fragments which could otherwise act as energy sources for microorganisms.




**RESEARCH INITIATED IN FINLAND**  
*'Where it's a ubiquitous sweetener'*



**SUITABLE FOR DIABETICS**  
*'Doesn't lead to high blood sugar'*

### Caries Prevention of Xylitol Gum Versus Other Gums



Source: Mäkinen K K et al. 1995. Xylitol chewing gum and caries rates: a 40 month cohort study. J Dent Res. 74(12):1904-1913.



**FDA APPROVED**  
*Since 1963*



**SWEET AS SUGAR**  
*33% fewer calories*



**LAXATIVE EFFECT**  
*Doses over 40g*



PRODUCED FOR WWW.SWEETBITESGUM.COM. © COMPOUND INTEREST 2014 - WWW.COMPOUNDCHEM.COM  
SHARED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-NODERIVATIVES 4.0 INTERNATIONAL LICENCE





## Březová míza vs. březový sirup vs. březový cukr

- Xylitol, přestože nazýván březový cukr, není obsažen v březové míze.
- Míza obsahuje relativně malé množství Fru a Glc, je jen mírně sladký a pro výrobu sirupu je nutné ho velmi zahustit.
- Xylitol se vyrábí hydrogenací xylanu, který se často získává právě z březové kůry.

# Mannitol

aditivní I.: E421

sladivost: 0,5–0,7

přirozeně: kořenová zelenina (celer 0,5 %), káva (1 %), houby (žampiony 15–26 %)

glykemický index: 2


energetická hodnota: 10 kJ/g

laxativní práh: 20 g/den


Výskyt: víno, káva, houby

Vznik: činností plísní a bakterií ⇒ vysoký obsah ve víně signalizuje napadení hroznů


Výroba: z odpadu po zpracování káv, kvašením glukózy




Potraviny obsahující toto éčko




ELMA Dental žvýkačky




ELMA Sugar free žvýkačky




ELMA Spearmint žvýkačky



ELMA Lemon žvýkačky



Mentos Gum pure fresh spearmint žvýkačky



Žvýkačky - černý rybič

**obsah hlavních alditolů ve vínech**

<b>alditol</b>	<b>obsah [mg/l]</b>
glycerol	10 000
erythritol	35-292
D-arabinitol	10-577
xylitol	4-11
D-glucitol	9-277
D-mannitol	6-152



## cyklitoly

skupina odvozená od cyklohexanu


většinou šest hydroxyskupin,  
ale i pět, čtyři a tři skupiny

nejvýznamější skupina:


**inositoly** (dříve cyklosy)

8 stereoisomerů


*Myo*-inositol:  
běžně v potravinách  
dřív *vitamin B8*




4-63, *myo*-inositol




4-70, *muko*-inositol




4-71, *cis*-inositol




4-66, *scyllo*-inositol



4-69, *epi*-inositol






## cukerné kyseliny

součástí mnoha složek potravin

vznikají oxidací aldehydové skupiny (-onové) nebo primární alkoholové (-uronové).  
Přirozeně vznikají enzymaticky, ale také Maillardovou reakcí.



D-glukóza

D-glukonová kyselina

glukono-1,5-lakton

### Kyselina glukonová

běžná složky rostlinných materiálů, produkt neenzymového hnědnutí.

Součást medu bránící jeho kažení.

### lakton k.glukonové v potravinářství

potlačuje růst hnilobných MO (postupně totiž hydrolyzuje na volnou kyselinu)

⇒ v malém množství jako konzervant masných výrobků - postupně hydrolyzuje na kyselinu a brání rozvoji nežádoucí mikroflóry



## výskyt, využití cukerných kyselin a laktonů


často v energy drinkách v kombinaci s taurinem a kofeinem

### 6,3-Glukuronolakton:

výživa sportovců (zrychluje tvorbu a zpomaluje odbourávání svalového glykogenu)

EFSA [popírá obavy z taurinu i 6,3-G-L](#). (NOAEL 1 g/kg)

běžný lidský metabolit




6,3-Glukuronolakton

Sodium	100 mg	400 mg
Taurine	1000 mg	32 mg
Caffeine	80 mg	24 mg
Glucuronolactone	60 mg	20 mg
Hydroxymethyl	50 mg	8 mg
Hydroxymethyl	20 mg	2 mg

**další deriváty:**

glykosidy (cukr + aglykon),  
ethery,  
estery


**O-glykosid**

cukr + aglykon →  
heteroglykosid

cukr + cukr →  
homoglykosid


**ether**

minoritní stavební složky,  
hydrokoloidy


**ester**

běžné, hlavně  $\text{PO}_4^{3-}$   
nukleotidy  
od kys. sírové, octové

# Oligosacharidy



# oligosacharidy




oligomery 2-10 sacharidů

(di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, nona-, dekasacharidy)

glykosidy (aglykon je další sacharid)

→ homoglykosidy



O-glykosid

## disacharidy

glykosidy, kde aglykon = jiný sacharid  
~ homoglykosidy

většinou hexózy

kondenzací  $\alpha$ - nebo  $\beta$ -anomerní -OH sk.

↳ kondenzují dvě poloacetalové  $\Rightarrow$  neredukující s.


### neredukující

- neobsahuje anomerní hydroxylovou skupinu  $\Rightarrow$   $\alpha/\beta$  anomer
- dvojnásobné glykosidy (glykosylglykosid)


### redukující

- každý jiný případ
- vykazují mutarotaci


většinou triviální názvy, systematicky glykosylglykóza  
(základ názvu sacharid s volným poloacetalem)



## disacharidy: výskyt, využití



Isomaltulosa



### palatinosa (isomaltulóza):

jeden z cca desítky současně vyráběných oligosacharidů  
glukóza+fruktóza vázané glykosidickou vazbou 1,6

Výroba ze sacharózy. 40% sladivost, nekariogenní, stimuluje růst bifidogenní mikrobioty  
Umělý oligosacharid pro výživu sportovců.

*Pomalé štěpení, úplné využití, stabilita v kyselém prostředí*

## oligo/disacharidy: výskyt, využití

### V potravinách

běžná součást: ovoce, zelenina, med, mléko


hlavní komponenty oligosacharidů D-monosacharidy (Glc, Fru, Gal, Man)

aldosy jako pyranosy, fruktóza jako furanosa

nejčastěji ze D-Glc ⇒ glukooligosacharidy, případně Glc/Fru

### oligosacharidy v těle

- enzymatická **hydrolýza na monosacharidy**
  - *invertasa ~ sacharasa, laktasa, maltasa*
- vliv na glykémii: podobný jako příslušné monosacharidy (platí pro využitelné)
- některé mají karioenní účinky (sacharóza, maltóza, slabší má laktóza)



*funkce enzymu sacharasa, resp. invertasa (eng.: sucrase)*

## disacharidy: výskyt, využití

### Využití v potravinářství

**výroba oligosacharidů** (ze škrobů [škrob, inulin, xylan] nebo z běžných oligosacharidů [sacharóza, laktóza])

fyziologické **vlastnosti umělých** oligosacharidů:

- většinou nekariogenní (nevyužitelné ústními bakteriemi)
- mnohé nestravitelné (nízkoE potraviny)
- často prebiotické účinky (oligofruktóza, galaktooligosacharidy a laktulóza) např. i mateřské mléko (15 g nestravitelných oligosacharidů v litru)

**Nekompletní stravení** → citliví lidé mohou pociťovat stavy jako po luštěninách a podobných potravinách s vysokým obsahem vlákniny.

hydrogenace disacharidů → **alkoholické cukry**

- rozpustné, slabě sladké (30-60 % sacharózy)
- vysokoviskózní roztoky, vaznost vody
- ⇒ snížení spotřeby cukrů
- prevence vysychání
- někdy laxativní účinky (nad 50 g sorbitolu)

Přehledový článek k dalšímu studiu:

[Náhradní sladidla, jejich místo v současné diabetologii.](#)

Eva Račická. *Interní medicína pro praxi*, 2012.



sladidlo	sladivost	
	(rel. k sacharóze 100%)	kJ/g
Sacharóza	100	17
Polyglycitol	40 – 90	13
Sorbitol	60	11
Xylitol	100	10
Maltitol	90 (prášek), 40–90 (sirup)	9
Isomalt	45–65	8
Lactitol	40	8
Mannitol	70	7
Erythritol	70	1

jediný nekalorický polyol. Vstřebává se ve střevě (90 %) a nepřeměněný je vyloučen močí. Střevní bakterie ho nefermentují (ani ty v ústech)

sladivost polyolů  
([Food Technology, 9/2012](#))



## prebiotika

nestravitelné oligosacharidy, které **stimulují** růst a aktivitu bakterií.

Např: inulin, oligofruktóza, laktulóza

prebiotika musí

- 1) být rezistentní vůči žaludečním kyselinám a vůči hydrolytickým enzymům
- 2) být fermentovatelné střevními bakteriemi
- 3) selektivně stimulovat růst/aktivitu střevních bakterií, které mají příznivý vliv na hostitelovo prospívání a zdravotní stav.

první a nejlepší prebiotika: OMM oligosacharidy mateřského mléka

- 15 g/l,
- rozmanité (130+),
- nenapodobitelné

## probiotika

Nejčastěji **bakterie**, které přirozeně obývají lidská trávicí trakt, pozitivně ovlivňují střevní peristaltiku.

Např. *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*

původně termín pro látku produkovanou jedním prvokem, stimulující růst druhého.


Později krmné a potravní doplňky. probiotika×antibiotika. Současná definice:

„Probiotika jsou **živé mikroorganismy**, které jsou-li podávány v adekvátním množství, přispívají ke zlepšení zdravotního stavu hostitele.“

## synbiotika

**kombinace** probiotik a prebiotik


například jogurt s obsahem probiotických bifidobakterií a prebiotickou oligofruktózou



## prebiotický efekt různých oligosacharidů

Prebiotikum	Nestravitelnost příjemcem	Fermentace bakteriemi	Selektivita	Statut prebiotika
<b>inulin a oligofruktóza</b>	ano	ano	ano	ano
<b>galaktooligosacharidy</b>	pravděpodobně	???	ano	ano
<b>laktulóza</b>	pravděpodobně	???	ano	ano
<b>isomaltooligosacharidy</b>	částečně	ano	spíš ano	ne
<b>laktosacharóza</b>	ND	ND	spíš ano	ne
<b>xylooligosacharidy</b>	ND	ND	spíš ano	ne
<b>sojové oligosacharidy</b>	ND	ND	ND	ne
<b>glukosacharidy</b>	ND	ND	ND	ne

ND – nedostupná data, ??? – předběžné výsledky, nutný další výzkum



## maltóza

disacharid glukózy

strukturní jednotka škrobu

sladivost 30-60 % sacharózy

### V potravinách



#### hydrolýzou škrobu: chlebové těsto

hydrolýzou škrobu kvasinkami *Saccharomyces cerevisiae* a enzymaticky. Nejdřív roste, když kvasinky spotřebují Glc a Fru, začne klesat). V chlebu až 4 %.



**v klíčících semenech** (slad) → produkt en. hydrolýzy  
stupňovitost piva; extrakt původní mladiny EPM




**v medu** (3-16 %) a maltózových sirupech

### Využití

maltózové sirupy, maltooligosacharidy

hydrogenace → glukopyranosyl-glucitol (*maltitol*)



$\alpha$ -D-glukopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosa



maltóza je nazývána **sladový cukr**  
(vzniká ve sladu hydrolýzou škrobu)

## maltóza

proč **sladový cukr**?

slad = naklíčené a usušené zrno ječmene

během klíčení dochází působením enzymů k štěpení zásobního škrobu na jednodušší cukry, především maltózu

stupňovitost piva (°) = EPM = extrakt původní mladiny  
12° znamená 12 % extraktivních látek, tzn. sacharidů - především  
zkvasitelných - před proběhnutím kvasného procesu

stupňovitost ovlivňuje výsledný obsah alkoholu  
(12° mívá přibližně 4-5% obj. alkoholu)



*stupňovitost původní mladiny se měří pomocí ponorného hustoměru, případně **refraktometricky***



## maltóza



### redukce na maltitol

Maltitol = produkt hydrogenace maltózy  
 $\alpha$ -D-glukopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)-D-glucitol

sladivost 90%, avšak jen malý vliv na hladinu krevního cukru (GI 36).

nekariogenní, slabé laxativum, stimuluje růst střevní mikroflóry,  
 zvlhčující látka

E965: ve žvýkačkách, sladkostech, sladidlech, zmrzlinách



[ukázky potravin s obsahem maltitolu](#)

## sacharóza

řepný cukr, třtinový cukr

produkt fotosyntézy → ve vegetativních částech rostlin je mobilizována (enzym *invertasa*) při klíčení semen a zraje ovoce

cukrová třtina	až 26 %
cukrová kukuřice	až 17 %
některé ovoce	až 8 %
řepa	až 20 %

v některém ovoci ano (jablka) v jiném ne (hrozny)


hlavní průmyslový zdroj: cukrová **třtina**

u nás: cukrová **řepa** (*Beta vulgaris*)

jinde: **datle** (Irák, Alžírsko), **palmový cukr** (Indie, Kambodža, Filipíny), **javor** (Kanada, USA, Jap)



cukrová třtina (*saccharum officinarum*)



$\alpha$ -D-glukopyranosyl- $\beta$ -D-fruktofuranosid



## HISTORIE CUKRU

### Nová Guinea

domestikace cukrové třtiny 10 000 let  
pochoutka i součást rituálů  
pozvolné šíření mezi ostrovy  
→ do Asie: 1000 př.n.l.

### Indie

zpracování na prášek (lék na křeče, bolesti hlavy): 500 n.l.  
rafinace tajná věda předávaná z mistra na učně

### Persie

cca 600: sladkosti  
Arabské armády si po dobytí odnesly cukr i znalosti

### Arabové šířili cukr dál

zdokonalili rafinaci, 15. stol: těžká práce v rafinériích pro zajatce

### Evropa poznala cukr od britských a francouzských křižáků

cukrové třtině se ale v mírných podmínkách nedaří  
→ závislost na dodávkách od muslimských obchodníků  
⇒ cukr vzácný (koření)







## HISTORIE CUKRU #2

### ostrovy v Atlantském oceánu

mořeplavci (Portugalsko, Španělsko) hledali oblasti vhodné k pěstování třtiny:

- Madeira (1425), Kanárské o., Kapverdy
- Karibské ostrovy (1493) - Hispaniola





*mlyn na cukr. Santa Cruz (stř. Amerika), 18.stol*


## HISTORIE CUKRU #3

### kolonialismus

17. století cukr už běžné zboží  
na vznikajících plantážích otroci z Afriky  
cca 11 milionů Afričanů (1/2 na třtinu)

### ▲ trojúhelník

cukr → Londýn, Amsterdam, Paříž:  
výměna za hotové výrobky  
→ západní pobřeží Afriky  
→ výměna výrobků za další otroky





## sacharóza

### melasa

zbytek po vycukernění řepy či třtiny

~ 60% sacharosy

~ 40% necukrů

(org.+anorg. ionty, aminokyseliny-Glu, další)

liší se řepná/třtinová(obsahuje akonitovou kys.)

- využití v likérnictví, výroba lihu
- výroba rumu (rhum *melasse* = melasový (většina), vs *agricole* nebo *cane juice rhum* = z „celého“ cukru)
- krmivo pro zvířata
- substrát pro výrobu droždí



THIRTY-TWO PAGES—TWO CENTS

Published daily

THURSDAY, JANUARY 16, 1919 \*\*

Copyright, 1919, by Post Publishing Co.

THIRTY-TWO PAGES—TWO CENTS

# HUGE MOLASSES TANK EXPLODES IN NORTH END; 11 DEAD, 50 HURT

## Giant Wave of 2,300,000 Gallons of Molasses, 50 Feet High, Sweeps Everything Before It—100 Men, Women and Children Caught in Sticky Stream—Buildings, Vehicles and L S

### 35 STATES ON DRY LAW LIST

Amendment Ratified by Five Yesterday—One More Needed—Predict Nation Dry July 1

WASHINGTON, Jan. 15.—Legislation of 35 States ratifying the amendment to the prohibition constitutional amendment, passed by Congress last July, has been received here and will be taken up by the Senate tomorrow. It is expected that the amendment will be passed by the Senate in the next few days.

### SECRECY IN PEACE CONGRESS

France, Italy and Japan Outvote U. S. and Britain



GENERAL VIEW OF THE WRECK OF THE NORTH END TANK, SHOWING SOME OF THE DESTRUCTION AND THE MESS OF THE WRECK. THE TANK WAS BUILT BY THE BOSTON TANK CO. AND WAS USED FOR THE STORAGE OF MOLASSES. THE TANK WAS 100 FEET HIGH AND 100 FEET IN DIAMETER. IT WAS BUILT IN 1908 AND WAS THE LARGEST TANK OF ITS KIND IN THE WORLD. THE TANK WAS BUILT BY THE BOSTON TANK CO. AND WAS USED FOR THE STORAGE OF MOLASSES. THE TANK WAS 100 FEET HIGH AND 100 FEET IN DIAMETER. IT WAS BUILT IN 1908 AND WAS THE LARGEST TANK OF ITS KIND IN THE WORLD.




BOY'S STORY AID

KNOWN DEAD



Sugar	Recognition threshold	
	mol/l	%
Fructose	0.052	0.94
Glucose	0.090	1.63
Lactose	0.116	4.19
Maltose	0.080	2.89
Saccharose	0.024	0.81

Sacharóza je referenční sladká látka pro sladivost.  
Práh jejího rozpoznání odpovídá cca 2 kostkám cukru v litru.



**Fig. 4.4.** Temperature dependence of the relative sweetness of some sugars (based on saccharose  $\triangleq$  100 at each temperature; — D-fructose, --- D- glucose, -·-·- D-galactose, ····· maltose) (according to *Shallenberger and Birch, 1975*)

Kvalita a intenzita chuti závisí i na teplotě, pH a přítomností dalších (ne)sladkých složek.

## laktóza

### mléčný cukr

jen málo kariogenní a laxativní.

40% sladivost

v těle zpracována laktasou


výskyt: v savčím mléce (doprovázena Glc)

výroba: filtrací syrovátky kravského mléka


### výživa

dobře využitelný zdroj energie

silně ovlivňuje **glykémii**



### Laktosa (mléčný cukr)







# laktóza

## intolerance laktózy

laktóza štěpana laktázou ( $\beta$ -galatósidasou) v tenkém střevě

- řada lidí neschopnost produkovat laktasu v dospělosti
- vrozená / prvotní (postupný úbytek laktázy, nejčastější) / druhotná



výskyt intolerance laktózy

## laktóza

### snížení obsahu laktózy v syrovátce během fermentace

Sledování obsahu laktózy (%) během fermentace syrovátky jogurtovou kulturou (počet měření  $n = 6$ )

Čas [h]	Průměr [%]	SD [%]
0	5,10	0,04
0+	5,15	0,03
1	5,04	0,06
2	4,22	0,05
3	4,69	0,26
4	4,35	0,35

*Vyhláška 157/2008 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, která stanovuje limit laktózy v potravinách s nízkým obsahem laktózy na  $10 \text{ g.kg}^{-1}$  a bezlaktosové potraviny mohou obsahovat pouze  $100 \text{ mg}$  laktózy na  $1 \text{ kg}$ .*



*zralé tvrdé sýry neobsahují téměř žádnou laktózu*

laktóza je štěpena bakteriemi mléčného kvašení → vzniká mléčná kyselina

⇒ kvašené výrobky (jogurty, acidofilní mléko) obsahují snížené množství laktózy

⇒ v tvrdých sýrech (obzvláště těch déle zrajících) je už obsah laktózy prakticky zanedbatelný


## galaktooligosacharidy: Oligosacharidy mateřského mléka

mikrobiologie –

# Zázračná složka mléka

Savci svá mláďata připravují na drsné podmínky života zázračnou žlutobílou tekutinou, vznikající v mléčné žláze matek. Jednou ze složek mléka jsou oligosacharidy – cukry složené ze 3 až 10 jednoduchých cukrů (monosacharidů). Výzkumy posledních let ukazují, že právě tato složka mléka je nenahraditelnou v boji proti infekcím a patogenním bakteriím nejen u člověka, ale pravděpodobně i u ostatních savců. A ačkoliv najdeme oligosacharidy v každém mléce, jejich složení a koncentrace se liší nejen druh od druhu, ale i jedinec od jedince.

text ŠÁRKA MUSILOVÁ



**Z HLEDISKA množství oligosacharidů je mateřské mléko v porovnání s mlékou ostatních savců nejbohatší.**

Schéma Giorgio et al., Small Ruminant Research 2018, DOI: 10.1016/j.smallrumres.2018.01.006

[přečíst](#)



## Refraktometrie

### Abbeho refraktometr




schéma Abbeho refraktometru  
(z <http://anl.zshk.cz/vyuka/refraktometrie.aspx>)

## The fish that SPITS to kill

Archerfish uses complex physics to accurately 'shoot down' flying prey with jets of water

[Read more: http://www.dailymail.co.uk/](http://www.dailymail.co.uk/)



jak se co dělá: cukr





## Jak chutná sirup



poučné čtení: [DTest: Jak chutná sirup](#)



## polysacharidy

### klasifikace - struktura řetězců

deset až milion jednotek

#### podle složení


- homopolysacharidy (např. škrob)
- heteropolysacharidy (většina)

#### podle struktury

- lineární
  - větvené
  - nevětvené
- cyklické




lineární polysacharid  
amylosa, celuloza




jednou větvený lineární  
dextran



substituovaný lineární  
guarová guma



několikrát větvený lineární  
amylopektin, glykoge



cyklický  
cyklodextrin

## polysacharidy


### struktura polysacharidů

- primární - pořadí monosacharidů  
pravidelná (amylosa, arabinoxylany), ale i nepravidelná (pektin)
- sekundární  
konformace, vzájemná vazba. Lineární molekuly často vzájemné H-vazby, či dokonce šroubovicové konformace (karagenany)
- terciální  
kombinace sekundárních struktur - krystalické mikrofibrily celulosy, šroubovice karagenanu


polysacharidy jsou **polydisperzní**



Amylose



Amylopectin



Glycogen



dextran


## polysacharidy

### klasifikace - dle původu

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| polysacharidy rostlin   | významné pro výživu<br>také jako aditiva (přirozená i modifikovaná):<br>např. gummy, agary, algináty |
| polysacharidy živočichů | malý význam ve výživě  |

### podle funkce

- zásobní (rezervní) glykogen, škrob
  - škroby (hlízy, obiloviny, ...)
  - neškrobové polysacharidy (fruktany, xyloglukany, polysacharidy luštěnin, gummy semen)
- stavební (strukturní) chitin, celulóza + necelulosové polys. (hemicelulóza [β-glukany, arabinoxylany obilovin], pektiny)
- ostatní (hydrofobizace, ochrana) rostlinné exudáty (arabská guma) a slizy (okra)



škrobová zrna rýže

### Nutriční hledisko

- |   |  |
|---|--|
| využitelné                              | rostlinné škroby, glykogen   |
| nevyužitelné (vláknina, dřívě balastní) | celulóza, hemicelulóza, pektin (relativně využitelný), modifikované škroby, slizy, gummy, chitin |

Potravinářství: zejména stavební polysacharidy rostlin (agar, karagenany, algináty) a polysacharidy MO: xanthan

## polysacharidy

### výskyt v potravinách

#### ovoce

pektin > celuloza + hemicelulózy (zejm. xyloglukany) > lignin

škrob ubývá během zrání (jablka 3→0 %; banán výjimka: 3%)

#### zelenina

škrob převládající polysacharid, zráním naopak přibývá

další: celuloza (a hemi-), pektin, lignin

u některých druhů převažují fruktany (topinambury, česnek, cibule)

#### obiloviny

hlavně škrob, dále hemicelulózy (arabinoxylany ječmene a ovsa,  $\beta$ -glukany ovsa)

otruby: lignin

*Obsah polysacharidů v pšeničné mouce*

Polymer	Obsah v %
škrob	60-80
neškrobové polysacharidy	3-11
celuloza	0,2-3
hemicelulosa	2-7
arabinoxylany	1-3
$\beta$ -glukany	0,5-2
xyloglukany	0,2-0,4
pektiny	0,3-0,5
glukofruktany (fruktany)	1-4

*silně závisí na stupni vymletí (endosperm 83 %  
hmotnosti zrna, otruby 15 %, klíček 2 %)*

## polysacharidy

### fyziologie a výživa

#### využitelné

(škroby, glykogen)

#### částečně využitelné

#### nevyužitelné (dříve balastní)

alespoň pro monogastrické

(*celulosa, hemicelulosa, pektin, lignin, aditivní škroby*)

= vláknina (vláknina potravy)

~ roughage, dietary fiber

#### 1. Využitelné sacharidy

Polysacharidy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ škrob</li> <li>■ dextriny (vzniklé hydrolyzou škrobu)</li> <li>■ glykogen jaterní a svalový</li> </ul>
Oligosacharidy (hlavně disacharidy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sacharóza (řepný či třtinový cukr)</li> <li>■ maltóza (sladový cukr)</li> <li>■ laktóza (mléčný cukr)</li> </ul>
Monosacharidy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ glukóza (hroznový cukr)</li> <li>■ fruktóza (ovocný cukr)</li> <li>■ ribóza</li> </ul>
Deriváty sacharidů	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aminocukry (glukozamin)</li> <li>■ alkoholické cukry (sorbitol)</li> </ul>

#### 2. Špatně využitelné sacharidy

Monosacharidy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ xylóza</li> <li>■ arabinóza</li> </ul>
Oligosacharidy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ rafinóza, stachyóza, galaktinozitol</li> </ul>
Polysacharidy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ inulin (polyfruktosan)</li> </ul>

#### 3. Sacharidy nevyužitelné (balastní)

Monosacharidy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mannóza, sorbóza</li> </ul>
Polysacharidy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ celulóza, hemicelulózy, pentózany</li> <li>■ rezistentní škrob</li> <li>■ pektiny</li> <li>■ chitin</li> </ul>

## polysacharidy


### použití polysacharidů v potravinářství

- **textura potravin**, organoleptické vlastnosti  
(plnidla, zahušťovadla, stabilizátory, gelotvorné látky)
- význam roste s popularitou výrobků **se sníženým obsahem tuku**
- dříve hlavně nativní škrob, dnes **na vzestupu modifikované škroby**  
(modifikované škroby, celulosy, gummy, polysacharidy MO)
- **neškrobové polysacharidy**: gummy (guarová, lokustová), karagenany, agary, pektiny, algináty
- populární přírodní **rozpustná vláknina** (např. *Psyllium* - rozp. vláknina ze semen jitrocele), chitosan


## polysacharidy

### stavební polysacharidy rostlin


celulóza



pektin



lignin




## polysacharidy

### zdroje a využití vlákniny


#### pektin

v ovoci, do marmelád, jogurtů  
kys.galakturonová botná → gel




#### gumy (guarová, ...)

podobná struktura jako pektin,  
v rostl. šťávách  
zahušťování, mražené výrobky




#### lignin

dřevnatá vláknina, nepolys.  
stvolý, semena, zrna  
zkoumají se jeho účinky proti rakovině




#### polysacharidy řas

stabilizátory, zahušťovadla  
(agar, alginát, karagenan, ...)  
pudinky, zmrzliny




#### chitin

exoskelety, houby, řasy  
hypocholesterolemický efekt







## Vědci patentovali způsob, jak zvýšit využitelnost dřeva

věda & výzkum | 18. října 2016 | Ema Wiesnerová | CC-BY




[zajímavost z muni](#)

## polysacharidy

### vláknina

- rostlinný původ
- neštěpitelná trávicím aparátem ⇒ nestravitelná
- nevyužitelná jako přímý zdroj E
- prebiotikum
- polysacharidy + nepolysacharidové polymery



dřevo je vláknina

### Neškrobové polysacharidy a rezistentní oligosacharidy

Celulóza

Hemicelulóza ■ Arabinoxylany  
■ Arabinogalaktany

Polyfruktózy ■ Inulin  
■ Fruktooligosacharidy

Galaktooligosacharidy

Gumy

Slizy

Pektiny

### Analogní polysacharidy

Nestravitelné dextriny (škroby) ■ Rezistentní maltodextriny  
■ Rezistentní bramborový dextrin (škrób?)

Syntetické komponované polysacharidy ■ Polydextróza  
■ Metylcelulóza  
■ Hydroxypropylmetyl celulóza

Rezistentní škroby ■ Lignin

## polysacharidy

### vláknina


- **rozpustná vláknina**

- měkká, bobtnavá, absorbuje vodu
- substrát sacharolytických bakterií
- pektiny, gumy, slizy, polysacharidy řas, část hemicelulos
- zvyšuje viskozitu obsahu žaludku a střev (ovlivňuje absorpci látek)


- **nerozpustná vláknina**

- hrubá, plnidla
- nerozpustná ve vodě
- celulosa, lignin, část hemicelulos
- zvětšuje objem potravy
- zkracuje dobu průchodu, zlepšuje peristaltiku

ideální poměr 1 : 3



Potravina	Vláknina (% sušiny)		
	rozpustná	nerozpustná	celkem
<b>ovoce</b>			
jablka	5,6-5,8	7,2-7,5	12,8-13,3
broskve	4,1-7,1	3,4-6,4	7,5-13,5
jahody	5,1-7,7	6,8-10,6	11,9-18,3
pomeranče	6,5-9,8	3,9-5,2	10,4-15,0
<b>zelenina</b>			
mrkev	4,4-14,9	10,4-11,1	14,8-26,0
zelí	13,5-16,6	4,2-20,8	27,6-37,4
rajčata	0,8-3,5	3,2-12,8	6,7-13,6
zelený hrášek	5,9	15,0	20,9
<b>luštěniny</b>			
fazole	7,2-12,4	9,1-9,6	16,8-21,5
<b>brambory</b>			
syrové	2,8-3,5	2,4-3,2	5,2-6,7
vařené	4,8	2,6	2,2
<b>cereální výrobky</b>			
mouka pšeničná bílá	2,0	1,2	3,2
mouka pšeničná	2,6	7,7	10,3
<b>celozrnná</b>			
chléb pšeničný	1,6-2,7	1,1-2,9	2,7-5,6
chléb žitný	6,7	6,6	13,3



**WHO nedoporučuje** dělit vlákninu na rozpustnou a nerozpustnou.

- rozdělení platí jen pro některé ze složek obou skupin
- vždy směs různých složek vlákniny. Nelze tedy říci, že některá potravina obsahuje pouze rozpustnou či pouze nerozpustnou vlákninu.

<b>funkce vlákniny</b>	<b>rozpustná</b>	<b>nerozpustná</b>
regulace digesce a absorpce sacharidů v tenkém střevě	★	
regulace absorpce tuků a cholesterolu v tenkém střevě	★	
vazba žlučových kyselin na přechodu tenkého-tlustého střeva	★	★
vazba vody a zvětšení střevního obsahu	★	
substrát pro sacharolytické bakterie (které ji fermentují na krátké mastné kyseliny)	★	
naředění toxického obsahu střeva	★	★
úprava doby průchodu tráveniny	★	★

**Table 1.** In vitro studies on the effect of fiber on mineral availability.

Type of fiber	Source	Type of study	Effect on mineral
Cellulose	Modified cellulose Rice bran	Binding Solubility	Zn binding ↑Ca and Zn solubility due to cellulase treatment but no ↑ in Fe
Hemicellulose	Wheat bran	Binding	Fe, Zn binding
Water soluble hemicellulose	Rice (isolated/ purified)	Binding	Ca, Mg binding
Alkali soluble hemicellulose	Pearl millet		Liberation upon hemicellulase treatment ↑ in Fe with xylanase treatment
Hemicellulose Pectin	Semi-purified, mostly galacturonic acid	<sup>59</sup> FeSO <sub>4</sub> binding/ solubility-dialysis	No effect on Zn Minimal binding
Highly esterified pectin	Low methoxylpectin (citrus)	Binding	Strong Fe <sup>3+</sup> , Ca, Zn binding
Low esterified pectin	Citrus	Dialysis	↓10% Ca availability ↓37% Fe No effect on Zn

## polysacharidy

### vláknina - energie vlákniny

- v potravinách jako „sacharidy“, avšak málo využitelná
- částečně trávena ve střevě
  - rozpustná: částečně štěpena již v tenkém střevě
  - nerozpustná: odolává, částečně až v t.s.
- obojí hlavně mikroorganismy ( → krátké mastné kyseliny: 2-4C)
- zisk cca 3 kJ/g (vs. škrob 17)
- ovlivnění glykemického indexu

Vysoký obsah vlákniny	Střední obsah vlákniny	Nízký obsah vlákniny
<b>Zelenina</b>		
Zelený hrášek (12) Listový špenát (7) Mangold	Srdíčka artyčoků Výhonky fazolí Fazolky zelené (3) Brokolice (4) Růžičková kapusta (3) Mrkev (3) Lilek Kukuřice cukrová Kapusta, zelí (3) Kedlubna Rebarbora Brambory se slupkou Pórek (4)	Výhonky vojtěšky Chřest (1) Květák (2) Celer (2) Okurka, salát (2) Cibule, česnek, houby (2) Brambory bez slupky (2) Ředvička (1) Rajče, paprika (1) Cuketa
<b>Ovoce</b>		
Neloupané jablko Avokádo Ostružiny (8) Borůvky Maliny Rybíz (9) Fíky, datle Hrušky Sušené švestky (17) Rozinky (35)	Oloupané jablko Kiwi Mango Pomeranč, mandarinka Švestky (4) Jahody	Meruňky (2) Banány (1) Třešně (1) Grapefruity Hroznové víno (1) Broskev (2) Ananas (1) Meloun (0)
<b>Chléb</b>		
	Žitný chléb 100% Celozrnný chléb nebo pečivo (7)	Částečně celozrnný chléb Bílý chléb nebo pečivo Pita chléb Tortilla
<b>Těstoviny</b>		
Celozrnné těstoviny		Ostatní těstoviny
<b>Zrna</b>		
Otruby (44) Ječmen Popkorn	Hnědá rýže	Bílá rýže
<b>Ořechy a semena</b>		
Mandle (15) Lněné semínko (14) Sója	Arašidy (5), arašidové máslo (7) Vlašské ořechy (5) Kokos Pistácie Lískové ořechy (6) Slunečnicové a sezamové se- mínko	
<b>Luštěniny</b>		

Všechny druhy fazolí (7)

Všechny druhy čočky (8)

zdroj:

[GROFOVÁ, Zuzana. Vlákna. \*Medicína pro praxi\*. 2009. 206-208.](#)



## polysacharidy

### vláknina - metody stanovení

#### více možností

(ne)enzymaticko-gravimetrické metody

enzymaticko-chemické (kolorimetrické/chromatografické)

#### nejčastější postup

#### enzymaticko-gravimetrický postup podle AOAC

(Association of Official Analytical Chemists)

umožňuje stanovit: polysacharidy buněčných stěn, část rezistentního škrobu, gumy, slizy a lignin.



#### TOTAL DIETARY FIBER ASSAY

Heat Stable,  $\alpha$ -Amylase, incubation at pH 6.0, 15 min., 95 °C



Protease incubation at pH 7.5, 30 min., 60 °C



Amyloglucosidase incubation at pH 4.5, 30 min., 60 °C



Ethanol Precipitation



Alcohol and Acetone Washes



Drying

↙		↘
Kjeldahl Protein		Ash Determination
Determination		5 hour, 525 °C

↙ ↘

Calculation of Total Dietary Fiber

#### Summary of Procedure

This assay determines the total dietary fiber content of food using a combination of enzymatic and gravimetric methods. Samples of dried, fat-free foods are gelatinized with heat stable  $\alpha$ -amylase and then enzymatically digested with protease and amyloglucosidase to remove the protein and starch present in the sample. Ethanol is added to precipitate the soluble dietary fiber. The residue is then filtered and washed with ethanol and acetone. After drying, the residue is weighed. Half of the samples are analyzed for protein and the others are ashed. Total dietary fiber is the weight of the residue less the weight of the protein and ash.

## polysacharidy

### příjem vlákniny

vláknina dříve *balastní látka* → snahy o omezení,

Napoleonův kuchař Parmentier: omezení vlákniny v chlebu na přelomu 18/19.stol. (*menší objem, energeticky bohatší, méně se kazí*)

Bílý chléb získal převahu až v minulém století.

Během 20. století velká proměna stravovacích návyků

#### nízký příjem do jisté míry civilizační choroby

Vláknina je faktorem nižšího výskytu střevních chorob (např. kolorektálního karcinomu) africké oproti evropské populaci

průměrný příjem v Česku 12 g/den\*

(98 % populace < 25 g)

v USA: 15 g

doporučený denní příjem: **30 g**

rozpustná:nerozpustná **1:3**

## HIGHEST-FIBER DIET



#### Daily fiber consumption

Recommended	>30 g/d
Actual intake	<20 g/d
Rural Chinese	80 g/d
Paleolithic ancestors	>100 g/d
Native Americans	
> 100 years ago	>100 g/d
Rural Africans	120 g/d
Hunters/gathers	123 ± 7
Chimpanzee	>200 g/d

### **ZDROJ VLÁKNINY**

Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 3 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 1,5 g na 100 kcal.

### **S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY**

Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 6 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 3 g na 100 kcal.

## chitin (a chitosan)

2. nejrozšířenější polysacharid na zemi (po celulóse).

lineární polymer z jednotek N-acetylglukosaminu a glukosaminu

stavební polysacharid bezobratlých, hub (žampiony), plísní (*Aspergillus oryzae*, *A. sojae*, např. fermentované sójové boby)


a kvasnic (*Saccharomyces cerevisiae*)

### Ve stravě:


- houby,
- některé fermentované potraviny (sója),
- hmyz, celí korýši, stopově v pečivu (z kvasnic)

Komerčně z krunýřů mořských bezobratlých (po odstranění bílkovin)

deacetylací ⇒ **chitosan**



VAVŘÍKOVÁ, E., & VINŠOVÁ, J. (2009). [Chitosan a jeho farmaceutické aplikace](#). *Chemické listy*, 103, 56-65.



### chitosan

hlavní podíl glukosaminu

⇒ rozpustný ve vodě, nerozpustný v zásadách

tvorí viskózní disperze;  
stejně jako chitin nestravitelný, navíc snižuje hladinu cholesterolu a tuků v séru;  
emulgátor margarínů, zahušťovadlo, farmacie, kosmetika

doplňěk k hubnutí, ale také nosič léčiv

# pektiny

- značně **polydisperzní polysacharidy**
- obsaženy v **pletivech vyšších rostlin**
- **ovlivňují texturu ovo-zel**
  - ovoce ~1 % (hodně: jablka, slívy, rybíz; brusinky, málo: třešně, borůvky <0.5 %)
  - zelenina max 0.5 % (mrkev, rajčata)
- gely málo viskózní (nevyužívá se k zahušťování), viskozitu zvýší sacharóza a  $\text{Ca}^{2+}$

Strukturu tvoří **tři domény:**

- a) **polygalakturonát**, částečně esterifikovaný methanolem a acetátem (25-100 jedn., až 75 % esterifikováno)


- b) **rhamnogalakturonan I**



slepé větve zakončene rhamnózou (její celk. obsah 1-4 %).  
Také arabinóza a galaktóza.

- c) **rhamnogalakturonan II**

obsahuje navíc další další cukerné zbytky, řetězce zesíťeny kyselinou boritou



\*D-Dha = 3-deoxy-D-lyxo-2-heptulosaric acid


\*\*Kdo = 3-deoxy-D-manno-2-octulosonic acid

# pektiny

## Enzymatická hydrolýza pektinových látek

nativní enzymy ovoce i zeleniny (pektinesterasy, pektindepolymerasy), v kyselém i alkalickém prostředí  
**hydrolýza esterových vazeb** → nízkoesterifikované pektiny (**pektové kyseliny**),  
reagují s  $Me^{2+}$  kationty → **spontánní želírování** (ovocné šťávy), tvrdnutí (brambory, květák)

enzymy lze inaktivovat teplem, za cenu změny chuti



# pektiny


**Tvorba gelů** závisí na esterifikaci pektinu. Vysocesterifikované pektiny (>50%) tvoří **gely s cukrem v kyselém prostředí**.

Uchovávají strukturu i po ochlazení.


Tvorba pektinových gelů:

- **cukr** váže vodu, dehydratuje pektin
- **kyseliny** potlačují disociaci COOH skupin. Čím více skupin esterifikováno, tím méně kyselin je k tvorbě gelu třeba.
  - rychle želírující pektiny tvoří gely při pH ~3.3
  - pomalu želírující při ~2.8
  - nízkoesterifikované (<50 %) pektiny vyžadují k želatinaci přítomnost  $\text{Ca}^{2+}$  iontů. Jsou však termoreverzibilní.

*nízkoesterifikovaný pektin  
(množství -COOH skupin)*



*vysocesterifikovaný pektin*



# Zásadní složky marmelády

## Pektiny

Vařením jsou uvolněny ze slupek a jader a vzájemně se spojují do gelové sítě. Gel váže vodu a zůstává stabilní i po ochlazení (není termoreverzibilní). Obsah pektinu v ovoci se různí (někdy třeba přidat jiný druh či želírovací směs)

## Cukr


Důležitý pro chuť i samotný vznik marmelády. Poměr s ovocem asi 1:1. Váže vodu, což vede k většímu síťování pektinu (nejsou rozpuštěny). Snížení aktivity vody také zabraňuje bakteriálnímu růstu.

## Kyseliny

Ionizace pektinových COOH skupin působí repulzi molekul → snížení pH ji omezuje. Množství přirozených kyselin (citronová, jablečná, vinná) často nestačí.

# THE CHEMISTRY OF JAM-MAKING

**SUGAR**




**SUCROSE**  
(table sugar)

The majority of jam-making recipes call for an equal weight of fruit and sugar. Sugar boosts the gel-forming capability of the jam by drawing water away from pectins. It binds the water, meaning that with high levels of sugar, there is no longer enough water available in the jam to support microbial growth, therefore imparting a natural preservative effect.

**65-69%**  
**REQUIRED FINAL SUGAR CONTENT OF JAM**




**SETTING & PECTINS**



**PECTIN**  
(typical chemical structure)


Pectin is made up of a large number of sugar molecules bonded together in a long chain. The pectin content varies from fruit to fruit; fruits lower in pectin require more pectin to be added, either in the form of commercial pectin or by addition of fruit whose pectin content is higher. The 'setting point' when boiling jam is ~104°C; the pectin chain binds to itself, forming a gel network that traps liquid as the jam cools and helps it set.



**LOW IN PECTIN**  
Pears, peaches, cherries, strawberries, raspberries, blackberries, sweet plums, blueberries, elderberries.


**HIGH IN PECTIN**  
Apples, gooseberries, blackcurrants, sour plums, grapes, citrus rind.

**FRUIT ACIDS**



**CITRIC ACID**  
(occurs naturally in citrus fruits)

A frequent cause of jam not setting is a lack of acidity. Fruits themselves provide some acids naturally, but often extra acid will need to be added - this is commonly in the form of citric acid, but tartaric acid can also be used. A pH of between 2.8-3.3 is needed to help the pectin form a gel and allow the jam to set properly.



**TARTARIC ACID**  
(found in grapes)

**2.8-3.3**  
**OPTIMAL pH FOR SETTING**



## polysacharidy

### glykogen

jeden z mála živočišných polysacharidů

významných ve výživě (obsah v mase cca 0,1–0,2 %)

zásobní zdroj Glc pro buňky

(živočišné, bakteriální, plísňe i houby)

### v těle 250 až 800 g

- svalový:  $\frac{2}{3}$ , zdroj E (díky množství redukujících konců)
- jaterní:  $\frac{1}{3}$ , granule v cytoplasmě, udržuje glykémii (pokles → glukogenolýza)

### role post-mortem


(anaerobní glykolýzou → kys. mléčná → zrání)

⇒ množství glykogenu vliv na kvalitu masa

v potravě zpracován  $\alpha$ - a  $\beta$ -amylasou

→ dextriny → Glc, maltóza

strukturou se glykogen velmi podobná složce škrobu amylopektinu ⇒ „živočišný škrob“



$>10^6$  Glc vázaných  $\alpha$ -(1→4), jednou za 8-12 jednotek vazba  $\alpha$ -(1→6)

# škrob

*amylum*, starch


- hlavní zásobní polysacharid rostlin
- v plastidech - organelách v cytoplasmě (zde i biosyntéza)
  - přes den v pletivech fotosyntézou *přechodný škrob*,
  - v noci je zdrojem sacharózy → semen, plodů, hlíz, kořenů,
  - tam syntéza zásobního škrobu v amyloplastech
  - skladování: *škrobová zrna* (granule)

## struktura škrobu




- amylosa
- amylopektin

obvykle v poměru 1:3, ale i speciální odrůdy

- amyloškroby
- voskové odrůdy (více amylopektinu)



bimodální distribuce granulí  
cereálních škrobů 20 a 5 μm



## škrob

základní složky škrobu: homopolysacharidy amylosa a amylopektin


### Amylosa

$\alpha$ -D-(1 $\rightarrow$ 4)-glukan


lineární molekula

částečně esterifikována P (0,0x%)

polydisperze: 1000-2000 jednotek u cereálií,  
4500 brambor



helikální úsek amylosy





### Amylopektin

D-glukóza (1,4) a po  
10-100 jedn. větvení (1,6).

částečně esterifikován


stupeň polymerace 50k až 1M

větvená struktura A(vnější řetězec),B(vnitřní),C(hlavní)



radiálně amylopektin, kolem asociovaná amylosa, v  
helikálních částech amylosy inkluze lipidů,  
v povrchových vrstvách granulí **malé množství**  
**bílkovin** (např. friabilin, mající vliv na pevnost zrn)

ukládána forma: [škrobová zrna](#)



$$\downarrow$$

$$6$$


větvení amylopektinu

## škrob

zdroje a výroba škrobu

u nás:

**brambory**, obiloviny

jinde také:

sladké brambory,  
maniok

ovoce, semena:

banány, kaštiny, oříšky

Rostlina	obsah škrobu (%)
rýže	70-80
brambory	17-24 (v sušině až 85 %)
ječmen	52-62
pšenice	59-72
žito	52-57
kukuřice	65-75
fazole, čočka, hrách	46-54



Albert Eckhout (circa 1610–circa 1666)

*Manihot esculenta*

maniok jedlý ~ cassava ~ yuka ~ tapioka

## škrob

výroba z brambor


zrna v amyloplastech volná, nevázaná

⇒ jednoduchý postup

hustota ~ 1,6 g/cm<sup>3</sup>


→ dekantace

→ čistý škrob



## škrub


## mazovatění, želatinace



viskogram:

pšeničný (1), bramborový (2), kukuřičný škrob (3)

**imbibice:** cca 0,2 g vody na 1 g škrobu beze změny objemu




místa interakce glukánů s vodou.  
Na 1 Glc připadá 1,5 vody

Záhřevem roste absorpce vody (vratná), než nastane **botnání**.  
Po dosažení teploty cca 60 °C rozrušování mezimolekulárních vodíkových můstků (počáteční **želatinační teplota**)  
→ **želatinace**


nevratný proces: prudké zvětšování objemu zrn, hydratace nových skupin, amylosa difunduje do roztoku → **škrobový maz** (=kolapsovaná, mnohonásobně zvětšená zrna [1g až 200ml] obklopená amylosou)

se zvyšující teplotou pokračuje hydratace, zrna ztrácejí integritu (rozmezí teplot 10–15 °C). Nad teplotou mazovatění hydratace pokračuje natolik, že vodíkové můstky jsou zpřetrhány a dochází k **desintegraci zrna**

zchlazení: **škrobový gel** (obnova H-vazeb, podle stupně degradace, poměru PS, =želatinované granule v matici tvořené amylosou)



### TEMPERATURE AND PORRIDGE THICKNESS




Heat Gelatinization of Wheat Starch (low iodine)



GuelphCerealLab  
Odebirat 40

## škrob

mazovatění, želatinace - *retrogradace*



### Ochlazování

- vzniká škrobový gel: spojitá, pevná trojrozměrná síť, obsahující velké množství vody, viskozita roste (viskózní pasty)

### Retrogradace

- škrobový gel po čase mění strukturu a reologické vlastnosti, vznik dvoufázového systému pevná látka-kapalina
- další tvorba intermolekulárních vodíkových vazeb (přednostně u amylosy)
- závislá na obsahu vody (20-90%, nejvíc ~50)

### Podle teploty:

- pod -5 °C retrogradace inhibována
- 5 až 25 °C vysoká míra retrogradace
- > 30 °C potlačení retrogradace
- > 65 °C žádná retrogradace


mražené potraviny:


→ vhodnější vysoký poměr amylopektinu



## škrob

### mazovatění






## A Tasting of Culinary Science—Starch




The Culinary Institute of America

 Odebírat 74 154

## škrob


*změny při pečení*



## škrob

### změny při pečení chleba

- cca desetina škrobových zrn poškozena mletím
- **enzymová hydrolýza** při kynutí působí  $\alpha$ - a  $\beta$ -amylasy
  - **amylosa**  
 $\alpha$ -amylasa (endoglykosidasa ~ dextrinogenní) štěpí 1→4 vazby  
 → Glc, maltosa, limitní  $\alpha$ -dextriny  
 $\beta$ -amylasa (exoglykosidasa, sacharogenní) odštěpuje maltosu
  - **amylopektin**  
 $\alpha$  i  $\beta$ -amylasy: cca z poloviny; jen do míst větvení  
 vazby  $\alpha(1\rightarrow6)$  nejsou štěpeny → neštěpitelné dextriny (postupně hydrolyzovány pullulanásou a isoamylasou)
- rheologické vlastnosti těsta řídí **lepek** (v případě pšenice gel z gliadinu a gluteninu), interakce granulí s bílkovinami a mazovatění škrobu
- **štěpení polysacharidů amylasami i při teplotách** ~ 90 °C (déle při nižší teplotě→víc cukrů, např. [pumpernickel](#))
- **želatinace** omezena nedostatkem vody
- tuk, olej a emulgátory zpomalují botnání a omezují želatinaci (bílé pečivo obsahuje méně tuku a želatinuje víc)
- kůrka: **pražné dextriny**:  $\alpha$ -(1→6) a etherové (6→6) vazby. (160°C+: neenzymová hydrolýza a následná kondenzace)
- **retrogradace** → **tvrdnutí chleba** (krátkodobá reželatinace rozpečením)



škrobová zrna v pšeničném těstě

## Stárnutí a tvrdnutí pečiva

zahrnuje **různé děje**:

- kůrka tuhne a stává se žmoulavá  
vlhkost prochází z chleba ven skrze kůrku
- chléb celkově schne
- ztrácí se aroma  
vonné látky vytékají a/nebo jsou vázány na škrob,  
částečně uvolnitelné zahřátím
- střídka bělá a průhlední  
škrob retrograduje (urychleno nižší  
teplotou, avšak zastaveno zmražením)



*Křupavé pečivo se prodává v papíru.  
Francouzská bageta vydrží do  
večera křupavá v papírovém pytlíku,  
během pár dní ale zkamení.*




*měkké pečivo bývá běžně v plastu -  
dobře uchová vlhkost*

### možnosti uchování pečiva

- papírový pytlík  
pečivo zůstává křupavé, ale brzy tvrdne, nemožnost rozpéct
- plastový obal  
uchová vlhkost za cenu ztráty křupavosti, lze rozpéct
- mraznička  
dlouho uchová, pomalá retrogradace, lze rozpéct 150 °C → jako nové;  
pozvolna rozmrazit, v předehřáté troubě rozpéct, rozkroje zakrýt
- lednička: nezplesniví, ale zretrograduje

## škrob

### vaření těstovin, rýže



vařením těstovin se amylosa uvolňuje do roztoku

→ **slepování**

#### prevence:

těstoviny: přídavek emulgátoru (emulgace amylosy)

rýže: proprání (odstranění přebytečného škrobu)

želatinaci omezí malé množství soli (trochu)



## škrob

### další potraviny

konzervace nezralého ovoce / zeleniny s vyšším obsahem škrobu,  
např. jablka, hrášek: často husté **kalné nálevy**


kyselé prostředí: hydrolýza škrobu → méně viskózní roztoky

delší ohřev okyselených pudinků s ovocem → **řídnutí pudinku**

**ztekucování dresinků**, majonéz: enzymy zeleniny



konzervace nezralého ovoce  
může způsobit zakalení kvůli  
obsahu škrobu







cukry



škrob



vláknina



bílkoviny



organické  
kyseliny




tuky



minerální látky



vitamíny



*Škrobová zrna brambor mají velikost 15 až 50  $\mu\text{m}$ . Nativní škrob poměrně rezistentní, mazováním při vyšších teplotách se stravitelnost výrazně zvyšuje.*

## škrob

### *brambory*

1 porce (170 g) ~ 6 % denní doporučené energie ze sacharidů

nativní b.škrob málo stravitelný

### složení

hlavní polysacharid: **škrob**

**vláknina** (převážně ve šlupce)

**bílkoviny** cca 10 % sušiny (sušina cca 25 %), (složení 83 % IEAA),

hodně Lys na rostlinu

vitaminy (**vit.C** ~ 50 % v jedné porci)

minerální látky (% čerstvé hm.: **K** 0,45; **P** 0,35; **Mg** 0,1; **Ca** 0,05, **Na** 0,01 %)



## škrob


### *přemrzlé brambory*

skladování kolem bodu mrazu ⇒ **enzymová hydrolýza**

škrob → oligo- a monosacharidy (až několik %)

**sladká chuť**, hnědnutí při smažení

odstranění sladké chuti: skladování několik dní při ~ **20 °C**



## škrob

### výživové hledisko

škrob = využitelný sacharid, snadno štěpen v t. střevě

### enzymy

pankreatická amylasa i ve slinách,

pankreatická isoamylasa  $\alpha$ -(1 $\rightarrow$ 6) škrobu a glykogenu

většina škrobů **rychle či pomaleji strávena** v tenkém střevě

Některé však nezpracovatelné (nebo nedostupné)

pro enzymy  $\rightarrow$  nevyužitelné

retrogradací škrobu + 1 % rezistence ( $\rightarrow$  MO)

klasifikace a příklady stravitelných a rezistentních škrobů:

Typ škrobu	Trávení v tenkém střevě	Zdroj
<b>rychle stravitelný</b>	úplné	čerstvě vařené škrobnaté potraviny
<b>pomalou stravitelný</b>	pomalé, ale úplné	většina syrových cereálií
<b>rezistentní</b>		
fyzikálně nedostupný	pomalé, částečné	částečně rozemletá zrna a semena
rezistentní granule	pomalé, částečné	syrové brambory a banány
retrogradovaný	částečné nebo zcela rezistentní	tvrdý chléb, staré vařené brambory, kukuřičné lupínky

## škrob

### využití škrobu

#### v potravinách (textura, funkční vlastnosti)


- zahušňovadla a plnidla
- želírující látky
- poutače vody
- náhrada tuků
- nosič vonných látek
- stabilizátory emulzí a pěn

#### používané formy:

nativní zrna, dispergovaná zrna, sušené disperze

surovina pro výrobu **cukrů** a jejich derivátů,

surovina pro výrobu **modifikovaných škrobů**



**50:50** potravinářství : průmysl

#### průmyslové aplikace škrobů


- papírenství
- textilnictví
- farmaceutika
- stavebnictví
- kosmetika

## škrob

### modifikované škroby

#### omezující vlastnosti nativních škrobů

- nerozpustné ve studené vodě
- ✘ v kyselém prostředí hydrolyzují
- ✘ viskozita mazů je vysoká → gumovité
- ✘ amylosové gely rigidní, kalné, retrogradující
- ✘ voskové gely jsou zase měkké




#### modifikované škroby

- **přeměněné**  
hydrolyzované, oxidované
- **zesítěné**
- **substituované**  
estery, ethery

# škrob

## modifikované škroby





## škrob

### modifikované škroby - přeměněné

příprava z nativních:

- kyselou hydrolyzou: škroby modifikované kyselinami
- oxidací: bělené a oxidované škroby
- záhřevem: dextrinované škroby

#### kyselá hydrolyza

zahřívání koncentrovaných disperzí se zředěnými kyselinami (HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) < želatinační teplota

štěpení části amylosy i amylopektinu

→ **rozpuštěný škrob**,  
granule botnají i ve studené vodě

hydrolyzované škroby:

- méně viskózní disperze (možno větší konc.)
- plnidla, náhrady tuků
- cukrovinky, pudinky, dropsy

#### oxidace a bělení

malým množstvím peroctové / peroxidu / chlornanu sodného / manganistanu draselného

→ **bělení**: odstranění doprovodných barevných látek

**oxidace**:

stejná činidla, alkalické prostředí

-OH na C-6 → karbonyly až karboxyly  
na C-2 a 3 → dikarboxylová kyselina


vznikají oxidované škroby:

- čiré tekuté soly
- nižší viskozita
- omezená retrogradace (repulze COOH sk.)


použití jako hydrolyzované, +lepší adheze (obalování masa)

## škrub

## modifikované škroby - přeměněné - oxidace



Chloman sodný NaClO je silné oxidační činidlo. Je součástí dezinfekcí, bělicích prostředků i bazénové chemie. Po smíchání s vodou vytváří silně oxidující kyselinu chlornou.  
(reakce s kyselinou močovou → chlorkyan)



**E 1404**

oxidovaný škrob

**MoramyI OXB** (=bramborový)

papírenství: klížení, vytvrzování, úprava povrchů

**MoramyI OXP** (=pšeničný)

sádkartonové desky, zahušťovadlo, stabilizátor, želé cukrovinek, obalování masa a ryb, textilní průmysl (šlichtování)



Sojanéza Kalma

Linecké rohlíčky polomáčené  
s ovocnou náplní

Veganline rostlinný sýr uzený

komplexní servis pro spotřebitele  
objektivně • nezávisle • bez reklam

Q HLEDAT

TESTY

PORADNA

KALKULAČKY

JAK VYBÍRAT

NEBEZPEČNÉ VÝROE

Nákupní průvodci • Ěčka • Nadměrné obaly • Spotřebitelské značky • Nešvarník • Značka kvality

dTest » Jak vybírat » [Databáze éček](#) » Oxidované škroby**E 1404** Oxidované škroby

alternativní název: oxidovaný škrob

Skupina: stabilizátory, zahušťovadla

Původ: syntetický



bezpečná přísada

Oxidovaný škrob je uměle připravovaná látka.

Látka je v EU povolena.

## škrob

### modifikované škroby - přeměněné

#### dextrinované škroby

zahříváním nativních a mírně okyselených škrobů (HCl, fosforečná, sírová) na 100-200 °C, min.-hod.

reakce: hydrolýza, transglukosidace, desintegrace

#### → bílé dextriny

nejkyselější prostředí, krátký ohřev, převládá hydrolýza  
viskózní, tendence retrogradovat

#### → žluté dextriny

rozpustné ve studené vodě  
hydrolýza → transglukosylace → polymerace (→20% větv.)

#### → britské gummy (nejméně kyselé prostředí)

nejméně kyselé prostředí, transglukosidace (→25% větv.)  
rozpustné ve studené vodě, adhezivní látky, povrchy  
cukroví, enkapsulace

**K čemu?** adhezivní látky (lesklé povrchy cukrářských výrobků), nosiče aromat a nerozp. aromat



## škrob

### modifikované škroby - **zesíťené**

#### zesíťené škroby

dva hlavní typy:

- adipáty (od kys. adipové)
- fosfáty

reakce → **příčné vazby**

příčná vazba za 1-2k Glc jednotek  
přesto **rheologické změny**


Δ integrita zbotnalých granulí

tvoří **nekohezní** pasty (méně gumové)



→ zahušťování omáček, polévek

→ náplně pečiva

+ textilní průmysl



a) nativní, b) zesíťovaný škrob pod  
elektronovým mikroskopem




škrobové adipáty

škrob


adipanhydrid

kys. adipová



škrobový adipát

škrobové  
fosfáty



## škrob

### modifikované škroby - zesítěné

#### E 1412

fosforečnanový diester škrobu  
diškrobofosfát

#### Moramyl ZB (=bramborový)

mod. škrob rozpustný za studena, masové konzervy, paštiky, majonézy, náplně

#### Moramyl ZBH (=bramborový)

mod. škrob rozpustný za tepla, marmelády, dresingy, masná výroba



komplexní servis pro spotřebitele  
objektivně • nezávisle • bez reklam

 **Q HLEDAT**

email  
heslo  
získat

TESTY PORADNA KALKULAČKY **JAK VYBÍRAT** NEBEZPEČNÉ VÝROBKY ČLÁNKY P

Nákupní průvodci • Ěčka • Nadměrné obaly • Spotřebitelské značky • Nešvarník • Značka kvality dTest • dTest obchodní

dTest » Jak vybírat » Databáze éček » Zesíťovaný fosforečnan škrobu



#### E 1412 Zesíťovaný fosforečnan škrobu

alternativní název: fosforečnanový diester škrobu, fosfátový diester škrobu

Skupina: stabilizátory, zahušťovadla

Původ: syntetický

 bezpečná přísada

Fosforečnanový diester škrobu je umělý stabilizátor a zahušťovadlo.

Látka je v EU povolena.



Šlehačkový miša čoko poleva



Křen pálivá pochoutka pro labužníky



Budapeštská pomazánka



## škrob

### modifikované škroby - stabilizované

#### stabilizované škroby

substituce -OH skupin:

**estery** (acetáty, fosfáty, estery vyšších MK)

**ethery** (hydroxyalkylethery)

z nativních nebo modifikovaných škrobů

~ 2.5 % acetylových skupin

snížení želatinační teploty, stabilita vůči

retrogradaci, stabilita v kyselém prostředí

#### ethery

stabilizace emulzí o/v - majonézy

ethery s vyššími MK

oblíbená modifikace:

**hydroxypropylované diškrobové fosfáty**

(pro nízké teploty, kyselé pH)

## škrob

### modifikované škroby - stabilizované

#### E 1442

hydroxypropyl diškrobový fosfosfát

#### TRECOMEX AET4

paštiky, masové konzervy  
(zabraňuje uvolňování masové šťávy)

palačinky, těstoviny  
(hladká textura, vodoodpudivý povrch)

## Holešovská výzva

Navigace: [Holešovská výzva](#) > [Čtení pro zdraví](#) > Actimel obsahuje E1442 !!

**Actimel obsahuje E1442 !!**

Actimel, jako mnoho dalších produktů Danone, obsahuje E1442 - geneticky modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo.... ničí slinivku... Nebezpečně

#### E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

alternativní název: hydroxypropylškrobový fosforečnan

Skupina: stabilizátory, zahušťovadla

Původ: syntetický



bezpečná přísada

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu je umělý stabilizátor a zahušťovadlo.

Látka je v EU povolena.



Šáteček s náplní povidlovou



Zárubova tatarka



Čokoládový dort



Sýrová omáčka



Topping s příchutí karamel



Lahůdka medovník



Prima Jogurt Lesní směs



Hermelinová pomazánka

## značení modifikovaných škrobů

<b>Kód</b>	<b>Látka</b>
E 1404	Oxidované škroby
E 1410	Fosforečnan škrobu (Fosforečnanový monoester škrobu, Fosfát škrobu)
E 1413	Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Monofosforečnan škrobového difosforečnanu)
E 1414	Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu (Acetát zesíťovaného fosfátu škrobu)
E 1420	Acetylovaný škrob (Acetát škrobu)
E 1422	Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu (Acetát zesíťovaného adipátu škrobu)
E 1440	Hydroxypropylester škrobu (Hydroxypropylškrob)
E 1442	Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu)
E 1450	Sodná sůl oktenyljantarátu škrobu (Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu, SSOS)
E 1451	Acetylovaný oxidovaný škrob

## škrob

### modifikované škroby

#### **výživové hledisko**

##### **přeměněné škroby:**

normální složky potravy  
(analogické produkty *in vivo*)

##### **stabilizované škroby:**

estery - stravitelnost srovnatelná s nativními  
ethery - nižší stravitelnost

##### **zesíťené škroby:**

nižší stravitelnost oproti nativním

## škrob

### hydrolyzáty škrobu

dříve hydrolýza kyselinami, dnes také enzymově

řada produktů (dlouhé řetězce, jednoduché cukry, větvení)

řada využití (sladidla, náhražky tuků a cukru)

#### kyselá hydrolýza škrobu

HCl v suspenzi škrobu

150 °C, několik minut

#### enzymová hydrolýza škrobu

$\alpha$ -(1→4): amylasy (exo-, endo-)

$\alpha$ -(1→6): pullulanasy

obdobné produkty jako kyselá hydrolýza,  
avšak lépe definované a regulovatelné.

Možno vytvářet speciální produkty (Fru, cyklo).

### produkty

směs sacharidů charakterizuje:

glukózový ekvivalent (dextrosový ekvivalent, DE)

DE 0            nativní škrob

DE 100         glukóza

DE <20        **maltodextriny**

nesladké viskózní roztoky

viskozita, hladkost, lesk → cukrovinky

brání krystalkům → zmrzliny

### škrabové sirupy

DE 20-38     typ I

DE 38-58     typ II   maltózový sirup

DE 58-73     typ III   maltózový sirup


DE 73+       typ IV   glukózový sirup

výroba cukrovinek, nealko, sirupy, zkvasitelné

## škrob

### hydrolyzáty škrobu

#### maltodextriny



#### Maltodextrin 1,5 Kg



#### popis produktu

**Cena:** 56 Kč/kg

**Počet dávek:** 35

#### Profil sacharidů Maltodextrinu:

Glukóza 1% z obsahu  
Maltóza 4% z obsahu  
Trisacharidy 7% z obsahu  
Polysacharidy 88% z obsahu


**DE (dextrose equivalent Maltodextrinu)** 15 g/100g

**Složení:** kukuřičný maltodextrin DE 15



*Hmotnost výrobku : 1500g*

## škrob

### hydrolyzáty škrobu: cyklodextriny



vzorec a kuželovitá struktura  $\beta$ -cyklodextrinu (7 jednotek glukosy)




enkapsulace

tvorba inkluzních komplexů  
omezení těkavosti, zvýšení  
stability.

→ nosiče vonných látek

## Využití cyklodextrinů v osvěžovačích vzduchu



### pohlcování zápachu

Cyklodextriny jsou kruhové molekuly, tvořené škrobem. Těkavé molekuly mohou pronikat do jejich kavity, kde jsou drženy a izolovány od okolí.

Nepolární pachové molekuly se zachycují v hydrofobním centru cyklodextrinu

