


Trvalá dentice, Vady

17. 5. 2022

Stadium prořezávání (erupce)




Stadium prořezávání (erupce)

Prořezávání zubů = růstový proces

Projevuje se tím, že zubní korunky v jistém časovém sledu vystupují z dásně, dosáhnou ústní dutiny a nakonec roviny okluze

U dočasné dentice probíhá mezi **5. - 30. měsícem po narození**

Růst a prodlužování (elongace) kořene budoucího zuba



Průběh:

Kořen zuba doroste ke dnu osifikovaného zubního lůžka


Při dalším růstu se zvedá a k povrchu dásňového valu vytlačuje zubní korunku

Komprese dásně - porucha cévního zásobení a v terminální fázi apoptóza/nekróza

Po odloučení odumřelé tkáně vznikne otvor pro zubní korunku

Stadium prořezávání (erupce)

Během pořezávání je korunka chráněna zbytky sklovinného orgánu = **redukovaný sklovinný epitel (REE)**



Když korunka dosáhne k dásňovému valu, redukovaný sklovinný epitel fúzuje s orálním epitolem

Během výstupu korunky z dásňového valu se **redukovaný sklovinný epitel** postupně od povrchu skloviny oddělí

Stadium prořezávání (erupce)

Když korunka zuba dosáhne roviny okluze, zbývá z redukovaného epitelu 1-2 mm široký proužek okolo cervikální části korunky - **těsnící epitelová manžeta (Gottliebova manžeta)**







Fig. 26.6 Diagrammatic representation of the development of the dentogingival junction during the eruption of a tooth. R.E.E. = Reduced enamel epithelium (green). Red outline delineates oral epithelium.



Copyright © 2003, Mosby, Inc., All rights reserved.




Vývoj alveolárního výběžku


Zakládá se souběžně s ostatními oddíly horní a dolní čelisti a probíhá na vazivovém podkladě (intramembranózní osifikace)

Zpočátku je nízký a dotváří se až s vývojem kořenů zubů a během prořezávání dentice, kdy se rozliší na

- a) kortikální ploténku (*lamina vestibularis, lamina oralis*)
- b) kribriformní ploténku (*os alveolare*)
- c) trámečky spongiózní kosti



: 25-5. Podélný a příčný (horizontální) řez mandibulou demonstруje stavbu alveolárních výběžků a alveolární kosti.



Časový přehled prořezávání dočasné dentice


		Exfoliace
i1	6. - 8. měsíc	7 rok
i2	7. - 12. měsíc	8 rok
c	15. - 20. měsíc	12 rok
m1	12. - 16. měsíc	10 rok
m2	20. - 30. měsíc	11-12 rok

Erupce dočasné dentice probíhá mezi 5. - 30. měsícem po narození

Dočasná dentice je plně funkční **do 6. roku**, poté začíná její náhrada definitivními zuby

Vypadání (exfoliace) dočasné dentice kopíruje prořezávání

Vývoj trvalé dentice



Vývoj trvalé dentice


Rozložen do podstatně delšího období než dočasné

Začíná v polovině 2. trimestru (**cca 4. měsíc prenatálního vývoje**) a končí prořezáním mezi 7. - 17. (40). rokem věku

Mechanismy i vývojová stadia jsou **obdobná** jako u dočasné dentice

Řezáky I_1, I_2 , špičák C a premoláry P_1, P_2 , se vyvíjí ze sekundární zubní lišty


Sekundární zubní lišta je derivátem lišty primární, **není souvislá**, ale je tvořena aggregacemi ektodermových a ektomezenchymových buněk v sousedství zárodků dočasných zubů




Vývoj trvalé dentice

Moláry M_1 , M_2 , M_3 se vyvíjí z **dorzálního (distálního) pokračování (prodloužení) primární zubní lišty**, z níž se vyvinuly zuby dočasné dentice

Vývojově moláry náleží k zubům dočasné dentice



Vývoj trvalé dentice



Časový sled utváření základů pro trvalé zuby (zubní zárodky trvalých zubů)


Prenatálně:

- M_1 4. měsíc - *náhradní lišta*
- I_1, I_2 5 - 6. měsíc
- C 8. měsíc

Postnatálně:

- M_2 6. měsíc - *náhradní lišta*
- P_1 10. - 12. měsíc
- P_2 18. měsíc (1,5 roku)
- M_3 5. rok - *náhradní lišta*

Permanentní moláry vývojově náleží k zubům dočasné dentice




Copyright © 2003, Mosby, Inc., All rights reserved.
fetus - stáří 6 měsíců (zubní lišty)

Vývoj trvalé dentice


Základ pro dočasný a definitivní zub leží původně ve stejné úrovni, oba obklopeny ektomezenchymem a sdílejí část dentálního vaku

Během dalšího vývoje definitivní zub sestupuje (a primární zub roste) a zaujme místo pod kořenem zuba dočasného


Základy obou zubů odděluje kostěná přepážka – vyvíjející se definitivní zub má samostatné lůžko



Obr. 83.
Vývoj zuba. Dočasný zub ve stadiu erupce (A), časné stadium



Bukolinguální řezy centrálními řezáky dítěte (novorozenec - 9 let)



Erupce trvalých zubů

U molárů probíhá obdobně jako u zubů dočasných

U trvalých řezáků, špičáků a premolárů je složitější – potřeba odstranit zub primární dentice

S růstem kořene trvalého zuba korunka tlačí kostní přepážku, jež odděluje oba zuby.


Dochází k rezorbcii kostěné komůrky

Po rezorbcii stropu korunka tlakem způsobí resorbcii kořene dočasného zuba

Role „-klastů“

Výsledkem je postupné zkracování kořene dočasného zuba

Paralelně s tím dochází ke změnám v zubní dřeni, periodonciu a epitelové úponové manžetě dočasného zuba



Erupce trvalých zubů

Periodontium ztrácí ligamentózní charakter

přeměna v řídké kolagenní vazivo (i nadále si udržuje schopnost rediferenciace z důvodu tvorby periodicia definitivního zuba)


Epitelová manžeta sestupuje apikálně

obnažení cementu a tím urychlení jeho resorpce

Zubní dřeň - přeměna v proužky hustého vaziva

... při zvýšené zátěži, např. rozmělňování hutného sousta, kdy vazivo již nestačí zuba při kousání a žvýkání dostatečně fixovat a stabilizovat, se proužky přetrhají a následuje **vypadnutí dočasného zuba (exfoliace)**

Kanál, vzniklý po vypadnutí dočasného zuba se nazývá **gubernakulární**. Je využit korunkou trvalého zuba k prostupu do ústní dutiny






Figure 10-22—cont'd B, Buccolingual sections through the deciduous first molar and permanent first premolar of the mandible at representative stages of develop-

Časový průběh vývoje trvalé dentice:

ZUB	ČELIST	Zubní pohárek	Začátek kalcifikace	Dokončení vývoje skloviny	Prořezání	Dokončení vývoje kořene
I 1	mandibula	5 - 6 m. pre	3 m.	5 r.	6 - 7 r.	9 r.
	maxilla	5 - 6 m. pre	3 m.	5 - 6 r.	7 - 8 r.	10 r.
I 2	mandibula	5 - 6 m. pre	4 m.	5 - 6 r.	7 - 8 r.	10 r.
	maxilla	5 - 6 m. pre	1 r.	6 - 7 r.	8 - 9 r.	11 r.
C	mandibula	8 m. pre	4 m.	7 r.	9 - 10 r.	13 r.
	maxilla	8 m. pre	4 m.	6 - 7 r.	11 - 12 r.	13 - 15 r.
P 1	mandibula	10 m. post	2 r.	5 - 6 r.	10 - 12 r.	12 - 13 r.
	maxilla	10 m. post	1 1/2 r.	5 - 6 r.	10 - 11 r.	12 - 13 r.
P 2	mandibula	18 m. post	2 1/2 r.	6 - 7 r.	11 - 12 r.	13 - 14 r.
	maxilla	18 m. post	2 r.	6 - 7 r.	10 - 12 r.	12 - 14 r.
M 1	mandibula	4 m. pre	novor.	3 r.	6 - 7 r.	9 - 10 r.
	maxilla	4 m. pre	novor.	4 r.	6 - 7 r.	9 - 10 r.
M 2	mandibula	6 - 12 m. post	2 1/2 - 3 r.	7 - 8 r.	11 - 13 r.	14 - 15 r.
	maxilla	6 - 12 m. post	3 r.	7 - 8 r.	12 - 13 r.	14 - 16 r.
M 3	mandibula	5 r. post	8 - 10 r.	12 - 16 r.	17 - 22 r.	18 - 25 r.
	maxilla	5 r. post	7 r.	12 - 16 r.	17 - 22 r.	18 - 25 r.

Table 26.1 Chronology of tooth development and the order of eruption

Smíšená dentice (smíšený chrup)

Kombinace dočasných a trvalých zubů


Období smíšené dentice začíná prořezáním M_1 a končí vypadnutím m_2

Trvá mezi 6. - 12. rokem

Exfoliace (vypadávání) zubů primární dentice kopíruje jejich prořezávání

1	střední řezáky	6. – 8. měsíc	7. rok
2	boční řezáky	7. – 12. měsíc	8. rok
4	špičáky	15. – 20. měsíc	12. rok
3	první stoličky	12. – 16. měsíc	10. rok
5	druhé stoličky	20. – 30. měsíc	11. – 12. rok

Smíšená dentice



Vývojové vady zubů a chrupu

Vývojové vady zubů a chrupu

Anomálie počtu zubů

- Zvýšený počet zubů
 - Rudimentární
 - Nadpočetný
- Snížený počet zubů
 - Hypodoncie
 - Oligodoncie
 - Anodoncie

Srostlice

- dentes confusi (pravé)
- dentes concreti (nepravé)
- zubní drůzy

Anomálie tvaru zubů

Anomálie velikosti zubů

- Makrodoncie
- Mikrodoncie

Anomálie tvorby tvrdých zubních tkání

- Sklovina
- Dentin
- Cement

Anomálie polohy zubů

- protruze
- transpozice
- rotace
- heterotopie
- retence

Anomálie prořezávání z časového hlediska

- dentitio tarda
- dentitio praecox



Redneck Bird Dogs

Who says pets don't look like their owners?

Anomálie počtu zubů

a) Zvýšený počet zubů (dentes supernumerarii, hyperdontie, polyodontie)

Častější v trvalé dentici,

Má tvar normální (**nadpočetný**) nebo abnormalní (**rudimentární, odontoid**)

Nepravá hyperdontie – při perzistenci některých dočasných zubů



Obr. 22, 23 Extrahované mesiodenty čípkovité (vlevo); hrbolekového a soudkovitého typu (vpravo).



Obr. 24, 25a Prořezaný čípkovitý mesiodens (vlevo); totéž v dočasném chrupu (vpravo).



Mesiodens – v mezeře mezi horními středními řezáky (kulovitý event. čípkovitý tvar

Dens parapremolaris - nadpočetný třenový zub na tvářové nebo patrové straně oblouku nebo **dens distopremolaris** (mezi P_2 a M_1)

Dens paramolaris - mezi první a druhou stoličkou na vestibulární straně oblouku

Dens distomolaris - nadpočetná 4 stolička (umístěna distálně od 3 moláru)

Dentes prelactales (dentes natales) - **předmléčné zuby – vzácné.** Malé nadpočetné zuby přítomné již při narození, se zakrnělou korunkou a bez kořene (vyskytuje se v oblasti dolních řezáků)

*diferenc. dg.: odlišit od dentitio precox
(předčasného prořezání dočasných řezáků)*

Dědičný základ nebo hormonální podklad – hyperplazie nadledvin



b) Snížený počet zubů - některé zuby se nezaloží

Hypodoncie - vrozené chybění jednotlivých zubů (méně než 6 zubů)

vyskytuje se u **0,7 %** (dočasná), u **2 %** (perm.) jedinců (**M₃, I₂, P₂/dolní**)

Oligodoncie - porucha, kdy chybí **více než 6 zubů**,

1 : 10 000, častěji u mužů - (zuby určité skupiny, familiární výskyt, AD dědičnost /součást různých syndromů

Anodoncie - úplné chybění zubů. Vzácná, spojena s celkovou dysplazií ektodermu a ektomezenchymu (syndrom 1. žaberního oblouku)

Christův-Siemensův-Touraneův syndrom - oligodoncie až anodoncie spojená s poruchou jiných orgánů ektodermového původu - kožních žláz a vlasů: anhidróza, hypotrichóza, suchá šedavá kůže, jemné krátké světlé vlasy, vystouplé čelo, sedlovitý nos, a tlusté rty; chybění potních žláz způsobuje poruchu termoregulace a hyperpyrexii



Hypodoncie




Oligodoncie

Srostlice

Pravé - dentes confusi (obr. C) - úplně srostlé zuby - společná korunka, kořen i zubní dřeň (společná dutina) – vznikají nejčastěji **splynutím zubních základů**

Nepravé - dentes concreti (obr. A, B) - dvě korunky a společný kořen vznikají srůstem cementu. Dentes geminati - vzácně rozdelením jednoho základu

Zubní drůzy (obr. D, E) - srůstem základů několika zubů (časté u premolárů)



Odontomy - smíšené nádory zubního původu (epitelomezenchymové)


Anomálie tvaru zubů

Časté, postihují korunku nebo kořen

Aberantní ameloblasty, abnormalní utváření Hertwigovy epitelové pochvy

Korunka: **hřebovité boční řezáky, odchylné uspořádání hrbolek u stoliček** (tuberculum paramolare, distomolare, anomale Carabelli)

Kořen: **počet, délka, tvar a větvení, sbíhání, rozbíhání**



Obr. 68 Kolénkovité zahnutí radix horních řezáků.

Anomálie velikosti zubů

Makrodoncie a Mikrodoncie - zvýšená/snížená činností jednotlivých úseků nebo celé zubní lišty (disproporce mezi velikostí zubů a čelistí)

Izolovaná - *mikrodoncie* (horní řezáky, M_3) / *makrodoncie* - horní řezáky a špičák

Úplné (*makrodontismus, microdontismus* - lidí trpasličího vzhrustu)



Anomálie tvorby tvrdých zubních tkání

Sklovina

Hypoplazie skloviny


Vzniká při dočasné poruše nebo předčasném ukončení aktivity ameloblastů

Projevy: celkové ztenčení skloviny, fissury, rýhy, jamky, korunka má většinou abnormální tvar

Izolovaný x skupinový výskyt

Příčiny:

- rachitis nebo hypoparathyroidismus
- **syphilis congenita (Hutchinsonovy zuby)** - řezáky soudkovitého tvaru s poloměsíčitě vykrojenou incizální hranou
- **poškození zárodků stálých zubů zánětlivými afekcemi dočasných zubů** (na korunkách trvalých zuba fissury a pigmentované jamky - **Turnerovy zuby**)
- tetracyklinová antibiotika (medikace u dětí do 8 let zakázána)



Amelogenesis imperfecta (primární defekt skloviny)

vždy hereditární podklad, dědičnost AD, AR, ale i vazba na X chromosom

3 formy: hypoplastická, hypomaturační a hypomineralizační

Hypoplastická: lokální defekty (fisury, dolíčkování) nebo celkově ztenčená sklovina, postihuje obě dentice, dočasnou nebo trvalou, AD dědičnost
(ameloblasty nejsou funkční po celou dobu amelogeneze)

Hypomaturační: tloušťka skloviny normální, má však skvrnitý vzhled a žlutobílou až hnědou barvu v porovnání se zdravou je měkčí a snadno se odlupuje od dentinu
Výskyt dočasná nebo trvalá, příp. obě dentice, AR dědičnost
(nestejnoměrné maturace skloviny)

Hypomineralizační: sklovina po prořezání zuba má normální tloušťku, ale je velmi měkká a drolí se, a záhy během přirozené atrice mizí (odstranit ji lze také ostrými předměty)
nemocní si stěžují na citlivost na chlad a teplo
1: 20 000 dětí školního věku

Dentin

Dentinogenesis imperfecta

porucha vývoje dentinu, který je narůžovělý až hnědavý a má snížený počet tubulů

Zuby jsou drobné a šedomodré barvy (po ztrátě skloviny nahnědlé barvy - "jantarové zuby")

sklovina je sice normální, avšak se snadno odděluje od dentinu (rychlá abraze), u dočasných zubů časté fraktury korunky

Velmi vzácná, AD dědičnost



Cement

hypercementosis (hereditární)

cementové exostózy

aberantní cement



Anomálie polohy zubů

Protruze - podélná osa vykloněna labiálně

Retruze - podélná osa skloněna orálně (do dutiny ústní)

Transpozice - výměna místa mezi 2 sousedními zuby v zubním oblouku (špičák/řezák nebo první molár/špičák)

Rotace - otočení zuba kolem podélné osy (mesiorotace, distorotace)

Heterotopie (anomální erupce) (*heteros jiný, topos – poloha místo*)

zub se založil a vyvinul na atypickém místě (isthmus faucium, tvrdé patro) nebo se prořezal mimo čelistní oblouk (vestibulárně nebo linguálně)

Retence - stav, kdy se trvalý zub neprořeže do ústní dutiny v době výměny, ale zůstane v alveolárním výběžku

Anomálie prořezávání z časového hlediska

Dentitio tarda - do konce 10. měsíce není prořezán žádný zub

Dentitio praecox - první dočasný zub prořezán před 4. měsícem věku