

XVII. Přečtěte si chorobopis a vysvětlete podtržené výrazy:

Použijte slovník.

P: 201

Novák Josef 450520/770, Brandýs n. Labem, Hakenova 3

Interní nález

TK 170/85, p 78/min, pravidelný

Orientovaný, spolupracuje, normostenický, v klidu eupnoický, kůže bez ikteru a cyanózy, přiměřeného turgoru, pac. chodící. Na levém předloktí tetováž.

Hlava: na poklep nebol., alopecia androgenica, vlevo st. p. enukleaci oka, vpravo bulbos pohyblivý, skléra anikterická, spojivky růžové, reakce na osvit pozitiv., výstupy nervů nebol., inervace intaktní, uši a nos bez sekrecí, jazyk vláknitý, s bělavým povlakem, plazi ve střední čáře, hrdlo klidné, tonzily bpn, chrup sanován.

Krk: síje volně pohyblivá, napln krčních žil nezvýšená, karotidový tepou symetrický, uzliny nehmátám, susp. větší levý lalok štítné žlázy, elast.

Hrudník: poklep plný, jasný, dýchání čisté, skřípkové, AS pravidelná, 78/min, ozvy 2, slabě slyšitelné, ohraničeny; mezi lopatkami množství komedonů.

Břicho: v úrovni, dýchá v celém rozsahu, obuzně prohmatné (pacient pro šmrtní naplně), orientacně nebol., bez rezistence, poklep dif. bub., peristaltika +, játra a slezina nehmát., »Murphy« negat., tapot. bilat. negat., poklepová citlivost nad celou oblastí páté s maximem nad lumbální páteří, výrazná sinusoskolióza.

DK: bez otoků, varixů a trofických změn, lýtka měkká, palp. nebol., periferní pulzace bilat. hmatná, macerace v V mezprstí bilat., na ventrální straně bérců bilat. oděrky, stopy po škrábání.

St. locals: na obou předloktích, na dorsech rukou a v ošcipitální oblasti růžová, plochá, lehce infiltrovaná, poměrně osíť ohraničená ložiska různé velikosti, max. do 2 cm v průměru, v centru patrně vyblednutí, otok, ojedíně mezi nimi růžové, palp. tuhé papuly; kůže na ostatních částech těla bez patolog. nálezů. Růžový dermatograftismus.

Dg.: Utricitia chronica

Vertebrogenní algiický syndrom

Duodenální vřed v dokumentaci

Stav po enukleaci levého oka po úraze – umělá náhrada

Interdigitální macerace

Opakované průjmy

25. I. 1999

Vysvětlivky:

AS – akce srdce

bilat. – bilaterální, bilaterálně (obousměrný)

bpn – bez patologického nálezů

bub. – bubínkový

dif. – difúzní

DK – dolní končetina

elast. – elastický

max. – maximální, maximálně, maximum

nebol. – nebolestivý

negat. – negativní

nehmát. – nehmátý

P – puls

pac. – pacient, pacientka

palp. – palpáčn., palpáce

pozit. – pozitivní

st. p. – stav po ...

st. locals – status localis

susp. – suspektní

tapot. – tapotement

TK – krevní tlak, tlak krve

MUDr. Blahová