




The basic principles of gerontology

Gerontology

the body of knowledge on ageing, about the problems of aging people and life in old age



Gerontology subspecialties I

experimental gerontology – causes and ways of ageing, actually at the cellular and molecular level, neuropsychology of ageing


social gerontology – relationship between aging people and society, needs of elderly, demography, sociology, economy, law, urbanistics, architecture etc

clinical gerontology - geriatrics

Gerontology subspecialties II


geriatrics - summarizes and generalizes across all disciplines main topics of senior's health and functional status, specific needs, specificities of appearance, symptoms, therapy, prevention and social context of diseases of old age

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR K 31. 12. 2010
AGE STRUCTURE OF THE CR POPULATION AS AT 31 DECEMBER 2010




Věková skladba obyvatelstva: 2050


Česká republika



Expected changes of the population age-structure 2010-2050



Life expectancy and infant mortality rate



Absolute numbers of live births and deaths 1785-2011

Specific features of diseases in elderly

Risk of false diagnosis

Oligosymptomatology

expression of less typical symptoms peritonitis without defence musculaire


⇒ pneumonia without fever

⇒ cystitis with polakisuria, but without pain

⇒ tachyarrhythmia only in hyperthyreosis

Microsymptomatology

- uroinfection without fever
- uncomplete inflammation
- symptomatology**
- myocardial infarction without typical stenocardia, but with chest tightness only
- florid ulcer disease with dyspepsia, but without typical pain
- inflammation leucocytosis absent



„Another organ cries“

current disease burden most frail organs

⇒ **cardiac failure because of pneumonia**

⇒ **confusion caused by sepsis, urosepsis**

⇒ **stenocardia more expressed in anemia**

⇒ **TIA in anemia, cardiac failure, myocardial infarction**

Polymorbidity

the number of chronic diseases increases with age

80% of patients above 80 years suffer from more than one chronic disease

diseases influence each other – more frequently negatively

polypragmasia, compliance, interaction


long term recovery

risk of immobilization



Glacier like symptom

- **apparent symptomatology is the little part of reality only**
- **dyspnea in myocardial infarction only**
- **confusion in cardiac failure**
- **confusion in acute abdomen**
- **dementia progression caused by chronic pain**



Interdisciplinary problems

geriatric giants „4 I“

instability

cognitive disturbances

immobilization

incontinence, skin integrity disorders

M U N I
M E D

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO

Specificities and peculiarities of pharmacotherapy in elderly

Problem topics
Farmacokinetics
Compliance

Problem topics

- ❑ pharmacokinetics, pharmacodynamics
- ❑ compliance
- ❑ polymorbidity
- ❑ polypragmasia
- ❑ medications market
- ❑ **the patient's wishes**
- ❑ treatment coordination
- ❑ „external“ influences



Farmakokinetics I

- decrease of gastric acidity
- decrease of gastric motility
- reduced GIT blood flow
- slower resorption

Farmacokinetics II

- decreased distribution volume for hydrosoluble substances
- increased distribution volume for liposoluble substances
- decreased liver and kidney function
- decreased albumin concentration

Compliance and its changes in elderly I

reciprocal association between compliance and
number of medications used – 5
medications take exactly 33-44%, - 10
medications 10-20% only
influence of relatives and caregivers
dependence on specialised supervision

Compliance and its changes in elderly II

medication price influence
user's comfort
medication shape and color
content of package leaflet

MUNI
MED

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO



Polypragmasia? Polypharmacotherapy?

tackle fundamental problems
improve the quality of life
prophylactic medications
number of medications limitation?
respecting of guidelines
unwanted symptoms induced by therapy
express 24-28% patients, 90% of symptoms
are predictable



Therapy coordination problems

- ❖ „gate keeping“ x confidence in the knowledge of GP
- ❖ „travelling“ around out-patient clinics
- ❖ addition of recommended treatments
- ❖ lack of communication between GPs and specialists
- ❖ financial limitations of GPs and specialists
- ❖ doubled generics



Medication at the market

many market names of the same generic substance

the elderly patient remembers the medication according to shape and colour

the influence of advertisement

the influence of friends or neighbors „me too“



MUNI
MED

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO

Seniors and medications consumption

age group 60-75 years creates 15% of population

➤ consumes 33% prescription medications

➤ consumes 40% OTC medications

Creating the medication schedule

one coordinator

specialist's recommendations

substantial medications

or to know or to consult

MUNI
MED

**FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO**

Ten rules for elderly prescription I

- » 1. Define substantial problems to treat
- » 2. Define treatment targets
- » 3. Consider alternative methods including education and non pharmacologicla methods
- » 4. Consider all risks and risk medications already taken
- » 5. Optimal dosage “start low go slow”

Ten rules for elderly prescription II

- »6. Select the simplest schedule
- »7. Consider the risk of cumulation in retarded medications
- »8. Prepare the table containing recommended medications and ask the patient about understanding
- »9. Ask the use of OTC or other substances
- »10. Consider the possibility to stop the taking of some medication

Non-pharmacological therapy

positive alternative to polypragmasia

regime measures – sleeping rhythm, to use the bed for sleeping only, regular day and week rhythm

reduction of harmful habits

change of eating habits – regular warm dishes, care for oral cavity and teeth

Comprehensive geriatric assessment

Comprehensive geriatric assessment (CGA)

- personality
- somatic health
- functional status
- psychical health
- social context

Personality

- ✓ life situations
- ✓ priorities and decisions – treat/not to treat, reanimate/not to reanimate, decisions in dementia
- ✓ subjective quality of life




Somatic health

- ✓ **diseases – main diseases, other diseases**
- ✓ **functional burden of diseases**
- ✓ **syndromological dg (imobilization, incontinentia ...)**

Functional efficiency

- ✓ stability and walking
- ✓ performance and independence
- ✓ physical condition
- ✓ nutrition



Mental health



- ✓ cognitive and fatic disorders and deliria – active screening and evaluation
- ✓ affective disorders (depression) – active screening and evaluation
- ✓ mental balance, maladaptation, the influence of psychosocial stressors

Social context

- ✓ social roles and relationships (social network)
- ✓ operation demands and safety of the home environment
- ✓ social needs supplied or claimed



Evaluation of stability and walking disorders

- ❖ basic neurological assessment
- ❖ getting up from lying to a sitting position and from sitting position to standing
- ❖ spontaneous standing
- ❖ maneuvers in standing – Romberg, pull test, push test
- ❖ spontaneous walking – 10m – base width, length of the step, fluidity of movement, start and stop, rotation, obstacles
- ❖ maneuvers in walking – on heels, on tiptoes, with closed eyes, backwards, tandem walking

Possible pathologies

- ✓ walking of width base with unstable destination
- ✓ polyneuropathic walking – uncertainty, weakness of lower extremities
- ✓ cerebellar walking – like ebrietas
- ✓ choreatic walking
- ✓ short step, stiffness
- ✓ inability to start the step



Evaluation of physical performance

- ❑ anamnestic – comparison with contemporaries, with standards - ADL, IADL
- ❑ stress tests – speed evaluation, observation of EKG, blood pressure, heart rate
- ❑ selection of tests – izometric, izotonic, treadmill



ADL

MUNI
MED

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO

Činnost	Provedení činnosti	Bodové skóre
1. najedení, napití	samostatně bez pomoci	10
	s pomocí	5
	neprovede	0
2. oblékání	samostatně bez pomoci	10
	s pomocí	5
	neprovede	0
3. koupání	samostatně nebo s pomocí	5
	neprovede	0
4. osobní hygiena	samostatně nebo s pomocí	5
	neprovede	0
5. kontinence stolice	plně kontinentní	10
	občas inkontinentní	5
	trvale inkontinentní	0
6. kontinence moči	plně kontinentní	10
	občas inkontinentní	5
	inkontinentní	0
7. použití WC	samostatně bez pomoci	10
	s pomocí	5
	neprovede	0
8. přesun lůžko - židle	samostatně bez pomoci	15
	s malou pomocí	10
	vydrží sedět	5
	neprovede	0
9. chůze po rovině	samostatně nad 50 m	15
	s pomocí 50 m	10
	na vozíku 50 m	5
	neprovede	0
10. chůze po schodech	samostatně bez pomoci	10
	s pomocí	5
	neprovede	0

Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech:
0 - 40 bodů: vysoce závislý
45 - 60 bodů: závislost středního stupně
65 - 95 bodů: lehká závislost
100 bodů: nezávislý

IADL

<i>Činnost</i>	<i>Hodnocení</i>	<i>Bodové skóre</i>
1. telefonování	vyhledá samostatně číslo, vytočí je	10
	zná několik čísel, odpovídá na zavolání	5
	nedokáže použít telefon	0
2. transport	cestuje samostatně dopravním prostředkem	10
	cestuje, je-li doprovázen	5
	vyžaduje pomoc druhé osoby, speciálně upravený vůz apod.	0
3. nakupování	dojde samostatně nakoupit	10
	nakoupí s doprovodem a radou druhé osoby	5
	neschopen bez podstatné pomoci	0
4. vaření	uvaří samostatně celé jídlo	10
	jídlo ohřeje	5
	jídlo musí být připraveno druhou osobou	0
5. domácí práce	udržuje domácnost s výjimkou těžkých prací	10
	provede pouze lehčí práce nebo neudrží přiměřenou čistotu	5
	potřebuje pomoc při většině prací nebo se práce v domácnosti neúčastní	0
6. práce kolem domu	provádí samostatně a pravidelně	10
	provede pod dohledem	5
	vyžaduje pomoc, neprovede	0
7. užívání léků	samostatně v určenou dobu správnou dávku, zná názvy léků	10
	užívá, jsou-li připraveny a připomenuty	5
	léky musí být podány druhou osobou	0
8. finance	spravuje samostatně, platí účty, zná příjmy a výdaje	10
	zvládne drobné výdaje, potřebuje pomoc se složitějšími operacemi	5
	neschopen bez pomoci zacházet s penězi	0

Hodnocení stupně závislosti v instrumentálních všedních činnostech:
0 - 40 bodů: závislý v IADL
45 - 75 bodů: částečně závislý v IADL
80 bodů: nezávislý v IADL

MUNI
MED

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO

Cognitive performance evaluation

MMSE

-Mini Mental State Examination

30-27-23-18-13

-clock test

-test connecting numbers and letters

MUNI
MED

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO

Tab. 4. Test kognitivních funkcí - Mini-Mental State Exam (MMSE)

Oblast hodnocení	Max. skóre
1. Orientace Položte nemocnému 10 otázek. Za každou správnou odpověď započítejte 1 bod. Který je teď rok? Které je roční období? Můžete mi říci dnešní datum? Který je den v týdnu? Který je teď měsíc? Ve kterém jsme státě? Ve které jsme zemi? Ve kterém jsme městě? Jak se jmenuje tato nemocnice (ordinace)? Ve kterém jsme poschodí?	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Větpívost Vyzpěťující jmenuje 3 předměty (lopata, šátek, váza) a vyzve pacienta, aby je opakoval. Za každou správnou odpověď bez ohledu na pořadí se započítá jeden bod. Jestliže pacient nereprodukuje všechny 3, opakujte je tak dlouho, dokud se je nenaučí.	3
3. Pozornost a počítání Vyzvěte nemocného, aby od čísla 100 odečítal stále číslo 7 (93-86-79-72-65). Skončete po 5 odečtech. Každou správnou odpověď hodnotte 1 bodem. Alternativou počítání může být hláskování slova "pokrm" pozpátku po jednotlivých hláskách.	5
4. Výbavnost Vyzvěte nemocného, aby opakoval 3 slova, která si měl zapamatovat. 1 bod za každou správnou odpověď.	3
5. Řeč, komunikace a konstrukční schopnosti Ukažte nemocnému dva předměty (tužka, hodinky) a vyzvěte ho, aby je pojmenoval. Za správnou odpověď po jednom bodu. Vyzvěte nemocného, aby po Vás opakoval "Žádná ale, jestliže a kdyby". Správné opakování hodnotte jedním bodem. Dejte nemocnému třístupňový příkaz (vezměte papír do pravé ruky), (přeložte ho napůl) a (položte na podlahu). Za každý správně provedený stupeň započítejte 1 bod. Dejte nemocnému přečíst kartu s nápisem "Zavřete oči". Započítejte 1 bod za zavření očí. Vyzvěte nemocného, aby napsal smysluplnou větu. 1 bod za větu obsahující podmět a přísudek, která dává smysl.	2 1 3 1 1


Vyzvěte nemocného, aby na zvláštní papír nakreslil obrazec podle předlohy. 1 bod, pouze jsou-li zachovány všechny úhly a protnutí vytváří čtyřúhelník.






Celkové skóre

Hodnocení: skóre 23 bodů a nižší svědčí pro kognitivní poruchu (delirium nel demenci). Test má senzitivitu 87 % a specifitu 82 %.

Connecting numbers and letters



Clock test



Depression evaluation – geriatric depression scale GDS

Otázka	Odpověď
Jste v zásadě spokojen(a) se svým životem?	Ano – Ne
Opustil(a) jste mnoho ze svých aktivit a zájmů?	Ano – Ne
Máte pocit, že Váš život je prázdný?	Ano – Ne
Pocitujete často nudu, prázdnotu?	Ano – Ne
Máte většinou dobrou náladu?	Ano – Ne
Obáváte se, že se vám přihodí něco zlého?	Ano – Ne
Jste většinou šťastný (šťastná)?	Ano – Ne
Cítíte se často bezmocný (bezmocná)?	Ano – Ne
Zůstáváte raději doma, než byste šel (šla) ven a podnikal(a) nové věci?	Ano – Ne
Máte pocit, že máte více problémů s pamětí než ostatní?	Ano – Ne
Myslíte, že je pěkné žít v této době?	Ano – Ne
Tak, jak jste na tom právě nyní, připadáte si bezcenný (bezcenná)?	Ano – Ne
Cítíte se plný (plná) energie?	Ano – Ne
Pocitujete svou situaci jako beznadějnou?	Ano – Ne
Myslíte si, že většina lidí je na tom lépe než vy?	Ano – Ne

Každá tučně označená odpověď = 1 bod. Hodnocení: 0–5 bodů norma, 6 a více bodů suspektní deprese (česká standardizace podle Tošnerové). Původní hodnocení z r. 1999: 0–7 norma, 8–12 mírná deprese, 13–15 těžká deprese.

<p>Poslední 3 měsíce ztráta chuti k jídlu, obtíže GIT, problémy se žvýkáním a polykáním</p> <p>0 = těžké poruchy 1 = mírné 2 = bez potíží</p>
<p>Ztráta tělesné hmotnosti v posledním měsíci</p> <p>0 = více než 3 kg 1 = neví 2 = v rozmezí 1-3kg 3 = stabilní hmotnost</p>
<p>Pohyblivost</p> <p>0 = upoután na lůžko 1 = pohyb v okolí lůžka, po místnosti 3 = vychází ven</p>
<p>Psychický stres v posledních 3 měsících</p> <p>0 = ano 2 = ne</p>
<p>Neuropsychické problémy</p> <p>0 = těžká demence, deprese 1 = mírná demence 2 = žádné problémy</p>
<p>Index tělesné hmotnosti BMI</p> <p>0 = < 19 1 = 19 – 21 2 = 21 – 23 3 = > 23</p>
<p>maximum – 14 bodů</p>
<p>norma - 12 bodů</p>
<p>riziko malnutrice - < 11 bodů</p>

MNA II

Žije v domácnosti 0 = ne 1 = ano
Užívá více než 3 léky denně 0 = ne 1 = ano
Dekubity 0 = ano 1 = ne
Počet hlavních jídel denně 0 = 1 jídlo 1 = 2 jídla 2 = 3 jídla
Příjem proteinů 1x a vícekrát denně mléčné výrobky ano ne 2x a vícekrát denně vejce a luštěniny ano ne maso, ryby denně ano ne 0 = 0-1x ano 0,5 = 2x ano 1 = 3x ano
Ovoce a zelenina denně 0 = ne 1 = ano
Příjem tekutin 0 = méně než 3 šálky 0,5 = 3-5 šálků 1 = 5 a více šálků

MNA III

Způsob příjmu potravy 0 = s dopomocí 1 = samostatně s obtížemi 2 = samostatně bez problémů
Vlastní hodnocení stavu výživy 0 = podvyživený 1 = nehodnotí 2 = nemá nutriční problémy
Hodnocení vlastního zdravotního stavu ve srovnání s vrstevníky 0 = nedobry 0,5 = neví 1 = stejně dobrý 2 = lepší
Střední obvod paže 0 = <21cm 0,5 = 21-22cm 1 = > 22cm
Obvod lýtky 0 = < 31 cm 1 = 31 cm a více
Zhodnocení – max. 14 bodů
Celkové hodnocení z obou částí tabulky – 30 bodů 17-23,5 bodů – maximum < 17 bodů – riziko malnutrice < 17 bodů – malnutrice

Thank you for your attention