

Andrologie

Soňa Kloudová

sona.kloudova@med.muni.cz


21.2.2023

Vývoj spermí


- Spermie jsou produkovány od puberty do konce života, nicméně počet a kvalita spermíí s věkem mírně klesají
- Při selekci nejlepších gamet dochází k velkému plýtvání
- U mužů k selekci dochází po ejakulaci
- Každý muž denně produkuje milióny spermíí (1000/s), do místa fertilizace se jich však dostává pouze zlomek
- Selekcce u spermíí – na úrovni kontrolních bodů buněčného cyklu a apoptózy probíhá selekcce geneticky či jinak abnormálních spermíí
 - selekcce podle funkční kvality spermíí v pohlavním traktu ženy

Spermatogeneze


- Komplexní proces tvorby haploidních zárodečných buněk z diploidních spermatogoniálních kmenových buněk
- Gonadotropin dependentní mechanismus
- Hlavní funkcí procesu spermatogeneze je zajistit denní přísun plně diferencovaných spermií (více než 200 miliónu u člověka, 2-3 biliony u býka)
- Varle je tvořeno intersticiem a semenotvornými kanálky (95% objemu varlete)
- Vlastní proces spermatogeneze probíhá v semenotvorných kanálcích
- Komplexní biologický proces, produkce haploidních zárodečných buněk z diploidních spermatogonií, u člověka trvá **přibližně 74 dnů**



A



B



C


[Understanding spermatogenesis is a prerequisite for treatment - PMC \(nih.gov\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

- **Gonocyty**-primordiální zárodečné buňky- v průběhu embryonálního vývoje osídlují základy pohlavní žlázy → diferenciace ve **spermatogonii A** (kmenová buňka spermatogonií)
- Zárodečné buňky zůstávají v klidovém stavu až do narození, kdy proliferují a vcestují do semenotvorných kanálků
- U novorozenců (savců) se nacházejí Sertoliho buňky, spermatogonie a preleptotenní spermatocyty, pokročilejší stádia vývojové řady spermií nacházíme až v období puberty a dospělosti


Spermatogeneze má **tři fáze**:

- Zárodečné buňky (spermatogonie, $2n$) se nejdříve opakovaně **mitoticky dělí**; vznikají jednak tmavé spermatogonie a světlé spermatogonie, které dávají vznik spermatocytům I řádu (preleptotenní stádium); u člověka je třeba asi 4 generací spermatogonií, aby vznikl preleptotenní spermatocyt
- Následuje **meióza** (duplikace chromozomů, genetická rekombinace, redukce chromozomů; z 4 spermatocytů prvního řádu vznikají 2 spermatocyty II řádu ($2n$, meióza I) a později druhým mitotickým dělením vznikají haploidní spermatidy
- V konečné fázi dochází **ke spermiogenesi**- transformace sférické haploidní spermatidy do vysoce specializované zralé spermie a následná spermiace (uvolnění do lumen kanálku)
- Vysoká produkce spermií si vyžaduje jedinečnou dobře organizovanou strukturu semenotvorných kanálků- sebeobnovující systém, dobře izolovaný od krve za současného příjmu jen vybraných parakrinních faktorů
- **Semenotvorný epitel**: zárodečné buňky tvořící několik vrstev různých stádií diferenciací ve spermii od obvodu směrem k lumen kanálku, Sertoliho buňky

- Spermatogonie jsou stále ve styku s bazální membránou
- Dělením tmavých **spermatogonií A** vznikají další tmavé spermatogonie A a světlé spermatogonie A
- Dalším mitotickým dělením světlých spermatogonií A vznikají **spermatogonie B**, které dalším dělením dávají vznik **spermatocytům prvního řádu**
- Spermatocyty I řádu již nejsou v kontaktu s bazální membránou
- Spermatocyty I řádu vstupují do meiózy a během profáze se stávají největšími buňkami semenotvorného epitelu (profáze trvá 24 dnů); následně vzniknou dva malé **spermatocyty II** řádu, které existují jen velmi krátce a vstupují do druhého meiotického dělení → **spermatidy**
- Spermatidy jsou nejmenší buňky semenotvorného epitelu, složitým procesem diferencují ve spermie




Expression of new genes in human spermatogenesis (Du et al.,2021)



- Preleptotenní spermatocyty podstupují asi 16ti denní první meiotické dělení (profáze trvá asi 14 dnů), zbytek I. meiotického dělení a celé II. meiotické dělení proběhne za méně než 3 dny
- Proces spermiogenese trvá asi 26 dnů
- Délka celé spermatogeneze trvá 74 dnů
- dalších 12 dnů spermie cestují nadvarletem
- Cyklus od spermatogonie po zralou spermii tedy trvá celkem 86 dnů


Sertoliho buňky


- nepravidelný sloupcovitý tvar (pyramidovitý), dosahují od bazální laminy do lumen kanálků
- 17-20% semenotvorného epitelu
- Jádro je snadno rozpoznatelné díky výraznému jadérku
- Podpora a výživa vyvíjejících se zárodečných buněk, kompartmentalizace-těsné spoje, hematotestikulární bariéra
- Hrají významnou roli v udržování sebeobnovy kmenových spermatogonií, podílejí se i na regulaci správného poměru sebeobnovy zárodečných buněk a apoptózy
- Kontrolované uvolňování maturovaných spermatid
- Sekreční funkce – proteiny a růstové faktory
- fagocytóza



Leydigovy buňky

- Polygonálního tvaru, jádro s jedním až třemi výraznými jadérky
- Reinkeho krystaly –cytoplasmatické inkluze, žlutohnědý lipofuscin
- Hlavním typem buněk intersticia varlete
- Diferenciace postnatálně, klidový stav až do puberty
- Často v blízkosti cév nebo semenotvorných kanálků
- Hlavní zdroj testosteronu







Spermiogenese

- V průběhu procesu spermiogenese zůstávají zárodečné buňky propojeny buněčnými spoji se Sertoliho buňkami a vzájemně pak cytoplazmatickými můstky
- Dochází ke komplexní přeměně haploidní buňky, podobající se běžné somatické buňce ve vysoce specializovanou buňku, schopnou pohybu a fertilizace oocytu
- Spermatidy získávají typický tvar spermií i funkce
- Dochází ke stavbě nových organel a k degradaci některých původních
- Jádro je remodelováno: dochází ke zmenšení objemu, nabytí aerodynamického tvaru a k protaminaci (ochrana DNA před poškozením), tento proces je spojen s vysokou transkripční a translační aktivitou
- Golgiho komplex splývá v akrosomální váček, dochází ke splynutí cytosolu spermatidy a ke vzniku skeletu hlavičky, tvoří se axonema bičíku, chromosomy se vysoce kondenzují
- Akrosomální váček se přetahuje přes přední okraj jádra a vzniká finální akrosom(hyaluronidáza, akrozín), pomocí mitochondriální manžety dochází k protažení jádra


- Centrosom spermatidy: proximální centriol se usadí v prohloubení jádra, z distálního centriolu se vytváří bazální tělísko bičíku
- bičík obsahuje devět vnějších dvojic mikrotubulů a dva centrální mikrolubuly
- Mitochondrie se přesunuly do proximální části bičíku a tvoří zde mitochondriální spirálu-střední oddíl spermie
- Zbylá cytoplazma je fagocytována Sertoliho buňkami

- **Spermiace** – proces, kdy dochází k vzájemnému oddělení plně diferencovaných spermatozoí a k jejich uvolnění z povrchu semenotvorného epitelu do lumen kanálku
- **Cytoplazmatická kapénka** – lalůček se zbytkem cytoplasmy opouštějící zbytek buňky, obtočený kolem mísa spoje bičíku s hlavičkou






(a)




(b)

- Struktura chromatinu spermií se liší od somatických buněk.
- Dochází ke kondenzaci → ztráta transkripční aktivity
- náhrada většiny histonů **protaminy** (malé, vysoce bazické proteiny bohaté na arginin, u mužů se nachází 2 typy protaminů, jejich poměr se individuálně liší)
- K hlavnímu balení chromatinu dochází v časných fázích spermiogeneze – původní struktura DNA vázaná na nukleozómy je destabilizována a dojde k vytvoření nové, asi 10x kompaktnější struktury chromatinu
- Část chromatinu si zachovává nukleozomové uspořádání (účast na časném vývoji embrya)
- Epigenetické mechanismy ovlivňující vývojespermií : mi RNA, metylace DNA, demethylace DNA (např otcovského imprintingu)




Hormonální regulace spermatogeneze

- **GnRH** vylučovaný pulsatilně hypothalamem stimuluje adenohypofýzu k sekreci klíčových hormonů regulujících vývoj spermií: luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH)
- FSH a LH působí na úrovni varlete
- LH stimuluje Leydigovy buňky k produkci testosteronu a nepřímo stimuluje spermatogenezi zvýšením intratestikulární koncentrace testosteronu; dále produkují faktory které přímo či nepřímo ovlivňují spermatogenezi: INSL3 (insulin-like protein 3-sestup varlat), oxitocin (stimuluje produkci testosteronu)
- Testosteron se ve varleti váže na androgen binding protein produkovaný Sertoliho buňkami, krví je roznášen po těle a působí v mnoha tkáních-vývoj mužských pohlavních orgánů, je jedním z iniciátorů puberty
- FSH stimuluje Sertoliho buňky → podpora spermií





- klíčovou roli během spermatogeneze hrají i **prolaktin a růstový hormon**
- **Sertoliho buňky** dále produkují **AMH, inhibin a aktivin**; cAMP responsive element binding protein (CREB)-aktivace transkripce downregulátorů procesu spermatogeneze
- Activin zvyšuje hladiny FSH potřebné pro produkci spermatu, inhibin reguluje sekreci FSH hypotalamem a pomáhá udržovat testikulární homeostázu
- Syndrom **Sertoli cell only** je charakterizován výlučnou přítomností Sertoliho buněk (bez zárodečných buněk) v semenotvorných tubulech, což znemožňuje spermatogenezi (sterilita bez pohlavních abnormalit)- neobstruktivní azoospermie
- Leydigovy a Sertoliho buňky produkují steroidní hormony
- Leydigovy buňky vylučují několik různých typů androgenů, včetně dihydrotestosteronu a testosteronu - modulace vývoje a zrání spermií



Struktura semenotvorného epitelu

- Unikátní struktura semenotvorných kanálků zajišťuje vyvíjejícím se spermii dostatek živin a současně zajišťuje ochranu před imunitním systémem – **hematotestikulární bariéra** – tvořena zejména buněčnými spoji Sertoliho buněk, sekundární roli hrají peritubulární myeloidní buňky a endoteliální buňky
- Na bazální laminu naléhají spermatogonie A, zatímco spermatogonie B jsou v kontaktu již jen částečně, malými plochami; v této vrchní části se také nacházejí Sertoliho buňky, tvořící svými buněčnými spoji a cytoplazmatickými projekcemi hematotestikulární bariéru
- Primární spermatocyty pronikají směrem do lumen kanálku skrze hematotestikulární bariéru a vstupují do části semenotvorného kanálku, kde probíhá meióza, tento kompartment je dokonale kryt před imunitním systémem, protože povrch spermií je vysoce imunogenní







Germinal Epithelium


Leydig Cells

Crystal of Reinke





- (A) Arest spermatogeneze ve stadiu spermatogonií
- (B) Arest spermatogeneze ve stadiu spermatogonií A(světlych)
- (C) Nádorové buňky v bazálním kompartmentu zárodečného epitelu vytlačily spermatogonie
- (D) Megalospermatocytes s nedokončenou mitózou
- (E) Arest spermatogeneze ve stadiu spermatocytů I řádu
- (F) Arest spermatogeneze ve stadiu spermatid



[Understanding spermatogenesis is a prerequisite for treatment - PMC \(nih.gov\)](#)

Faktory ovlivňující spermiogenesi

- **Obezita** –hyperestrogenismus (enzym aromatáza v tukové tkáni-konverze testosteronu); hypoandrogenismus
- **Diabetes** – type 1DM –hyperglykemie, zvýšený oxidační stres- fragmentace DNA spermií
- **Enviromentální chemikálie**-endokrinní disrupce - **ftaláty**-snižují produkci testosteronu, zhoršují fce Sertoliho i zárodečných buněk (bifosfenol A)
Kadmium, dioxin –narušení hematotestikulární bariéry
Etylen dibromid- změny ve struktuře chromatinu spermií
DBCP (1,2 -dibromo -3- chloropropan)-zvyšuje oxidační stres
- **Varikokéla** – rozšíření žil žilní pleteně, která odvádí odkysličenou krev z varlat do břicha- reflux; 15% mužů, 35% neplodných mužů
-skrotální hypertermie, zvýšená produkce semenogelinů(inhibice motility, hyperaktivace a kapacity)

- **Genetické faktory**- 15-30% mužské neplodnosti

Klineferterův syndrom- 47XXY (46XY,/47XXY; 48,XXX; 48,XXYY); 5% těžkých oligozoospermii, 10% NOA; hypergonadotropní hypogonadismus, kognitivní poruchy

Mikrodelece Y chromozomu- dlouhé raménko, AZF faktor- geny kritické pro spermiogenezi: regiony AZFa (geny regulátorů spermatogeneze → azoospermie a SCO), AZF b (azoospermie, časný maturální arest), AZFc (azoospermie a těžké oligozoospermie, po TESE lze najít spermie)

- **Epigenetické faktory**- metylace DNA, metylace histonů, acetylace histonů, fosforylace histonů; klíčová událost ve spermiogenezi je epigenetické reprogramování zárodečných buněk-zvýšená metylace DNA je asociována s nižší kvalitou spermií

- [Hormonal regulation of spermatogenesis in Hindi – YouTube](#)
- [Hormonal control of spermatogenesis process for AIIMS JIPMER. - YouTube](#)