

# PÉČE O PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKOU DRENÁŽ

## PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKÁ DRENÁŽ (PTD)

Slouží, jako **přístupová cesta** k dalším výkonům (výměna drénu, zavedení stentu, odběr vzorků ze žlučových cest) a **zejména k proplachům** drénu. PTD je zaveden do žlučových cest.

### POZNÁMKA:

**PTD nikdy nezalamujte, nepoužívejte peán – došlo by k poškození PTD!**

## PÉČE O PTD V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

- Pro udržení co nejdelší doby průchodnosti je nutné PTD pravidelně proplachovat:
  - 2–3krát denně fyziologickým roztokem,
  - stříkačkou o **objemu 20 ml**,
  - množství aplikovaného roztoku do PTD (**dle zvyklosti daného pracoviště**).

### Výměna krytí:

- Odstraňte krytí kolem PTD a **zhodnoťte okolí kůže**.
- Poté dezinfikujte okolí PTD (vždy použijte **nový tampón**, dezinfekci provádějte **jedním směrem**).
- Okolo PTD-drénu můžete nalepit krytí z umělé kůže – **hydrokoloidní krytí** (pokud jste byl/a při propuštění do domácího léčení tímto krytím vybaven/a), záleží na zvyklosti daného pracoviště.
- Podložte PTD nastříženým **sterilním krytím**, dále jej překryjte druhým sterilním krytím a **zafixujte náplastí** ke kůži.
- Upravte PTD tak, aby se **nezalomil** a volný konec PTD zafixujte náplastí ke kůži.
- Doporučuje se **místa fixace měnit**.

