


MONOGENNÍ ONEMOCNĚNÍ VE VZTAHU K VÝŽIVĚ

Mgr. Lucie Štrublová
ÚPF LF MUNI

Osnova


Monogenní dědičnost ve vztahu k výživě

- Autosomálně dominantní – **AD**
příklady onemocnění
- Autosomálně recesivní – **AR**
příklady onemocnění



Monogenní dědičnost

- dědičnost vázaná na jeden gen
- Mendelovy zákony
- vnější prostředí nemá vliv
- vzácná onemocnění – incidence menší než 5/10 000 (tj. méně než 1 postižený na 2 000 jedinců)
- více než 8 000 různých vzácných onemocnění



Typy monogenní dědičnosti

- autosomálně dominantní – AD
- autosomálně recesivní – AR
- X-dominantní – XD
- X-recesivní – XR
- mitochondriální




Autosomálně dominantní dědičnost

- dominantní alela uložená na autosomech
 - autosom = nepohlavní chromosom
- sleduje se přenos znaku podmíněného dominantní alelou
- fenotypový projev:
 - heterozygot – Aa
 - dominantní homozygot – AA
- neúplná dominance:
 - heterozygot – Aa – méně závažný fenotypový projev
 - dominantní homozygot – AA – plné fenotypové vyjádření → těžké formy onemocnění
- fenotypově zdraví jedinci
 - recesivní homozygot – aa – nepřenáší mutaci na další generace

Autosomálně dominantní dědičnost

Autosomálně dominantní dědičnost


- obě pohlaví jsou postižena stejně často
- vertikální typ dědičnosti
 - alespoň jeden rodič je postižen
 - nemoc je přítomna v každé generaci
- riziko postižení pro potomky a sourozence postiženého je **50 %**



Příklady AD onemocnění ve vztahu k výživě


- **Familiární hypercholesterolémie**
- **Monogenní formy diabetu**

Familiární hypercholesterolémie I.




Familiární hypercholesterolémie II.

- výskyt v populaci
 - 1:500 heterozygotní forma
 - 1:1 000 000 homozygotní forma
- mutace:
 - **LDLR genu**, který kóduje LDL receptor
 - apolipoproteinu B (ApoB), který je součástí LDL a váže se na tento receptor
- gen pro LDL receptor – krátké ramínko 19. chromozomu




Familiární hypercholesterolémie III.

- porucha vychytávání LDL částic prostřednictvím LDL receptoru → akumulace LDL
- nemetabolizuje se přijatý CH ze stravy
- nedochází k utlumení 3HMGCoA-reduktázy → zvýšená syntéza CH
- **deficit** LDL receptorů (homozygot – **AA**)
 - dvě mutované alely- onemocnění již v dětství či během puberty (IM před 20. rokem života)
- **snížení** LDL receptorů (heterozygot – **Aa**)
 - jedna mutovaná alela – onemocnění ve věku 30–40 let




Familiární hypercholesterolémie IV.


- **klinicky:** ukládání CH na různých místech v těle:
oční víčka, vnější obvod duhovky
- **biochemický nález:** hypercholesterolémie
homozygoti: 16–23 mmol/l (LDL >10 mmol/l)
heterozygoti: 7–15 mmol/l (LDL >5 mmol/l)
- vysoké riziko vzniku KVO v nízkém věku
- **prognóza:** riziko KVO až 25x vyšší než u zdravé populace
- u homozygotů je riziko KVO až 100x vyšší



Familiární hypercholesterolémie V.


- horší odpověď na léčebná opatření
- **heterozygotní forma**
 - strava s nízkým obsahem CH a nasycených tuků
 - statiny, sekvestranty ŽK, jiná farmaka
- **homozygotní forma**
 - vysoké dávky statinů
 - inhibice proteinu PCSK9
 - LDL aferéza (odstranění LDL z plazmy na principu dialýzy)





Monogenní formy diabetu

- více než 20 genů je spojeno s monogenními formami DM
- zastoupení v populaci 1–3 %
- MODY (maturity-onset of diabetes of the young)
- NDM (neonatal diabetes, diabetes novorozeneckého věku)



MODY

(maturity-onset of diabetes of the young)

- DM adultního typu, vyskytující se v mladém věku
- předpoklad AD dědičnosti se třemi variantami mutací
 - Gen pro MODY 1 – dlouhé raménko 20. chromosomu
 - Gen pro MODY 3 – dlouhé raménko 12. chromosomu
 - Gen pro MODY 2 – mutace genu pro **glukokinázu**
– krátké raménko 7. chromosomu
- hepatální nukleární faktory (HNF)
- inzulinový promotorový faktor (IPF)
- → transkripční faktory důležité pro normální vývoj pankreatických ostrůvků

Typy monogenního diabetu vycházejícího z porušené funkce beta buněk

	HNF – diabetes Diabetes transkripčních faktorů			Glukokinázový diabetes	novorozenecký DM / MODY	Novorozenecký DM	
Gen	HNF1A	HNF4A	HNF1B	GCK	INS	KCNJ11	ABCC8
Typický věk při diagnóze	< 25 let (40 let u příbuzných)			Hyperglykémie od narození, náhodný nález	< 6 měsíců / < 25 let	< 6 měsíců	
Optimální léčba	PAD (deriváty SU)		inzulín	Bez léčby	inzulín	PAD (deriváty SU) ve vyšší dávce	
Rodinná anamnéza DM	2-3 generace RA diabetu			Mírná hyperglykémie, T2DM, GD	NDM – spontánní, MODY: 2-3 generace DM	Většinou spontánní mutace – rodiče zdraví	
Klinické projevy	Snížený renální práh, pozitivní glukosurie	Zvýšená porodní hmotnost, novorozenecké hypoglykémie	Renální cysty, malformace genitálu, dna	HbA1c do 6% Minimální riziko diabetických komplikací	20% má neurologické postižení	20% má neurologické postižení, opoždění PMV, epilepsie	

MODY 2. typu = mutace genu pro glukokinázu

- krátké raménko 7. chromosomu – přes 195 mutací
- **glukokináza** – enzym katalyzující fosforylaci glukózy na glukóza-6-fosfát (G-6-P) → stimulováno inzulinem
 - nižší aktivita omezí vnímavost b-buněk vůči hyperglykémii, a tím snižuje inzulinovou sekreci
- **Klinicky:**
 - defekt inzulinové sekrece s mírnou hyperglykémií na lačno
 - glykémie v rozmezí 5,5–9,0 mmol/l (nad 10mmol/l zřídka) – většinou asymptomatictí (náhodné zjištění)
 - HbA1c na horní hranici normy
 - při oGTT je vzestup glykémie mezi 0.–120. minutou nízký
 - specifické protilátky proti B-buňkám nejsou přítomny

MODY 2. typu = mutace genu pro glukokinázu

- **vyšetření:** RA, glykémie rodičů, dynamické zátěžové testy, stanovení autoprotiátek, HbA1c, genetické vyšetření
- cílové hodnoty glykémie → 8 mmol/l
- u mladých pacientů není léčba nutná
- ve vyšším věku může progredovat do fáze diabetu 2. typu
→ zahájení léčby dietou, PAD nebo inzulinem
- dodržovat zásady správného stravování a pohybové aktivity
- udržet optimální tělesnou hmotnost


MODY 1. a 3. typu = defekt transkripčních faktorů

- **HNF-1 α diabetes (MODY3)** – heterozygotní mutace v genu pro hepatocytární nukleární faktor 1 α
- **HNF-4 α diabetes (MODY1)** – vzniká na podkladě heterozygotního nosičství mutace genu pro HNF-4 α
- u HNF-4 α diabetu: tendence k novorozenecké makrosomii (přítomno u 56 % nositelů mutace)



Klinická charakteristika MODY 1 a 3 I.

- časný vznik
- není plně závislý na inzulínu → zachovaná částečná funkce pankreatu (detekovatelný C-peptid)
- chybí známky autoimunity
- glykémii nalačno – normální
- glykémie ve 120. minutě – diabetická
- pozitivní glykosurie při relativně normální glykémii způsobená sníženým renálním prahem pro glukózu
- platí zvláště pro screening nediabetických příbuzných pacientů s HNF-1 α diabetem (MODY 3)




Klinická charakteristika MODY 1 a 3 II.


- **Terapie:** dieta, deriváty sulfonylurey
- důležitost compliance pacienta s lékařem
 - dlouhodobě léčen perorálními antidiabetiky s malým rizikem rozvoje chronických diabetických komplikací
- nedodržování léčebných opatření – akcelerace komplikací

Komplikace MODY 1. a 3. typu

- ↑ riziko **mikrovaskulárních** komplikací
 - ✓ diabetická nefropatie
 - ✓ diabetická retinopatie
 - ✓ diabetická neuropatie
- ↑ riziko **makrovaskulárních** komplikací
 - ✓ ateroskleróza
 - ✓ ICHS, ICHDK, ICHCNS
- komplexní péče, nutriční péče, sledovat TK, hladiny lipidů



DIABETES NEONATAL



NDM – novorozenecký diabetes

- před 6. měsícem života (občas 6.–12. měsícem)
- prevalence 1: 400 000 - 500 000 živě narozených dětí



druhy:

- **tranzientní (TNDM):** vymizí do 12 týdnů života, léčba inzulinem
- **permanentní (PNDM):** celoživotní léčba reagující lépe na deriváty sulfonylurey, než na inzulin

Tranzientní NDM

- 1/3 pacientů – paternální přenos
- etiologie ne zcela jasná
- anomálie na 6. chromosomu
 - paternální duplikace
 - paternální isodisomie
 - defekt methylace
- **příznaky:** hyperglykémie, intrauterinní růstová retardace, neprospívání, dehydratace, negativní protilátky
- **terapie:** inzulin (výrazné zlepšení); pozdější relaps není vyloučen


Permanentní NDM

- mutace genů kódujících struktury kaliového kanálu
- trvalé otevření kaliového kanálu a tedy nemožnost uvolnění inzulínu z granulí → těžká inzulinopenie
- často chybná diagnostika jako DM1
- DEND syndrom: epileptické záchvaty, opožděný vývoj, psychomotorická retardace, hypotonie atd.
- porucha vývoje pankreatu
- neschopnost vstřebávat v tucích rozpustné vitamíny, patologická stolice
- **terapie:** deriváty sulfonylurey

Autosomálně recesivní dědičnost



Autosomálně recesivní dědičnost

- recesivní alela uložená na autosomech
autosom = nepohlavní chromosom
- sleduje se přenos znaku podmíněného recesivní alelou
- fenotypový projev:
recesivní homozygot – **aa**
- obě pohlaví jsou postižena stejně často



Autosomálně recesivní dědičnost

- **horizontální** typ dědičnosti
- rodiče jsou obvykle zdraví (heterozygoti – přenašeči)
- nemoc se projeví u potomků (= typicky „ob generaci“)
- riziko pro sourozence 25 %
- pravděpodobnost je vyšší u příbuzenských sňatků



Příklady AR onemocnění

- **Cystická fibróza**
- **Fenylketonurie**
- **Galaktosémie**
- **Wilsonova choroba**
- Srpkovitá anémie
- Thalasémie

další onemocnění z dědičných poruch metabolismu

- mutován gen, jehož produkt (enzym) je důležitý pro chod určité metabolické dráhy, která je tímto defektem narušena

Cystická fibróza I.


- autosomálně recesivní onemocnění
- gen pro CFTR se nachází na dlouhém raménku 7. chromosomu (objeven roku 1989)
- onemocnění charakterizované mutací chloridového kanálu
- tvorba abnormálně vazkého sekretu v plicích a pankreatu

- prevalence v ČR 1: 2 500 (ročně 35–45 dětí)
- množství nosičů mutované alely až 3–4 % z celé populace


Tab. 1 – Dělení mutací CFTR genu

Třída	Typ poruchy
I.	tvorba defektního CFTR
II.	porušená maturace CFTR
III.	porucha regulace CFTR
IV.	defektní průchod iontů CFTR
V.	snížená tvorba normálního CFTR
VI.	ztráta regulace dalších iontových kanálů
VII.	snížená stabilita plně funkčního CFTR

Figure 1: Estimated Cystic Fibrosis Prevalence Rates by Race and Ethnicity





Bílkoviny CFTR v normální buňce



Cystická fibróza II.


- porucha transportu iontů (chloridový kanál regulovaný cAMP) v apikální membráně epiteliálních buněk
- v potu velké koncentrace **Cl⁻** a **Na**
- ↑ koncentrace Cl⁻ vede k excesivní reabsorbci Na
- **Na** pasivně následován vodou → dehydratace hlenu a zvýšení viskozity



Cystická fibróza III.

- periciliární tekutina u CF izotonická → narušení obranyschopnosti → infekce → další tvorba hlenu
- dysregulace cytokinové sítě – ↑ IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa
- snížení protizánětlivá složka – antiproteázy a glutathion
- existence primárního zánětu – už ve 4. týdnu života
- sekundární zánět (mikrobiální) nastupuje později
- Léčba: neustále v zájmu vědy: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36631257/> , <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28449677/>

CYSTICKÁ FIBRÓZA



CF ako multiorgánové ochorenie

Cystická fibróza IV.

- respirační systém
- GIT
- reprodukční systém


- neprospívání, chuť k jídlu
- nedostatečné štěpení potravy
- objemné stolice, steatorea
- porucha růstu, opakované sinusitidy, paličkovité prsty
- bronchiolitida, kašel, chronické infekce
- osteoporóza
- riziko vzniku DM1 (10 %)

- deficiency A, D, E, K, minerálních látek i stopových prvků

Cystická fibróza V.

- substituce pankreatických enzymů
- E: 130–200 % normy
- suplementace A, D, E, K, Ca, P, Fe, Zn, Se, Mg


- pravidelná strava
- výživná dieta, bez omezení
- plnotučné potraviny
- nutriční obohacení modulovanými dietetiky (Fantomalt, Maltodextrin, Protifar, MCT oleje)
- sipping, EV, PV



Fenylketonurie (PKU) I.

- AR onemocnění
- výskyt 1:10 000 (ročně cca 10 případů)
- gen se nalézá na 12. chromosomu
- mutace v obou alelách genu pro **fenylalaninhydroxylázu**
→ podíl na přeměně fenylalaninu na tyrozin
- mutace způsobí nepřítomnost enzymu nebo jeho menší účinek
- hromadění fenylalaninu až do toxických hladin

- mírná formě PKU – hyperfenylalaninémie



Fenylketonurie II.

- PKU se projeví po narození se začátkem kojení
- vysoká hladina Phe způsobí poškození mozku
- během kojeneckého a batolecího věku rozvoj mentální retardace (pokud není zahájena léčba)
- **diagnostika:** v rámci novorozeneckého screeningu

Fenylketonurie III.

- **léčba:** celoživotní dieta s omezeným množstvím fenylalaninu
- rozmezí Phe v krvi 120–300; 250–600 $\mu\text{mol/l}$ v závislosti na věku
- speciální výživa a přípravky – bílkovinné směsi bez Phe
- příjem PHE z jednotlivých potravin – propočítávat
- 1 g bílkovin = 27–56 mg Phe (dle druhu potravin)
- pozor na potraviny slazené aspartamem
- kritické období – maternální PKU

Maternální PKU I.

syndrom maternální PKU = fenylalaninová embryopatie

- před početím: genetická poradna s partnerem
- zátěžový test s L-Phe u partnera k vyloučení nosičství PKU
- DNA analýza PAH genu (pokrývá 95 % mutací)

- 3–6 měsíců před početím nutná přísná nízkobílkovinná dieta

- cílová hodnota Phe v krvi 1-4 mg/dl,
tj. max. 250 $\mu\text{mol/l}$

- ve stravě minimálně 75 g B/den
- ne méně než 2 500 kcal/den
- ve 12., 20. a 32. týdnu gravidity genetický ultrazvuk plodu



PHENYLKETONURIA (PKU) - Inherited Error In Metabolism

[Toxic levels of Phenylalanine (common protein amino acid) due to inability of body to convert]

Can Cause...

- Mental Retardation
 - Convulsions
- Behavior Problems
 - Skin Rash
- Musty Body Odor

Babies Are Tested...



A minimum of 24 hrs after beginning milk.

Retest in 7-10 days to catch earlier false negatives.

NO

- Meat 
- Dairy Products 
- Dry Beans 
- Nuts 
- Eggs 

* Cereals, Fruits & Vegetables in Moderation *

Maternální PKU II.

Důsledky nedodržení diety:

matka

- porucha exekutivních funkcí (plánování)
- vizuálně-prostorový deficit
- poruchy nálady, poruchy chování

plod

- vysoké hladiny Phe poškozují plod
- mentální retardace, mikrocefalie, srdeční vady
- plod je postižen bez ohledu na svůj genotyp





Galaktosémie

- AR onemocnění dědičné onemocnění
- incidence: 1:35 000–50 000
- Galaktosémie I. typu - mutace **genu GALT** (krátké raménko 9. chromozomu)
- popsáno více než 230 mutací (nukleotidové substituce)
- Dva podtypy
 - 1. Klasická galaktosémie – úplný deficit GALT
 - 2. Duarte galaktosémie – částečný deficiit GALT
- deficit galaktóza-1-fosfát-uridylyltransferázy
(metabolizuje galaktóza-1-fosfát na UDP-galaktózu)
- patologické hromadění galaktóza-1-fosfát v játrech, ledvinách, mozku, střevu a v oční čočce
alternativní cestou se metabolizuje na **galaktitol** → působí toxicky na hepatocyty, neurony, tubulární buňky ledvin atd.

Galaktosémie

- **příznaky:** po zařazení mateřského mléka do stravy – zvracení, ikterus, sepse, katarakta, zvýšení JT, jaterní selhání, porucha koagulace, letargie, křeče
- **terapie:** kontraindikováno kojení – náhrada v podobě kojenecké výživy (Galactomin 17, Neocate), indikována přísně bezmléčná dieta bez laktózy; symptomatologická léčba komplikací
- **Dietní léčba:**
 1. vyloučení laktózy (vyloučení mléka a ml. výrobků)
 2. omezení galaktózy (volná či vázaná: luštěniny, vnitřnosti, papája)
- **prognóza:** nemusí být příznivá ani u včas rozpoznaných,
→ dítě bylo galaktóze vystaveno již intrauterinně
(galaktóza prochází placentou)
- poruchy řeči, kognitivní poruchy, IQ kolem 85
- u dívek hypergonadotrofní hypogonadismus



Další onemocnění dědičných poruch metabolismu I.

- poruchy metabolismu S, T, B
- **novorozenecký screening** – 18 onemocnění (1.6.2016)
- aktivní celostátní vyhledávání chorob
- odběr 48–72 hodin po narození
- stanovení koncentrace určitých látek ze suché kapky krve
- nemocné dítě cca 1:1150 narozených
- www.novorozeneckyscreening.cz

<i>Kongenitální hypothyreóza (CH)</i>	<i>vrozená snížená činnost štítné žlázy</i>
<i>Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH)</i>	<i>vrozená nedostatečná činnost ciduri kůry nadledvin</i>
<i>Cystická fibróza (CF)</i>	<i>vrozená porucha složení potu, plicního hlenu a trávicích šťáv</i>
<i>Fenylketonurie a hyperfenylalaninémie (PKU a HPA)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny aminokyseliny fenylalaninu</i>
<i>Leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny větvených aminokyselin (izo-) ciduri a valinu</i>
<i>Glutarová ciduria typu I (GA I)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny aminokyseliny cidur a tryptofanu</i>
<i>Izovalerová acidurie (IVA)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny aminokyseliny leucinu</i>
<i>Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCHAD)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny mastných kyselin</i>
<i>Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCAD)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny mastných kyselin</i>
<i>–Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (VLCAD)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny mastných kyselin</i>
<i>Deficit karnitinpalmitoyltransferázy I (CPT I)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny mastných kyselin</i>
<i>Deficit karnitinpalmitoyltransferázy II (CPT II)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny mastných kyselin</i>
<i>Deficit karnitinacylkarnitintranslokázy (CACT)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny mastných kyselin</i>
<i>Citrulinémie I. typu (ASS I)</i>	<i>porucha cyklu močoviny</i>
<i>Argininémie (ARG 1)</i>	<i>porucha cyklu močoviny</i>
<i>Deficit biotinidázy (BTD)</i>	<i>porucha látkové přeměny vitamínu biotinu</i>
<i>Homocystinurie z deficitu cystathionin β-syntázy (CBS)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny aminokyseliny methioninu</i>
<i>Remethylační forma homocystinurie z deficitu methyltetrahydrofolátreduktázy (MTHFR)</i>	<i>vrozená porucha látkové přeměny aminokyseliny methioninu</i>

WILSON'S DISEASE



Wilsonova choroba I.

- AR dědičné metabolické onemocnění

prevalence:

- homozygoti (aa) 1:25 000–30 000
- heterozygoti (Aa) 1:90
- mutace genu ATP7B na 13. chromosomu

- gen kóduje ATPázu transportující měď
- porucha exkrece mědi do žluče a inkorporace mědi do apoceruloplasminu v hepatocytech

- abnormální hromadění mědi v játrech → poškození jaterních buněk
- mozku → poruchy funkce CNS

Wilsonova choroba II.

- **klinicky:** tremor, zhoršení ve škole, rukopis, psychické změny, anémie, jaterní fibróza → cirhóza
- u 5 % postižených se onemocnění projeví jako fulminantní jaterní selhání
- snížená sérová hladina ceruloplazminu
- zvýšené vylučování mědi močí
- zvýšený obsah mědi v játrech



Wilsonova choroba III.


- celoživotní léčba
- omezení potravin bohatých na měď (čokoláda, kakao, mořské ryby, vnitřnosti, švestky)
- podávání léků chelatujících měď (Penicilamin 1000 mg/den)
- Zn – snižuje resorpci mědi ve střevě
- transplantace jater



Cancer

Monogenně podmíněná nádorová onemocnění I.

- cca 5 % z celkového počtu novotvarů
- nevhodné vyjádření jednoho genu
- malý vliv vnějšího prostředí
- zpravidla – **geny pro proteiny řídící buněčný cyklus**



Monogenně podmíněná nádorová onemocnění II.

- familiární výskyt
- mutace postihuje všechny buňky organismu již od vzniku zygoty (tzv. zárodečná mutace)
- jedinec vstupuje do života se znevýhodněnou pozicí každé buňce těla
- vysoká pravděpodobnost rozvoje onemocnění (až 80–90 %)
- vývoj nemoci již v mladém věku
- prevence obtížná
- **zásady správné výživy mohou oddálit nástup onemocnění**

Monogenně podmíněná nádorová onemocnění III.

- HNPCC (hereditary non polyposis colorectal cancer, též Lynchův syndrom) – AD dědičnost
- FAP (familiární adenomatózní polypóza)
- hereditární nádor prsu a ovaria
- MEN (mnohotná endokrinní neoplazie) současný výskyt tumorů několika endokrinních žláz
- Liův-Fraumeniho syndrom - mutace tumor-supresorového genu p53

Převážně monogenní obezita

- známo **nejméně 11** genů, jejichž mutace je příčinou vzniku monogenní formy obezity
- mutace genů pro LEP, LEPR a POMC jsou výjimečné svojí úplnou penetrancí a AR dědičností
- manifestace obezity v raném dětství, hyperfagie, hypogonadotropní hypogonadismus a centrální hypothyreóza

- mutace genů na ose regulující příjem potravy:
 - leptin (LEP)
 - leptinový receptor (LEPR)
 - proopiomelanokortin (POMC)
 - melanokortinový receptor 4. typu (MC4R), 3. typu (MC3R)
 - prohormon konvertáza 1 (PC1), atd...

Centrální regulace příjmu potravy – hypotalamus I.

- nejvyšší regulátor
- **centrum hladu** – laterální oblast (LHA)
- **centrum sytosti** – ventromediální oblast (VMH)



- tvorba aktivačních a inhibičních neurotransmiterů ovlivňujících příjem potravy

- **centrální mechanismy:** lokalizované v oblasti hypotalamu
- **informace z periferie:** prostřednictvím n. vagus, gastrointestinálními peptidy, hormony tukové tkáně
- reaguje na:
 - krátkodobý a dlouhodobý nutriční stav, skladování energie
 - signály z GIT
 - koncentrace metabolitů v krvi
 - trávicí procesy

- na základě informací z periferie má jedinec buď pocit hladu či sytosti

Centrální regulace příjmu potravy – hypothalamus II.

- **nucleus arcuatus**
 - orexigenní neurony
 - anorexigenní neurony
- **Orexigenní neurony:** neuropeptid Y (NPY)/ agouti-related peptide (AgRP), melanin koncentrující hormon (MCH), orexin A, B
- **Anorexigenní neurony:** proopiomelanokortin (POMC)/ peptidy CART (cocaine and amphetamine regulated transcript), kortikoliberin (CRH), tyreotropin uvolňující hormon (TRH), mozkový neurotrofický faktor (BDNF)



Mutace genu pro leptin


- vzácný výskyt, vždy homozygot
 - první mutace nalezena v roce 1997 u dvou obézních dětí (2,5 let 30 kg, 9 let 96 kg)
- neschopnost produkovat leptin v buňkách tukové tkáně (nízké až nulové hodnoty)
- výrazná hyperfagie (agresivní chování, podobné PWS)
- vznik těžké obezity v raném dětském věku
- hypogonadotropní hypogonadismus, opožděný nástup puberty
- centrální hypotyreóza
- **Terapie:** substituce **leptinu** → vymizení hyperfagie, normalizace tělesné hmotnosti, sekrece gonadotropinu a tyreotropinu

Mutace genu proopiomelanokortin (POMC)

- POMC – polypeptid – exprese v hypotalamu, placentě a pankreatu
- vznik obezity v časném věku
- nadledvinová insuficience při deficitu adrenokortikotropního hormonu
- hyperfagie a obezita – především u homozygotních nositelů mutace MC3R a MC4R
- fenotyp s rusými vlasy a bledou pletí (nejčastěji u MC1R)

- nejčastěji mutace melanokortinového receptoru typu 4. (MC4R)
 - prevalence u lidí s časným vznikem obezity 0,5–5,8 %
 - v ČR prevalence u dětí s časně vzniklou obezitou – 2,4 %

LACTOSE INTOLERANCE:




Laktózová intolerance I.

- snížená aktivita laktázy → potíže se štěpením laktózy
- novorozenecký a kojenecký věk – vysoká aktivita laktázy
- přechod na smíšenou stravu – pokles až ztráta laktázové aktivity → geneticky determinováno (ne monogenně)

Laktózová intolerance II.


- snížení aktivity laktázy – laktázová insuficience
 - homozygotní jedinci s CC genotypem v promotorové oblasti laktázového genu → laktózová intolerance
 - bolesti břicha, nadýmání, průjem



Laktózová intolerance III.


Historicky

- mléko z domestikovaných krav je cenným nutričním zdrojem po více než 8000 let, zvláště ve společenstvech, jež byla schopna laktózu trávit – evoluční výhoda
- populace severní-střední Evropy byla v neolitu vysoce závislá na mléce a tak vznikl silný selekční tlak na laktázovou perzistenci
- **Vztah laktózové intolerance k vitaminu D**
severní zeměpisná šířka – zdroj mléko, mléčné výrobky
jižní zeměpisná šířka – zdroj sluneční záření (UVB)



Laktózová intolerance IV.

Worldwide prevalence of lactose intolerance in recent populations
(schematic)



Děkuji za pozornost

