

MUNI
MED

Diplomový seminář IV.

Výstupy diplomových prací

PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd

Výstupy DP

- příkládány jako příloha
- Edukační - pro cílovou skupinu
- Publikační – přednášky na konferencích , postery, odborné články
- Informační - např. pro odbornou veřejnost, specifickou skupinu pacientů
- Obohacující klinickou praxi - algoritmy, standardy, návrhy auditu, doporučené postupy

Příklady výstupů – nedostatek znalostí

Edukační materiály

- prezentace

Příloha č. 8 – Prezentace ke školení KPR

<p>KPR dle platných Guidelines 2015 (ILCOR)</p> <p>Česká resuscitační rada Czech Resuscitation Council</p>	<p>Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník § 150 Neposkytnutí pomoci</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo její závažné vážné poruchy zdraví nebo vážného omezení, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo její závažné vážné poruchy zdraví nebo vážného omezení, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
<p>Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník § 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku</p> <ul style="list-style-type: none"> Řidič oopravněno prostreku, který po opravrní neohd, na níž má účast, neposkytne osobě, která při neohd stpáke újmu na zdraví, potřeou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. 	<p>NZO (Náhlá Zástava Oběhu)</p> <ul style="list-style-type: none"> Náhlá zástava oběhu (NZO) je charakterizována jako náhle přerušení cirkulace krve v systémovém krevním oběhu nastávající z jakýchkoli příčin Klíčové postupy při selhání některé ze základních životních funkcí jsou: včasná a správná a) první oěh, včasná po určité době k selhání dalších životně důležitých funkcí. Bezvědomí nastává v různých časových intervalech, právě podle typu selhání. Při přerušení krevního oběhu, bezvědomí nastává do 15 sekund, zatímco terminální dechy přetrvávají až 60-90 sekund.
<p>Příčiny NZO</p> <ul style="list-style-type: none"> Primární kardiální zástava Hypoxická zástava Reverzibilní „4H“ a „4T“ Hypoxie Tamponáda srdce Hypovolemie Tenzií pneumotorax Hypotermie Trombóza (embolie) Hypohyperkalémie Toxické účinky 	<p>DEFINICE KPR</p> <ul style="list-style-type: none"> Soubor jednoduchých a účelných opatření, které vedou k obnově oběhu oxygenované krve mozkem při selhání některé ze základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh).
<p>Rozdělení KPR</p> <ul style="list-style-type: none"> Základní neodkladná resuscitace BLS Rozšířená resuscitace ALS 	<ul style="list-style-type: none"> Základní neodkladná resuscitace BLS (Basic life support) - jsou postupy KPR bez vybavení a pomůcek, patří sem resuscitační rouška a AED (automatizovaný externí defibrilátor) Rozšířená resuscitace ALS (Advanced life support) - používá ke KPR vybavení, pomůcky, přístroje Poruscitační péče - ARO, JIP
<p>ŘETĚZEC PŘEŽÍTI</p> <p>Chain of survival</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikace volání pomoci okamžitá KPR okamžitá resuscitace okamžitá přeprava do nemocnice okamžitá péče v nemocnici 	<p>A-airway (zajištění dýchacích cest) B-breathing (umělé dýchání) C-circulation (srdeční masáž)</p> <p>DNES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Airway - dýchacích cesty Circulation - srdeční masáž

Příloha 3: Přednáška na téma VNN

(zdroj: vlastní tvorba a foto archiv ZZS PAK)

VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI
ŠÁRKA HOŠKOVÁ
3. ROČNÍK

• VYSVĚTLENÍ POJMU VNN
• OOPP A SPECIÁLNÍ VÝSTROJ
• BARIÉROVÁ PÉČE NA MÍSTĚ UDÁLOSTI

Příklady výstupů – nedostatek znalostí

Edukační materiály

- letáky

PORANĚNÍ O OSTRÝ MATERIÁL A JEHO PREVENCE

Co mě nejvíce ohrožuje?	Jak postupovat při likvidaci ostrého materiálu?
! virová hepatitida C	✓ nevracet jehly zpět do krytu (pouze u inzulínového pera)
! HIV	✓ odkládat použitý ostrý materiál do kontejneru nebo samostatné emitní misky
✓ proti hepatitidě B jsem ze zákona povinně očkován	✓ omezit manipulaci po jeho použití na minimum
Jaké si vezmu rukavice?	✓ používat nepropichnutelné, řádně označené kontejnery
✓ nitrilové (pevnější, vhodné pro manipulaci s ostrým materiálem)	! neoddělovat jehly od stříkaček ručně
✓ latexové (lepší citlivost, vhodné pro manipulaci s biologickým materiálem)	
! vinylové (absolutně nevhodné)	

Jak postupovat při poranění ostrým materiálem?



1. mytí mýdlem a vodou
2. dezinfekce
3. zajištění spontánního krvácení (netraumatizovat!)
4. znovu dezinfekce
5. hlášení a zápis poranění do knihy úrazů
6. odběr krve u závodního lékaře

© Jana Hložná

OŠETŘENÍ POKOŽKY
U PACIENTŮ S INKONTINENCÍ

1. KROK - ČIŠTĚNÍ	2. KROK - HYDRATACE	3. KROK - OCHRANA
Alespoň 1x denně a po každé epizodě fekální inkontinence	Nepoužívat na pokožku, která je nadměrně hydratovaná nebo macerovaná	Četnost aplikace odpovídající schopnosti ochranného prostředku chránit pokožku a dle pokynů výrobce
✓ Čistící prostředek s pH podobné normální pokožce (pH < 7) ✓ Jemné techniky s minimem tření ✓ Jemné čistící prostředky nebo vlhčené ubrousky ✓ Jemné osušení pokožky	✓ Příklad vhodných obsažených složek: ✓ Ceramidy – podobné lipidům ve zdravé kůži ✓ Vazelína ✓ Oleje (minerální, silikonové a rostlinné) ✓ Glycin, urea, kyselina mléčná	✓ Aplikace na pokožku, která přichází do styku s močí nebo stolicí. ✓ Příklad ochranných složek: ✓ Vazelína ✓ Oxid zinečnatý ✓ Dimethicone
✗ Použití samotné vody ✗ Alkalické mýdlo + voda ✗ Žínky s hrubou strukturou		
DOPORUČENÍ: Přípravky 3v1 - ✓ zjednodušení péče ✓ snížení počtu kroků ✓ šetření času pro personál		

Příklady výstupů – nedostatek znalostí

Edukační materiály pro pacienty

- Fotodokumentace - brožury

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI CHŮZI O PODPAŽNÍCH BERLÍCH



Vytáčení chodidla je způsobeno svalovou nerovnováhou rotátorů v kyčelním kloubu, nebo jako výsledek antalgického postavení. Často ji můžeme vidět u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu, nebo po cévní mozkové příhodě. V případě stavů po cévní mozkové příhodě bývá vytáčení chodidla spojeno s cirkumdukci, při které jsou oslabeny flexory kyčelního kloubu a extenzory kloubu kolenního. Chůze je pak doprovázena elevací pánve.



2. Chůze se skloněnou hlavou




Chůze se skloněnou hlavou: klient sklání hlavu proto, aby mohl sledovat dolní končetiny. V případě ataktické chůze tuto fixaci očima dovolujeme. V ostatních případech je žádoucí, aby klient upíral zrak před sebe. Chůze se skloněnou hlavou totiž jednak omezuje orientaci v prostoru, ale také způsobuje bolesti za krkem a dále nutí klienta přenášet tíži před sebe. Takové přenesení tíže pak zvyšuje riziko pádu.

3. Nedostatečné, nebo nadměrné zatěžování postižené dolní končetiny



Nedostatečné či nadměrné zatěžování postižené dolní končetiny: tato porucha stereotypu bývá následkem poruchy kognitivních funkcí, kdy klient není schopen porozumět pokynům fyzioterapeuta a nedovede tak zatěžovat jen v míře určené lékařem.

4. Zavěšení do berlí



Zavěšení do berlí: pozorujeme v případě špatného nastavení berlí. Dále se objevuje při oslabení horních a dolních končetin.

5. Špatné kladení a odvíjení chodidla




Špatné kladení a odvíjení chodidla: Příčinou je oslabení extenzorů chodidla, což zneemožní zvednutí špičky. Chůze pak připomíná chůzi kohouti. Dalšími faktory vzniku jsou: nestejná délka kroku, svalová disbalance a antalgické postavení.

6. Nesprávná délka kroku



Nesprávná délka kroku: nastává následkem svalové nerovnováhy flexorů kyčelního kloubu a extenzorů kloubu kolenního. Dále pak hraje svou roli i bolest dolních končetin.

7. Nesprávná chůze ze schodů



Nesprávná chůze ze schodů: Špatná chůze ze schodů znamená záměnu schématu uvedeného níže. Po berlích musí vždy vykročit postižená končetina. Zdravá noha totiž pacienta snáší dolů ze schodů. Správnému provedení pohybu může bránit porucha kognitivních funkcí a strach. Správné schéma chůze ze schodů je následující:
1. berle 2. postižená končetina 3. zdravá končetina
* V obrázku je postižená končetina značena červeným křížkem

8. Nesprávná chůze do schodů



Nesprávná chůze do schodů: Při chůzi ze schodů si rozhodně nepočítáme, jako při prosté chůzi vpřed. Při chůzi do schodů zdravá noha pacienta vytahuje nahoru do schodů. Správnému provedení pohybu může bránit porucha kognitivních funkcí a strach. Správné schéma do schodů je následující:
1. zdravá 2. postižená končetina 3. berle
* V obrázku je postižená končetina značena červeným křížkem

Příklady výstupů – nedostatek znalostí

Edukační materiály pro pacienty

- Text – brožury

PŘÍLOHA 2: Brožura Transplantace a dárcovství kostní dřeně – Otázky a odpovědi

The image displays several pages of a brochure titled "Transplantace a dárcovství kostní dřeně - Otázky a odpovědi". The text is in Czech and addresses various questions and concerns related to bone marrow transplantation and donation. Key sections include:

- 1. Jaké jsou příznaky, příznaky onemocnění a závažné komplikace u příjemce transplantace?** - Discusses symptoms and complications for the recipient.
- 2. Jaké jsou rizika onemocnění a závažné komplikace u příjemce transplantace?** - Lists risks and complications for the recipient.
- 3. Jaké jsou rizika onemocnění a závažné komplikace u příjemce transplantace?** - Lists risks and complications for the recipient.
- 4. Jaké jsou rizika onemocnění a závažné komplikace u příjemce transplantace?** - Lists risks and complications for the recipient.
- 5. Jaké jsou rizika onemocnění a závažné komplikace u příjemce transplantace?** - Lists risks and complications for the recipient.
- 6. Co vás může zajímat odlišně a podle typu příjemce?** - Addresses specific concerns for different recipient types.
- 7. Proč je důležité být registrovaným dárce?** - Explains the importance of being a registered donor.
- 8. Jaké jsou rizika onemocnění a závažné komplikace u příjemce transplantace?** - Lists risks and complications for the recipient.
- 9. Jaké jsou rizika onemocnění a závažné komplikace u příjemce transplantace?** - Lists risks and complications for the recipient.

The brochures also feature logos for the National Center for Organ and Tissue Donation (Národní centrum pro orgánovou a tkáňovou dárku) and the National Center for Hematology and Transplantation (Národní centrum pro hematologii a transplantaci).

Příklady výstupů – nedostatek znalostí, nové postupy

Edukační materiály

- Video

Do archivu závěrečných prací nahrávat zvlášť jako přílohu



Příklady výstupů – při observační studii

- informační mapy

Informační mapa

Péče o pacienta před a po koronarografii z radiálního přístupu při akutním infarktu myokardu

	Před vyšetřením - v den výkonu	Po vyšetření - v den výkonu	První den po vyšetření
Dieta	Lačnění 6 hodin před vyšetřením. Tekutiny neomezeně.	Přijem stravy bez omezení, dle diety.  Tekutiny ve větším množství (po aplikaci kontrastní látky).	Přijem stravy bez omezení, dle diety. Tekutiny bez omezení.
Operační pole	Hygiena pravé a levé horní končetiny. Oholení zápěstí a části předloktí pravé a levé horní končetiny, v místě hmatné vřetenní tepny. Po vyšetření na zápěstí nasazena tato kompresní pomůcka – TR Band: 	Po vyšetření na vpichu po koronarografii kompresní pomůcka TR Band. Sestra kontroluje barvu, prokrvení, otok, hybnost a cítí na horní končetině. Také sleduje krvácení a případně hematom v okolí TR bandu. Odpouštění vzduchu z TR Band asi 30 minut od nasazení, poté 3x – 4x za hodinu dle případného krvácení. 	Kontroly místa vpichu pohledem, pohmatem, ev. poslechem. 
Pohybový režim	Hospitalizace na koronární JIP. Leh na lůžku, sed v případě absence bolesti na hrudi.	Hospitalizace na koronární JIP. Leh na lůžku, sed v případě absence bolesti na hrudi. Šetření horní končetiny, ze které bylo provedeno vyšetření. Elevace horní končetiny po dobu nasazení TR Bandu.	Hospitalizace na koronární JIP. Leh, sed na lůžku i mimo lůžko. Šetření horní končetiny. Nezatěžovat horní končetinu minimálně 3 dny od vyšetření.

	Před vyšetřením - v den výkonu	Po vyšetření - v den výkonu	První den po vyšetření
Zajištění nitrožilního vstupu	Zavést nitrožilní kanylu, nejlépe předloktí levé horní končetiny. 	Ponechat nitrožilní kanylu pro podávání léků.	Aseptické ošetření zavedené kanyly, kontroly funkčnosti nitrožilní kanyly.
Vyprazdňování	Na lůžku nebo u lůžka do močové láhve/podložní misky. 	Na lůžku nebo u lůžka do močové láhve/podložní misky, ev. pojezdě WC.	Na lůžku nebo u lůžka do močové láhve/podložní misky, ev. pojezdě WC.
Monitorace vitálních funkcí	Monitorace krevního tlaku, tepu, dechové frekvence, saturace krve O ₂ a 1 hodina. Monitorace EKG křivky kontinuálně.	Monitorace krevního tlaku, tepu, dechové frekvence, saturace krve O ₂ a 1 hodina. Monitorace EKG křivky kontinuálně.	Monitorace krevního tlaku, tepu, dechové frekvence, saturace krve O ₂ a 1 hodina. Monitorace EKG křivky kontinuálně.
Specifika	Sejmout šperky, vyndat zubní protézy. Ponechat brýle, naslouchadlo. Aplikace kyslíku kyslíkovými brýlemi, podání ordinarovaných léků. Provedení záznamu EKG.	Provedení záznamu EKG. Podání doporučené medikace. Aplikace kyslíku.	Podávání ordinarovaných léků. Aplikace kyslíku. Další výkony dle ordinarce lékaře.

Příklady výstupů – při observační studii

- informační mapy


Priloha 12 Informačná mapa - Starostlivosť o pacienta pred a po vaskulárnom výkone na pečení z tepnového (femorálneho) prístupu

	Pred vyšetrením v deň výkonu	Po vyšetrení v deň výkonu	Prvý deň po výkone
Dieťa	4 - 6 hodín nalačno. Tekutiny neobmedzene.	Obmedzenie podľa diéty alebo plánovaných vyšetrení. Väčšie množstvo tekutín p.o. alebo i.v. podľa stavu pacienta.	Prijem stravy bez obmedzení podľa diéty. Tekutiny bez obmedzenia.
Operačné pole	Hygiena celého tela. Vyholenie oboch slabín.	Na slabinu je pripevnené vrecko s pieskom (miesto vpichu ošetrené cievny uzatváračom). Vrecko s pieskom odstrániť po 2 hodinách. Pri podozrení na možné krvácanie z miesta vpichu naložený kompresný systém FemoStop. FemoStop odstrániť po 2 - 3 hodinách (nutné priebežné sledovanie miesta vpichu).	Kontrola miesta vpichu pohľadom prip. pohmatom.
Pohybový režim	Hospitalizácia na Oddelení hepatológie. Pohybový režim bez obmedzenia (podľa stavu pacienta).	Hospitalizácia na Oddelení hepatológie. Kľud na lôžku bez ohýbania dolnej končatiny, z ktorej bol robený výkon. Po 12 hodinách od výkonu možná mobilizácia.	Hospitalizácia na Oddelení hepatológie. Pohybový režim bez obmedzenia (podľa stavu pacienta).
Zaistenie vnútrožilového vstupu	Zaviest' vnútrožilovú kanylu, najlepšíe na pravej hornej končatine.	Ponechať vnútrožilovú kanylu na podávanie liekov.	Aseptické ošetrenie zavedenej kanyly, kontrola funkčnosti vnútrožilovej kanyly.
Vyprázdňovanie	Podľa pohybového režimu (WC alebo na lôžku - močová fľaša/podložná misa). Tesne pred výkonom	Do 12 hodín po výkone na lôžku - močová fľaša/podložná misa. Neskôr podľa pohybového režimu.	Podľa pohybového režimu (WC alebo na lôžku - močová fľaša/podložná misa)
Monitoring vitálnych funkcií	Monitoring krvného tlaku pred výkonom Ďalší monitoring podľa stavu pacienta.	Monitoring krvného tlaku, pulzu, dychovej frekvencie. Ďalší monitoring podľa stavu pacienta.	Monitoring podľa stavu pacienta.
Špecifiká	Ďalšie výkony podľa ordinácie lekára. Zložiť šperky, vybrať zubú protézu. Ponechať okuliare a naslúchatko. Podanie ordinovanej medikácie.	Podanie ordinovanej medikácie.	Podávanie ordinovaných liekov. Ďalšie výkony podľa ordinácie lekára.

Příklady výstupů – při observační studii

– algoritmy

Obrázek č. 25 Algoritmus komplexního zhodnocení seniora s bolestí při přijetí do pobytového zařízení



Příklady výstupů – při observační studii

– návrhy záznamů v dokumentaci

Ošetrovatelský záznam nehojící se rány ©2014 Saibertová, Pokorná a kol.

Jméno a příjmení:		Identifikační údaje PZSS	Datum zahájení léčby:
Rodné číslo:			Datum ukončení léčby:
Zdravotní pojišťovna:			Lokalizace rány (zakresli)
Typ rány	<input type="checkbox"/> Dekubitus <input type="checkbox"/> Bércová ulcerace <input type="checkbox"/> Diabetická noha <input type="checkbox"/> Exulcerace <input type="checkbox"/> Jiné:		
Stupeň	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5.		
Týdny léčby	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.	
Velikost rány		Okolí rány	
Délka		Zdravé	
Šířka		Macerace	
Hloubka		Ekzém	
Spodina rány		Zanět	
Černá		Jiné:	
Žlutá		Okraje rány	
Červená		Ohraničené	
Růžová		Neohraničené	
Exsudace		Navalité	
Žádná		Podminované	
Mírná		Erytematózní	
Střední		Hyperkeratóza	
Rozsáhlá		Jiné:	
Profúzní		Známky zánětu	ano ne
Zápach		Bolest rány (uveď číselnou škálu bolesti od 1-10)	
Žádný		Při převazu	
Primární krytí		Po převazu	
Sekundární krytí		Stále	
V místnosti			
Záznam provedl:		Frekvence převazů:	
Datum zápisu:			

Mikrobiologické vyšetření Ano Ne

Datum provedení: Nález:

ATB léčba Ano Ne

Datum zahájení: Název ATB:

Ošetření rány: oplachový roztok, primární a sekundární krytí

Příklady výstupů

– poster na konferenci

Názory pacientů na omezení elektivní péče v době pandemie COVID-19

Kristýna Režňáková, Simona Saibertová
Ústav zdravotnických věd, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno, Česká republika

Úvod: Vzhledem k vysokému nárůstu počtu nakažených novým kmenem koronaviru SARS-CoV-2 pandemii COVID-19 byla 11. března 2020 Světovou zdravotnickou organizací prohlášena globální pandemie, a byla zavedena epidemiologická opatření.¹ Během pandemie COVID-19 docházelo k omezování elektivní péče, zejména u pacientů, jejichž zdravotní stav nevyžadoval urgentní péči. Byly rušeny plánovaná vyšetření, operace, kontroly, a i samotní pacienti omezovali návštěvy zdravotnických zařízení. Ovlivněn byl chod oddělení v podstatě na všech klinikách – chirurgických i interních, ale také i v ambulancním sektoru. Je popisováno, že v prvních 12ti týdnech pandemie muselo být odloženo více než 30 milionů elektivních operací – tj. 70 % všech elektivních operací po celém světě.² Cílem studie bylo zjistit názory pacientů na omezení elektivní péče v době pandemie COVID-19 v oblasti návštěv ošetřujícího lékaře, odložení plánovaného výkonu a následných komplikací.

Metoda: Deskriptivní observační studie. Sběr dat probíhal prostřednictvím strukturovaného rozhovoru se záznamem do záznamového archu u pacientů ve věku 18-89 let, kterým byl odložen plánovaný operační výkon během pandemie COVID-19 tj. v roce 2019-2022. Sběr dat byl prováděn v termínu 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022 ve Fakultní nemocnici Brno na vybraných klinikách chirurgického typu, konkrétně na těchto klinikách: Ortopedické klinice, Klinice popálenin a plastické chirurgie, Chirurgické klinice, Neurochirurgické klinice a v Uherskohradištské nemocnici a.s. na vybraných odděleních chirurgického typu.

Soubor: Celkem 118 pacientů v průměrném věku 61 let, z toho 52 žen a 66 mužů.


Výsledky: Pacientům, kterým nebyla odložena návštěva ošetřujícího lékaře se častěji nezměnila ani celková pravidelnost návštěv během pandemie COVID-19. Nejvíce změn v pravidelnosti návštěv bylo v případě změny termínu z vlastní iniciativy ($p < 0,001$). Pacientům, kterým byla zajištěna náhradní adekvátní terapie tolik nevadilo posunutí termínu plánovaného operačního výkonu, naopak osobám, které nebyla zajištěna adekvátní náhradní péče odložení velmi vadilo v 66,7 % případů ($p = 0,002$). Nespokojenost pacientů s odkladem zákroku statisticky významně roste i nespokojenost s celkovou kvalitou služeb ($p = 0,013$). Výskyt komplikací popisovalo celkem 34 (28,8 %) respondentů a žádné komplikace uvádělo 73 (61,9 %) respondentů. Nejčastěji objevovala bolest ve 13 (38,2 %) případech, celkové zhoršení zdravotního stavu v 5 (14,7 %) případech a nejhorší zaznamenaná komplikace byla popsána jako amputace u 3 (8,8 %) respondentů. Pacienti, kteří zaznamenali komplikace z důvodu odložení plánovaného výkonu během pandemie COVID-19 uvedli, že užívali více léků z důvodu zhoršení zdravotního stavu (44,1 % s komplikacemi oproti 17,8 % bez komplikací, $p = 0,014$). Pacientům, kteří neměli žádné komplikace se kvalita života téměř nezměnila, nebo jen minimálně. V případě, že pacienti zaznamenali komplikace, kvalita života se jim v 41,2 % případů spíše zhoršila ($n = 14$), u 35,3 % s komplikacemi se kvalita života z důvodu odložení plánovaného výkonu během pandemie COVID-19 velmi změnila ($n = 12$). Pacienti, u kterých se vyskytly komplikace z důvodu odložení plánovaného výkonu během pandemie, častěji pozorují prodloužení doby rekonvalescence ($p = 0,004$).

Závěr: Ve všech sledovaných případech měl výskyt komplikací, které vznikly odložením plánovaného operačního výkonu během pandemie COVID-19, významný vliv na zhoršení zdravotního stavu pacientů. I přesto, že u respondentů došlo k omezení elektivní péče během pandemie COVID-19, subjektivně hodnotili kvalitu poskytované péče spíše pozitivně.


Reference:

1. Pollard CA, Morran MP, Nestor-Kalinowski AL. The COVID-19 pandemic: a global health crisis. *Physiol Genomics*. 2020;52(11):549-557. doi:10.1152/physiolgenomics.00089.2020
2. Lock JE, Köhler F, Germer CT, Flemming S, Wiegand A. Auswirkung von COVID-19 auf die elektive und notfallmäßige Kolorektalchirurgie [Impact of COVID-19 on elective and emergency colorectal surgery]. *Chirurg*. 2021;92(10):924-928. doi:10.1007/s00104-021-01464-z


MUNI
MED Ústav
zdravotnických
věd




Graf 1: Odložení plánované návštěvy ošetřujícího lékaře během pandemie COVID-19




Graf 2: Důvod odložení návštěvy ošetřujícího lékaře během pandemie COVID-19




Graf 3: Zajištění náhradní adekvátní terapie do doby náhradního výkonu



Graf 4: Hodnocení kvality poskytované péče během pandemie COVID-19



Graf 5: Výskyt komplikací z důvodu odložení plánovaného výkonu během pandemie COVID-19



Graf 6: Změna kvality života z důvodu odložení plánovaného výkonu během pandemie COVID-19

Příklady výstupů

– článek

Znalosti a zvyklosti všeobecných sester v prevenci ran v souvislosti se zdravotnickými prostředky v intenzivní péči – dotazníkový průzkum

The knowledge and practises of nurses in the prevention of medical devices related injuries in intensive care – questionnaire survey

Souhrn

Cílem studie bylo analyzovat znalosti a zvyklosti všeobecných sester v problematice vzniku ran v souvislosti se zdravotnickými prostředky využívanými na jednotkách intenzivní péče a standardních odděleních chirurgického a interního zaměření u vybraného souboru všeobecných sester. Soubor metodik: Dotazníkový průzkum byl realizován ve dvou okresních a dvou fakultních nemocnicích. Statistická analýza dat byla provedena pomocí SPSS pro Windows verze 21.0. ná hladině významnosti 0,05. Výsledky: V průzkumu bylo zařazeno 246 všeobecných sester (89 ze standardních oddělení, 159 z intenzivní péče). Za nejrizikovější pomůcky ve vztahu ke vzniku ran byly považovány nasazovací sonda a tracheostomická kanyla, které byly nejčastěji kontrolovány na standardním oddělení. Sestry v celém souboru hodnotily subjektivně své znalosti jako dobré. Subjektivní hodnocení znalostí a rizikých neovládalo s věkem ani vzděláním ($p > 0,05$), ale souviselo s délkou praxe na jednotkách intenzivní péče ($p = 0,01$). Rozdíly byly zjištěny ve frekvenci kontroly kůže pod zdravotnickou pomůckou dle typu pracoviště ($p < 0,05$). V intenzivní péči byla častěji kontrolována kůže pod oxymetrem a manžetou k měření krevního tlaku. Závěr: Znalosti v prevenci vzniku ran pod zdravotnickými prostředky jsou nedostatečné a rizika jsou podceňována. Všeobecné sestry pracující v intenzivní péči považují preventivní postupy za významnější.

Abstract

Aim: To analyse the knowledge and practises of nurses in the field of injuries related to medical devices in intensive care and standard units in the field of surgical and general medicine in a selected group of nurses. *Patients and methods:* The questionnaire survey was conducted in two districts and two university hospitals. Statistical data analysis was performed using SPSS for Windows version 21.0 at a significance level of 0.05. Results: A total of 246 general nurses (89 standard units, 159 intensive care units) were included in the survey. Nasogastric tube and tracheostomy tube, which were most commonly inspected at the standard ward, were considered the most hazardous medical devices. The nurses in the whole group evaluated subjectively their knowledge as good. The subjective evaluation of knowledge about the risks of injury was not statistically related to age or education ($P > 0.05$) but was related to the length of practice in intensive care units ($P = 0.01$). Differences were found in the frequency of skin inspection under the medical devices according to the type of workplace ($P < 0.05$). The skin under the oximeter and the blood pressure cuff were more frequently inspected by nurses at intensive care units. Conclusion: Knowledge in injury prevention under medical devices is inadequate and risks are underestimated. Intensive care nurses consider preventative measures to be more significant.

Key words

pressure ulcer – medical devices related injuries – nursing knowledge – risk – prevention

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádná konflikt zájmu.
The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.
Nezávislá data potvrzují, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zaslané do biomedicínských časopisů.
The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE "uniform requirements" for biomedical papers.

V. Kambová, A. Pokorná, S. Šalbertová
Katedra ošetrovatelství a porodní asistence, LF MU Brno
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetrovatelství a porodní asistence, LF MU
Kamenice 3
625 00 Brno
e-mail: apokorna@med.muni.cz

Klíčová slova

dekubitus – říny související se zdravotnickými prostředky – znalosti sester – rizika – prevence

Key words

pressure ulcer – medical devices related injuries – nursing knowledge – risk – prevention

Umělá plicní ventilace u novorozenců

Bc. Hana Juránková, Mgr. Dana Soldánová
Novorozenecká JIP, Pediatriká klinika, Dětská nemocnice, FN Brno
Katedra ošetrovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta Masarykova univerzita, Brno

Článek se zabývá umělou plicní ventilací u novorozenců. V první části se věnuje definování umělé plicní ventilace, jejím cílům, druhům a komplikacím. Popisuje činnosti sestry související s péčí o ventilovaného novorozence. Ve druhé části článek předkládá výsledky výzkumu zaměřeného na novorozence na umělé plicní ventilaci, její indikace a komplikace. Výsledky výzkumu autorky komentují a srovnávají s dostupnými zdroji.

Klíčová slova: novorozenec, umělá plicní ventilace, indikace, komplikace.

Respiratory support in neonates

The article focuses on the neonatal respiratory support. The first part applies to respiratory support definition, its aims, types and complications. It also describes guidelines of a nursing care for ventilated neonate. The results of our research, which was focused on neonates, requiring an invasive respiratory support, its indications and complications, are presented in the second part. The results of our research were compared to the most recent and relevant literature.

Key words: neonate, invasive respiratory support, indications, complications.

Úvod do problematiky

Přestože současná neonatální péče omezuje intubaci a mechanickou ventilaci na minimum a na její místo nastupují neinvazivní ventilační metody bez nutnosti zajištění dýchacích cest endotracheální nebo tracheostomickou kanylou (např. různě modifikovaný CPAP¹ nebo HFNC²), plicní ventilace je stále nutná pro léčbu novorozenců se závažnou respirační insuficiencí nebo v průběhu a po operačních výkonech. V takových případech jsou však novorozenci častěji extubováni, protože prodloužená invazivní ventilace je považována za významný rizikový faktor rozvoje nežádoucích krátkodo-

bych nebo dlouhodobých plicních komplikací, souborně označovaných zkratkou VILP¹ (1).

K hlavním cílům umělé plicní ventilace patří zajištění adekvátní výměny krevních plynů s použitím co nejnižšího možného inspiračního tlaku a koncentrace kyslíku ve vdechované směsi (FIO₂), a časná extubace (2). Mezi další cíle patří snížení práce dechových svalů, zvrát hypoxemie, respirační acidózy a dechové tísně. U některých skupin nemocných mohou být aktuální i další cíle, jakými jsou prevence a odstranění atelektáz, umožnění sedace dítěte, snížení únavy dechového svalstva, snížení nitrolebního tlaku a stabilizace hrudní stěny (3).

Umělou plicní ventilací (UPV) lze rozdělit na podpůrnou (zástupnou), kdy část dechové práce vykonává pacient sám, a řízenou, která

Factors influencing recurrence of the pressure ulcers after plastic surgery – retrospective analysis

Faktory ovlivňující recidivu dekubitální léze po plastickém chirurgickém výkonu – retrospektivní analýza

Abstract

Aim: The aim of the study was to evaluate the therapy process in patients with pressure ulcers indicated for plastic surgery intervention and to determine the factors influencing recurrence of pressure ulcers. **Methods:** Retrospective analysis of patients' documentation indicated for plastic surgery performed in a plastic surgery unit. **Results:** Body mass index (BMI) and body site of the pressure ulcers were identified as the significant factors influencing the rate of the recurrence of the lesion in the analyses of 46 patients with SS pressure ulcers. **Conclusion:** In the monitored patients' population, BMI and the site of pressure ulcers were identified as statistically significant parameters responsible for the recurrence of the lesions. The higher the BMI, the more frequent recurrence had occurred. The presence of pressure ulcers in the ischiatic area was related to the 'sion.

sm, kteří byli indikováni k plastické Metodika: Retrospektivní analýza účel realizovaná na klinice plastické ely s výskytem recidiv dekubity, lokalizace dekubitů u sledované řaci byly BMI a tělesná lokalizace ísejí se recidivou dekubitů. Vyšší adické oblasti byl spojen s častější

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.
Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné konflikt zájmu.
The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE "uniform requirements" for biomedical papers.
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zaslané do biomedicínských časopisů.

N. Antalová¹, A. Pokorná¹, A. Hokyňková², L. Cetlová³, J. Turek⁴

¹ Department of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic

² Department of Burns and Plastic Surgery, University Hospital Brno, Czech Republic

³ Department of Healthcare Studies, College of Polytechnics, Jihlava, Czech Republic

⁴ Department of Pediatric Surgery, Orthopedic and Traumatology, University Hospital Brno, Czech Republic

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Department of Nursing
Faculty of Medicine
Masaryk University
Kamenice 3, 625 00 Brno
Czech Republic
e-mail: apokorna@med.muni.cz

Accepted for review: 13. 6. 2018
Accepted for print: 10. 8. 2018

Key words