

Název léčiva	Způsob podání	Denní dávka (g/kg)	Jednotlivé dávky podle (g) (pokud není uvedeno jinak)			Poznámka
			0-1 rok	1-6 let	6-15 let	
MEROPENEMUM TRIHYDRICUM	i.v.	0,120	0,5-2,0*	0,5-2,0*	*po 8 h; velikost dávky podle typu infekce	
MESALAZINUM	p.o.	0,02	0,001-0,002*	0,002-0,004	*od 4 let	
MESNUM	i.v.				prevence hemoragické cystitidy navozené cytostatiky (i.v. 20 % dávky cytostatika)	
MESTRANOLUM	p.o.			0,05 mg	až 3×/den	
METAMIZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM	i.m., i.v.	0,008-0,06			ve 3-4 dávkách	
METHIONINUM	p.o.		2,0*	4,0*	*denní dávka při otravě paracetamolem	
METHOTREXATUM	intrathec.		0,006	0,008-0,012	v intervalu 2-5 dnů	
METHYLDOPUM	p.o.	0,01		0,25		
SESQUIHYDRICUM	i.v.	0,02-0,04				
METHYL PARABENUM NATRICUM					max. 60 mg/kg	
METHYLPHENIDATI HYDROCHLORIDUM	p.o.	1,0-2,0 mg*		0,02-0,06	*od 6 let	
METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM	p.o., p.rect.	0,0002	0,002/den	0,0075-0,015/den		
METRONIDAZOLUM	p.o., p.rect., i.v. vagin.	0,02	0,1-0,2*	0,2-0,3*	*denní dávka, po 8 h	
MICONAZOLUM	inf. p.o.	0,015-0,04	0,005		4×/den	
MIDAZOLAMUM	i.v. p.o. p.rect.	0,05-0,2 mg/kg 0,5 mg/kg 0,3-0,5 mg/kg	max. 0,006	max. 0,01	od 6 měs., v dílčích dávkách od 1 měsíce od 6 měsíců	
MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM	p.o.	0,004			od 8 let; dávky po 12 h	
MINOXIDILUM	p.o.	0,0002			lze zvyšovat o 100 µg/kg/3 dny (až do 1 mg/kg)	
MOFETILIS MYCOPHENOLAS	p.o.				po 12 h; pro tělesný povrch: 0,6/m ² ; 0,75/1,25-1,5 m ² ; 1,0/více než 1,5 m ²	
MONTELUKASTUM NATRICUM	p.o.		0,004*	0,005	*od 6 měs.	
MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM, MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS	s.c., i.m. p.o.	0,0002/kg/dávku 0,0006-0,0016			od 6 měs.; při opakovaném podávání se přechází na p.o. v dílčích dávkách po 4 h (neretardované přípravky) nebo 12 h (retardované přípravky)	
MOXIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM	intraocul.				u očních infekcí 5% roztok po 10 dnů; 1 kapka 3×/den	

Národní část
Tabulky