

Název léčiva	Způsob podání	Dávky (g) (pokud není uvedeno jinak)			Poznámka
		Jednotlivá dávka	Denní dávka	Maximální jednotlivá dávka	
CLOBAZAMUM	p.o.	0,02–0,08	0,08		anxiolytikum; u geriatrických pacientů se dávka snižuje
	p.o.	0,02–0,03	0,03		při epilepsii
CLOBETASOLI PROPIONAS	loc.				0,05% mast, krém; 1–2×/den, pak 1×/2–4dny; max. 50 g masti/týden
CLOBETASONI BUTYRAS	loc.				0,05% krém, mast
CLOFAZIMINUM	p.o.	0,05	0,05	0,3*	*v úvodní fázi terapie lepry; spolu s 0,6 g rifampicinu 1×/měsíc
CLOFIBRATUM	p.o.		1,5–2,0 (0,02–0,03/kg)		ve 2–3 dílčích dávkách
CLOMIFENI CITRAS	p.o.	0,05–0,1	0,05–0,1		
	p.o.	0,025–0,075	0,05–0,15		počáteční nízké dávky se zvolna zvyšují
	i.m.		0,025–0,15		
	i.v.	0,025–0,075			během 1,5–3 h
CLONAZEPAMUM		0,0005–0,001			úvodní dávka
	p.o.	0,001–0,002	0,003–0,006		*antianxiózní, **antikonzulzivní postupně titrovaná udržovací dávka
CLONIDINI HYDROCHLORIDUM	inf.		0,001–0,004	0,01	max. 0,5 mg/min
	p.o.	0,05–0,1 mg	0,1–0,2 mg		úvodní dávka; zvyšuje se podle odpovědi po 2–3 dnech
	transderm.	0,1–0,3 mg	0,2–0,6 mg		udržovací dávka
CLOPAMIDUM	inf.	0,15 mg			*mg/týden
	p.o.	0,005–0,01	0,01–0,02	0,02	pomalé podání ležícímu nemocnému
CLOPIDOGRELI BESILAS	p.o.	0,112–0,447	0,112	0,447	111,86 mg klopidogrel-besilátu odpovídá 75 mg klopidogrelu
CLOPIDOGRELI HYDROCHLORIDUM	p.o.	0,084–0,334	0,084	0,334	83,5 mg klopidogrel-hydrochloridu odpovídá 75 mg klopidogrelu
CLOPIDOGRELI SULFAS	p.o.	0,075–0,3	0,075–0,3	0,3	*tato dávka je doporučována v USA Cardiology American Heart Association; vyjádřeno jako báze
CLOTRIMAZOLUM	loc.	0,01			1% krém, roztok, zásyp; 2–3×/den po 2–4 týdny
	vagin.		0,1		6–7 dnů
				0,2	
CLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM		0,5			v 1 dávce
	p.o.	0,25–0,5	1,0–2,0	1,0	po 6 h
	i.m.	0,25	1,0	1,0	
	i.v.	0,5	0,5–1,0	1,0	2,0