



Zdravotní péče v mimořádných podmírkách

Základní neodkladná resuscitace

2010

MUDr. Lukáš Dadák
ARK FNUSA
15740@mail.muni.cz



JAK ?

Danger

Response

Airway

Breathing

Circulation

- podrobné vyšetření a poskytnutí PP
- zajištění zdravotnické pomoci
- dohledu, transportu, záznam informací



Danger



Nebezpečí



- Zabezpečit místo události
 - automobil parkovat **ZA** nehodou
 - označit trojúhelníkem, zastavit / omezit dopravu
- Zraněného
 - zabránit druhotným poraněním
- Zachránce
 - rukavice
 - resuscitační rouška / maska
- Ostatní přihlížející


Vědomí

Zakřič a zatřep

V bezvědomí se nachází každá zhroucená osoba nereagující na oslovení a bolestivý podnět.




Záklon hlavy




Dýchání:

- zvedá se hrudník = dýchací pohyby
- **dechový proud** - průchodné dýchací cesty
- hloubka a frekvence dýchaní
 - normální – pravidelné (10..14/min)
 - pomalé (< 9/min)
 - rychlé (>30/min)
 - nepravidelné
 - povrchní
 - lapavé dechy, gasping
 - zástava dechu



Vidět, slyšet a cítit

Dýchání:



Barva kůže (není spolehlivá):

- růžová
- cyanotická = modro-fialová - jen akra nebo celý člověk

Známky obstrukce dýchacích cest


- chropění, chrčení, bublání, pískání // Ticho
- vtahování jugula, (mezižeberních prostor-děti)
- zapojení pomocných dýchacích svalů
- souhyb nosních křídel
- vynucená poloha v sedě / ve stoje, opřen o lokty

Video

- dýchání



Oběh




vyšetřují lajci jen jsou-li přítomny známky života

- Vědomí
- Spontání pohyby
- Dýchání
- **Puls** hmatný dvěma prsty
 - na krkavici / ve tříslu
 - pak na zápěstí
- Kapilární návrat

Oběh - puls



- pravidelný, nepravidelný
- plný, nitkovitý
- tepová frekvence (počet pulzů za 10s * 6)
- známky šoku – studená bledá kůže, ...
- Kapilární návrat (do 2s)
- doba nutná k prokrvení nehtového lůžka
= po stlačení – bílá – růžová



1.

Zajistěte bezpečí pro sebe a okolí
zhodnotte stav nebezpečí, použijte ochranné pomůcky

2.

Zjistěte stav vědomí
oslovení, bolestivý podnět

NEREAGUJE
postižený je v bezvědomí

3.

Křikem přivolejte pomoc okolí
na pomoc s postiženým a pod.

4.

Uvolněte dýchací cesty
záklon hlavy tlakem na čelo a přizvednutím brady

5.

Zkontrolujte dýchání
poslech, pohled, pocit

5.

Zkontrolujte dýchání
poslech, pohled, pocit

LAPAVÉ DECHY, NEDÝCHÁ

postižený je v bezvědomí a nedýchá normálně

6.

Volejte tísňové číslo 155

7.


30 kompresí hrudníku
uprostřed hrudníku, s propnutými lokty,
na tvrdé podložce, frekvence 100/min.

8.


2 vdechy z úst do úst
plynný pomalý vdech po dobu
asi jedné vteřiny při záklonu hlavy

9.

Dále 30:2
do příjezdu záchranné služby,
do úplného vyčerpání, do obnovení dýchání



ve středu
hrudníku,
alepoň 5cm
alespoň
100/min



5.

Zkontrolujte dýchání
poslech, pohled, pocit

LAPAVÉ DECHY, NEDÝCHÁ

postižený je v bezvědomí a nedýchá normálně

6.

Volejte tísňové číslo 155

7.

30 kompresí hrudníku
uprostřed hrudníku, s propnutými lokty,
na tvrdé podložce, frekvence 100/min.

8.


2 vdechy z úst do úst
plynný pomalý vdech po dobu
asi jedné vteřiny při záklonu hlavy

9.

Dále 30:2
do příjezdu záchranné služby,
do úplného vyčerpání, do obnovení dýchání

Zaklonit hlavu,
ucpat nos,
nádech,
obemknout ústa,
výdech 1 s





Neúčiné pokusy o dýchání

Iniciální dechy selhaly


- hledej příčinu neprůchodnosti
- zkontroluj záklon hlavy
- Ne více než 2 pokusy o dýchání, pak opět stlačování hrudníku.

Rizika infekce během BLS

Je popsán přenos (slinami, zvratky, krví) jen:

- tuberkulóza
- *Neisseria meningitidis*
- severe acute respiratory distress syndrome (SARS)

Přesto jsou doporučeny **bariérové pomůcky** s jednocestným ventilem (výdechovou chlopní).
Autolékárnička od 1.1.2011




Mohou zvýšit mrtvý prostor
Mohou zvýšit odpor dýchacích cest

Brání infekci zachránce

BLS u dětí

provádíme jako u dospělých,
ale

- zahajujeme 5 vdechy
- masírujeme 1/3 výšky
hrudníku
- RZP voláme po 1 minutě
BLS
- laici masírují 30:2



Ukončení BLS

- obnoveny základní životní funkce
 - dýchá
 - pohyb, vědomí
- lékař = resuscitační úsilí nevede k obnově oběhu – 20-30 minut
- vyčerpání = je-li zachránce natolik vyčerpán, že v oživovacím úsilí nemůže pokračovat
- nové nebezpečí



■ 1. Prvotní vyšetření + PP

cíl: udržet základní životní funkce, zastavit krvácení.

Vědomí (Shake & Shout)

- při vědomí, probudný oslovením, bolestí
- bez reakce

Dýchání (dýchací pohyby, dechový proud, dýchací cesty, hloubka a frekvence dýchání)

- dechová zástava
- obstrukce dýchacích cest

Oběh

hmatný puls centrálně, na periferii

te波ová frekvence

kapilární návrat

život ohrožující krvácení

max 20s

zhodnocení =

Základní životní funkce:

Vědomí	+	0	+	0	0
Dýchání	+	+	0	0	0
Krevní oběh	+	+	+	+	0

Selhání jedné vede k selhání dalších.
(CMP, dušení, IM)

2. Podrobné vyšetření poraněného

barva kůže (cyanóza,
zarudnutí, prošedlá)
zevní známky poranění:
• podlitiny, odřeniny,
• rány
• krvácení

oči (zornice - a-/
symetrie, reakce na
osvit, bulby)
spojivky
krvácení z uší
mozkomíšní mok, mozek
zlomeniny

otevřený, nestabilní hrudník
pneumothorax

otevřené, uzavřené poranění
břicha

páteř:
lokalizace bolesti
citlivost, hybnost

končetiny:
otevřené zlomeniny
krvácení, amputace
bolest při pohybu
krepitace
doteck, hybnost

Nejčastější chyby

- pozornost se věnuje nedůležitým věcem
 - autonehoda - ošetřování zraněných X vlastní bezpečnost

Křičí na vás matka dítěte – ono krvácí z kolene!!!!
Dělejte něco!!!!!!

....

sraženého dítěte na přechodu pro chodce

....

? Stavět krvácení nebo **něco jiného**

Nejčastější chyby

- pozornost se věnuje nedůležitým věcem
 - autonehoda - ošetřování zraněných X vlastní bezpečnost
 - krvácení z kolene X bezvědomí, nedýchá

Fakta & Statistiky:

Nejčastější příčinou smrti jsou ve vyspělých zemích kardiovaskulární choroby.

- Příčinou zástavy oběhu dospělých je IM v 80% (u dětí dušení).
- 75-80% náhlých zástav oběhu vznikne doma
- Smrt mozkových bb. 4-6 min od zástavy oběhu
- Evropa: 700 000/rok; US: 400 000/rok
- 80 % případů netraumatických zástav oběhu je primárně zjištěna komorová fibrilace.

Video


- VF -Praha

Rozšířená neodkladná resuscitace

ACLS – doporučení ERC 2010



Resuscitation
journal homepage:
www.elsevier.com/locate/resuscitation



Zapamatovat si!!!

Léky užívané v resuscitaci


- O₂
- Adrenalin
- (Amiodaron)


Nejlépe by bylo pacientovi,
pokud by k zástavě oběhu nedošlo


2010 – novinky v ACLS


- přerušení dobře prováděných stlačení hrudníku – umožnit OTI, defibrilaci, i.v.
- Prevence zástavy oběhu – najít a léčit potenciální pacienty před zástavou oběhu – MedicalEmergencyTeam call
- Atropin již není mezi léky asystolie

In Hospital Resuscitation









Během CPR

- zajisti kvalitní masáž: frekvence, hloubka, uvolnění
- plánuj úkony před přerušením CPR
- dej kyslík
- zajisti dýchací cesty a kapnometrii
- nepřerušuj masáž
- žilní / intraoseální vstup
- odstranitelné příčiny??


Nejdůležitější část resuscitace

Rozpoznej srdeční rytmus

- defibrilací léčitelný
- defibrilací neléčitelný

Asystolie


- isoelektrická linie



Bezpulzová el. aktivita

Pulseless Electrical Activity
(elektromechanická disociace)

- komplex, isoel.linie, komplex




VF/ VT


Medscape®

www.medscape.com

A




B




Source: South Med J © 2004 Lippincott Williams & Wilkins

VF



Co je to?



Co je to?




Co je to?




Co je to?



Co je to?



Co je to?



Asystolie ?? jemnovlná fibrilace??

- Při pochybách léčit jako asystolii




Asystolie ?? jemnovlná fibrilace??

- Při pochybách léčit jako asystolii,
- toto je fibrilace!!



Elektroterapie





- Časná defibrilace je kritická pro přežití:
 - Nejčastější úvodní rytmus u náhlé zástavy oběhu dospělých je VF.
 - jediná Léčba VF je elektrická defibrilace.
 - Pravděpodobnost úspěšné defibrilace s časem rapidně klesá.
 - VF má tendenci přejít do asystolie během pár minut.
- Nejdřív výboj vs. nejdřív KPR?
 - výboj co nejdříve (jako v roce 2000)
 - pokud masáž může „uškodit“ = ihned po kardiochirurgii
- pak až 3 výboje bez masáže.
- 1 výboj a hned masáž
 - > 90% úspěšnost u bifazických výbojů
 - po úspěšné defibrilaci krátká asystolie a neúčiné stahy
 - kontrola rytmu až po 2 minutách, pokus o hmatání pulzu, jen při konsolidovaném EKG – úzké komplexy

Defibrilace

- je metodou volby u KT a KF – má přednost před dalšími postupy (adrenalin, OTI)
- KF je zrušena průtokem el.proudu přes myokard.
- čím dříve, tím účinější

Alternativou defibrilace = prekordiální úder jen prvních 30s



Energie

Joule (Watt × sec.) = kV * A * ms

srdcem projdou 4%

monofázický výboj 360 J




Figure 3.1 Monophasic damped sinusoidal waveform (MDS).

bifázický výboj 200 J

interní defibrilace 25 - 35 J

děti: VF u 5 – 15% SCA, iniciálně 2 J/kg, pak 4 J/kg




Figure 3.3 Biphasic truncated exponential waveform (BTE).

Zajištění dýchacích cest a ventilace


Během prvních minut VF SCA nejsou umělé vdechy pravděpodobně tak důležité jako komprese hrudníku.

- **Ventilace maskou a ambuvakem**
 - akceptovatelná u KPR; zvláště přínosná v prvních minutách KPR nebo když je pokročilé zajištění DC opožděné či neúspěšné
- **Pokročilé zajištění DC**


dříve OTI metodou volby, ale komplikace, zpoždění


 - kombirourka
 - LMA
 - OTI
 - u zachránců s odpovídajícím výcvikem a příležitostmi k provádění či nácviku OTI
 - ověření polohy klinicky a detekcí expirovaného CO₂

Předsunutí čelisti



Dýchání dítěte





Ventilace obličejomou maskou

dýchání s použitím křísícího vaku (Ambuvak)
velikost masky (1 .. 5)

- adekvátní objem = zvedání hrudníku
- f 10/min
- 100% O₂



Ventilace obličejomou maskou



Držení:

1 rukou:

- palec + ukazováček
- 3 prsty - brada



2 rukama

- palce drží masku
- prsty zvedají čelist



Ústní vzduchovod OroPharyngealAirway



I: bezvědomí
+ obstrukce jazykem

Velikost:


- vzdálenost koutku úst – ušní lalůček

Riziko při mělkém bezvědomí:


- vomitus + aspiration

Technika zavedení:

- minout jazyk



Vzduchovod



LM – Laryngeální maska



LM

naléhá proti hlasivkám

(kořen j., recessus piriformis, horní jícnový svěrač)

Indikace:

- místo obličejové masky, místo OTI, v tísni.

KI:

- plný žaludek
- hiátová hernie,
- potřeba vysokých inspiračních tlaků
- delší operace


Kombirourka

- nouzová pomůcka místo OTI
- I: difficult airway
- KI: stenozující procesy laryngu a trachey



Intubace

- Zavedení tracheální rourky ústy, přes hrtan do průdušnice.



Po zajištění dýchacích cest

- 2 záchránci již neposkytují cykly KPR (komprese přerušené pauzou pro ventilaci)
- 1. záchránce: kontinuální komprese hrudníku, **alespoň 100/min**, bez pauzy pro ventilaci,
- 2. záchránce: 8 – 10 dechů/min, 500 - 600 ml, 6 – 7 ml/kg; Excesivní ventilace je škodlivá a neměla by být prováděna!
- Oba záchránci by si měli měnit role cca po 2 minutách: prevence únavy a zhoršení kvality a frekvence kompresí hrudníku. Je-li záchránců více, měli by se střídat v kompresích hrudníku po 2 minutách.
- Komprese hrudníku jsou doporučeny u kojence či dítěte, kde $HR < 60/\text{min}$ se známkami špatné perfuze přes adekvátní oxygenaci a ventilaci.

Žilní přístup

- zajištění periferního přístupu (i.v., i.o.)
- CŽ není nutná
- intratracheální podání není od roku 2010 doporučeno

Léky

- adrenalin
 - 1 mg i.v. každé 3 – 5 min,
 - vysoké dávky rutinně ne (předávkování beta-, Ca blokátory)
- vasopresin
 - není statistický rozdíl oproti A
 - 1 x 40 U i.v./i.o. jako náhrada 1. nebo 2. dávky A
- amiodaron
 - zlepšuje krátkodobé přežití do přijetí, lepší než lidokain
 - při VF/VT 300 mg i.v./i.o., možnost dalších 150 mg
- lidokain
 - jako alternativa, nezlepšuje přežití
 - 1 – 1,5 mg/kg i.v.
- magnesium
 - při torsades de pointes (nepravidelná polymorfní VT s prodlouženým QT)
 - 1 – 2 g/10 ml i.v.

Tekutiny během CPR

- Bolus tekutin (20ml) po každé dávce léku
- Pacient s akutní krevní ztrátou – prasklé AAA, EUG; hemoragický šok

Roztoky:

- Krystaloidy – Ringerův, Hartmanův, FR
- Koloidy – želatina, hydroxyethylškrob
- Glc – vůbec neužívat – horší neurol. výsledek
- Nepodávat volum při zástavě bez deplece tekutin!

Poresuscitační péče

- indukovaná hypotermie
 - Dospělí pacienti po zástavě oběhu mimo nemocnici by měli být chlazeni na 32°C to 34°C na 12 až 24 hodin, pokud byl úvodní rytmus VF. Podobná terapie může být přínosná pro pacienty s jiným úvodním rytmem, nebo při zástavě oběhu v nemocnici.
- kontrola glykemie
 - hyperglykemie spojena se špatnými neurologickými výsledky
 - Je rozumné striktně kontrolovat glykémii v poresuscitačním období.
- normokapnie, udržování CerebralPerfusionPressure
- kontrola křečí, antikonvulzivní léčba

Lund University cardiac arrest system (LUCAS)

Princip: komprese + dekomprese 5cm, 100/min

I. verze – pohon – stlačený vzduch

II. verze – elektrický pohon

+ výsledky

Lund University cardiac arrest system (LUCAS)







Load-distributing band CPR (AutoPulse)

<http://www.google.cz/u...>

- mechanická komprese hrudníku 100/min
- elektrický pohon
- +- výsledky



AutoPulse



Výhody

- dlouhá resuscitace – bez únavy
 - hypotermie
 - otravy
 - trombolýza při plicní embolii
 - transport během CPR

VF

- Please Shock-Shock-Shock, EVerybody Shock,
- And Let's Make Patients Better

VF

- (Please = precordial thrump)
 - Shock 200J nebo 360J
 - EVerybody = Epinephrine/Vasopressin
-
- And = Amiodarone
 - Let's = Lidocaine
 - Make = Magnesium
 - Patients = Procainamide
 - Better = Bicarbonate

Asystole

Check me in another lead,
then let's have a cup of TEA.

- ~~(T = Transcutaneous Pacing)~~
dnes již nedoporučeno
- E = Epinephrine
- ~~A = Atropine~~
dnes již nedoporučeno

PEA

- Problem (4H, 4T)
 - hypovolemie
 - hypoxie
 - hypotermie
 - H+
 - hypo/hyperkalemie
 - oTrava
 - tenzní PNO, tamponáda perikardu
 - tromboza a.cor.; PE
- Epinephrine
- Atropine

Ukončení ACLS

- obnova oběhu
- po 20 – 30 minutách se neobnovil oběh

Nezahájení resuscitace

- známky smrti
 - poranění neslučitelné se životem
 - nevyléčitelné onemocnění
-
- Kategorizace pacienta - prognóza
 - DoNotResuscitate


Zapamatovat si!!!

Léky užívané v resuscitaci

- O₂
- Adrenalin
- (Amiodaron)

Nejlépe by bylo pacientovi, pokud by k zástavě oběhu nedošlo


Defibrilace



- Pokračuj v CPR 30:2
- pošli pro přístroj
- otevři = zapnout

přilepit elektrody AED

následuj hlasové instrukce




Start of AED

Většina AED se zapne sama při otevření.




Přilepit elektrody na hrudník




ANALYSING RHYTHM DO NOT TOUCH VICTIM

- během analýzy elektrické aktivity je resuscitace přerušena

komorová fibrilace



SHOCK INDICATED





- Stand clear
- Deliver shock


SHOCK DELIVERED FOLLOW AED INSTRUCTIONS




NO SHOCK ADVISED FOLLOW AED INSTRUCTIONS



Adult Basic Life Support



Paediatric basic life support



*or national emergency number