

Celková anestezie

MUDr. L. Dadák

ARK, LFMU, FNUSA

<http://www.youtube.com/watch?v=c1JzCDqt3BM>

Obsah

- Perioperační období
- Předoperační vyšetření
- Premedikace
- Celková anestezie



Def: Anesteziologická péče

- soubor léčebných a diagnostických postupů, které **umožňují provádět operační výkony**, léčebné výkony a vyšetřovací metody v celkovém nebo regionálním **znecitlivění**.
- Je poskytována v **perioperačním** období a zahrnuje podíl na přípravě k výkonu, samotné zajištění v jeho průběhu a nezbytnou péči navazující



Historie – před eterem

snaha odstranit bolest ..

-3000 Egypt = komprese nervů (axila – ruka)


alkohol + opium = 16.století

1874 opium + komprese (James Moore)


Historie anestezie

- Za skutečného zakladatele moderní anestezie je pokládán bostonský dentista William Thomas Green Morton, který podal **16. října 1846** éterovou anestezii Gilbertovi Abbotovi k vynětí nádoru dolní čelisti.
- **6. února 1847** podal první éterovou anestezii v Čechách mnich bratr Celestýn Opitz v nemocnici milosrdných bratří sv. Jana z Boha v Praze na Františku.


Současnost anestezie ve FNUSA



Vývoj počtu anestezíí




2001



2008

Cena farmak v anestezii [suma lékárny / počet anestezí]



Slovník

- 
- analgezie = odstranění bolesti
 - sedace = zklidnění odporu / neklidu pacienta
 - analgosedace
-
- anestezie = znecitlivění, zbavení bolesti (a vědomí)
 - celková (TIVA, inhalační, doplňovaná)
 - regionální
 - kombinovaná



Celková anestezie:

- dočasné vyřazení mozkových bb. z normální činnosti (vnímání a reflexy)
- uměle vytvořené, ŘÍZENÉ, zvratné koma

Fáze CA:

- předoperační vyšetření
 - premedikace
 - úvod do anestezie
 - udržovací fáze
 - vyvedení z anestezie
 - pooperační péče
-

Předoperační vyšetření

- Anamnéza, fyzikální vyšetření

- d. cesty (OTI)
- kardiovaskulární rizika.

- Laboratorní vyšetření:

- KO(Hb), ionty, urea, kreatinin, glykémie, AST, ALT, GMT, bilirubin,
- Krevní skupina

- EKG (zpravidla u pacientů starších 45 let).

- RTG S+P (zpravidla u pacientů starších 60 let).

- Dle potřeby funkční a zátěžová vyšetření
(kardiologické, plicní, nefrologické, hematologické, ...)

Smysl předoperačního vyšetření

- omezení perioperačního rizika
- vyšetření průvodních chorob
+ nastavení optimální léčby

- odhad rizika
- volba anest. postupu
- ordinace premedikace
- vyšetření dýchacích cest



Vyšetření dýchacích cest

● anamnéza:

- byla obtížná intubace?
- bude operován poprvé?

!!! Nezamlčet pac. obtíže, kt. se staly během anestezie!!!


● Pohled:

- možnost otevření úst (3 prsty)
- volné kariézní zuby
- gotické patro
- velký jazyk, malá ústa
- hypoplastická dolní čelist,
- antepozice hrtanu = mandibula-jazylka <3prsty
- flexe, extenze hlavy
- Mallanpati

Mallanpati

OTI snadno

OTI obtížná



Očekávaná obtížná intubace:

- MP III a IV
 - epiglotitida
 - absces (submandibulární, retrofaryngeální)
 - tetanus
 - trauma krku, úst
 - tumory laryngu, faryngu
 - onemocnění temporomandibulárního kloubu
 - obezita
-
-

Kardiovaskulární rizika

- Klidové, zátěžové EKG
- ECHO, (katetrizace AP)
- hypertenze (vzestup TK, srdeční práce, srdeční nedostatečnost)
- ICHS (AP, IM, rytmus)
- Cor pulmonale
- chlopenní vady

Profylaxe:

- Beta blokátory, ponechat antihypertenziva

Respirační riziko

- klidová / zátěžová dušnost
- spirometrie, krevní plyny
- COPD
- Astma
- chronická bronchitida



Další rizika

- Diabetes mellitus
- Jaterní onemocnění
 - porfyrie
 - selhání
- Onemocnění ledvin
- Onemocnění CNS
 - epilepsie
 - ICP

Riziko anestezie - mortalita

- Trend zvyšování bezpečnosti => klesá tolerance společnosti k anesteziologickým komplikacím

Letalita v anestezii:

- 1952 1 : 2 000 (Beecher, 1954)
- 1982 1 : 10 000 (NCEPOD 1987)
- 2001 1 : 50 000 – 220 000 (Brown, 2002)

- Riziko úmrtí při leteckém neštěstí 1: 755 000 (1997)

Příčiny úmrtí

- hypoxémie při poruše dýchání / UPV / intubace do jícnu
- oběhová nestabilita
- vdechnutí / zatečení gastrického obsahu do plic
- předávkování léky
- anafylaxe, interakce farmak

!!! Velkému počtu (60%) úmrtí šlo zabránit !!!

American Society of Anesthesists

	7D mortalita
I normální, zdravý pac	0,06%
II lehké celkové onemocnění	0,47%
III těžké, závažné celkové onemocnění, choroba s omezením funkční výkonnosti	4,39%
IV těžké onemocnění, choroba ohrožuje život pacienta, at' se podrobí operaci či nikoli	23,48%
V moribundní pac, lze očekávat smrt do 24h, at' se podrobní operaci či nikoli	50,77%
E.... Označení neodkladných výkonů	

Předoperační pohovor s pacientem

Cíl:

- informovat o možných způsobech anestezie
 - získat poučený souhlas s A. postupem
 - rozptýlit nadměrné obavy
-
- Dotazník před anestezíí
 - Souhlas pacienta s anestezíí



Premedikace

cíl: klidný, spolupracující pacient

anxiolýza = medikamentózní zmírnění strachu a rozrušení před operací

- Usnadnění úvodu do anestezie
- Snižuje spotřebu anestetik
- Používané léky: benzodiazepiny, antihistamínika, analgetika.
- Anticholinergika (atropin i.m.) – již 15 let NE
- Zpravidla p.o. v předvečer a ráno před operací.
př: Diazepam 0,1 mg/kg p.os

Zásady předoperačního lačnění

Dospělý:

- 24 h nekouřit
- 6-8 h před výkonem nejíst
- 4 h nepít (2h před výkonem zapít ranní med.)

Kojenec:

- 4h kojení
- 2h tekutiny p.os

Ideální anestetikum

- dočasné vyřazení mozkových bb.
 - bez vlivu na kardiovaskulární a dýchací systém
 - bezpečné, levné, netoxické, ...
-
- neexistuje

Optimální anestezie – KV stabilita

- frekvence 50..90/min
- STK max 115% výchozího
- DTK vyšší než 60 mmHg = perfuze myokardu
- PAOP < 12 mmHg
- zabránit anemii a hypovolémii

Na OS ověřit:

- kontrola anest. přístroje
- totožnost
- výkon a strana
- alergie
- dokumentace (doplňěna, souhlas s A)
- žilní vstup
- monitorace pacienta




Anesteziologický přístroj

- podání O₂/AIR/N₂O, inhalačních anestetik
 - zajištění ventilace, monitorace
1. High pressure system
 2. Low pressure system - směs plynů, inhalační anestetikum
 3. Breathing circuit - vdech, výdech část
 4. Ventilation systems (manual and mechanical)
 5. Scavenging system - odtah anest.plynů



Části anest. přístroje



Základní monitorace

Hloubka anestezie, oběh, dýchání, teplota

- EKG
- SpO₂
- NIBP
- teplota
- tlak v dýchacích cestách, vydechovaný objem

Nedostatečné sledování
je nejčastější příčinou úmrtí při anestezii.

16:59



Adult	cmH ₂ O	m ₁
Ppeak	20	TVinsp 560
Pplat	19	TVexp 450
Pmean	15	1/min
PEEPe	8	MVinsp 10.3
PEEPi	---	MVexp 10.6

Compl 36 ml/cmH₂O
Raw 6 cmH₂O/1/s

C.O. PCWP
1/min mmHg

7.09 13

C.I. PGMP Pg002

17/11 h/m² mmHg kPa P(g-Et)₀
3.53 13 7.6 3.5
15:50 15:48 0 10 ml/min

		ECG	RR
H	R	80	/min
S	O ₂	95	
A	r	(88)	120/71
P	A	(30)	44/23
C	V	(110)	110/109
C	O ₂	4.3	F102 64%
		RR	16 /min
		Tblood	
CO ₂	°C	38.7	

Monitor



Ventilátor



Ideální monitorace







Rozšířená monitorace

- Invazivní TK (MAP, b-to-b)
- CVP; (plicnice)
- analýza dýchacích plynů (O₂, N₂O, anestetikum)
- kapnometrie, kapnografie
- spirometrie
- hodinová diuréza
- relaxometr

Kapnometrie *EtCO₂*

Analýza vydechovaného vzduchu:

- EtCO₂ odráží PaCO₂
- hodnocení ventilace
- intubace do jícnu



Anesteziologický stolek

- zajištění dýchacích cest
- zajištění žilních vstupů
- léky i.v., spray
- infuzní roztoky



Úvod do CA

1 – 3 léky i.v. =

- v letálních dávkách
- nejúčinnější aplikační cestou

=> vyřazena sebekontrola, schopnost přivolat si pomoc, utlumeny vitální autoregulační mechanizmy (na dokonalou reziduální funkci pak už plně spoléháme)

- demaskovány dosud kompenzované poruchy (hypovolemie, hraniční dýchání, ..)



Úvod do CA

- 30 až 60s z bdělého stavu vitálně závislý na anesteziologovi
- Situace, kdy se může zásadně rozhodovat o dalším životě pacienta.

P.S. K tomu všemu dal svým podpisem „poučený souhlas“ .

Změny preferencí i.v. úvodu

- + Propofol: nižší nevolnost, menší bolest při aplikaci,
↓↓ cena
- Thiopental: kardiodepresivní, delší odeznívání,
bolestivá aplikace, stále stejně „drahý“



Zajištění DC



- záklon hlavy + obličejovalá maska
 - laryngeální maska
 - Orotracheální intubace, nasotracheální intubace
-
- Cricothyreotomie
 - Tracheotomie - operační, punkční technikou

Obličejobá maska



© Elsevier Science 2005






© Elsevier Science 2005

Laryngeal Mask



Intubation

Straight Blade Placement



Úvod do CA s plným žaludkem

= CRUSH = Rapid Sequence of Induction

= rychlý úvod do anestezie

- vysoké riziko regurgitace žaludečního obsahu do d.c.-plic

regurgitace = díky hladké svalovině žaludku;
selhání cardie; zvýšený intragastrický tlak



Prevence regurgitace


- lačnění (2h tekutiny, 4h m.mléko, 6h strava)
- NG sonda před výkonem zavést, odsát, vytáhnout.
- citrát p.os = neutralizace
- (omeprazol = méně kyselá sekrece)
- (prokinetika)

RSI - indikace

- urgentní operace
- obézní
- těhotné
- diabetici s gastroparézou
- NPB (ileus)




RSI



- pomůcky – odsávačka + Sellickův manévr tlak na prstencovou chrupavku
- i.v. přístup
- preoxygenace
- i.v. úvod – hypnotikum a HNED SCHJ (1,5mg/kg)
- tlak na prstencovou chrupavku
- NEventiluj
- nástup SCHJ – OTI, nafouknout balónek,
- pustit tlak na prstencovou chrupavku
- (Nejdéle li OTI – ventilační + tlak trvá)



Obtíže s ventilací / intubací – kdy vzniknou?

Timeline of Airway Events



Reference: *Management of the Difficult Airway in Closed Malpractice Claims*
By Peterson et al. (University of Washington)

Where is the Cric Membrane ?




Surgical Airway & Anesthesiologists Practical Issues

- Quickly and effectively localizing the Cricothyroid membrane
 - Can be difficult in a struggling patient.
 - Obesity and short necks
- Not being familiar with the Cricothyrotomy equipment available
- Can you do a lifesaving cricothyrotomy in 90 seconds !!!!



Schéma celkové anestezie-doplňované



Vedení anestezie

- monitorace a udržování životních funkcí
- očekávané chirurgické stimuly

i.v.:

- opiáty
- infuze
- sympathomimetika

změna koncentrace inhalačního anestetika



Intravenozní anestetika



- Propofol
- Barbituráty: Thiopental
- Etomidat
- Ketamin
- Opiáty: Fentanyl, Alfentanyl, **Sufentanyl**
Remifentynyl, Morphin
- Benzodiazepiny: Diazepam, Midazolam,
- Neuroleptika: Dehydrobenzperidol

Svalová relaxancia


- usnadňují intubaci, UPV, usnadňují či umožňují práci chirurga.
- nejsou vždy nezbytná
- místo účinku - nervosvalová ploténka
- historicky používané jihoamerickými indiány
- do medicínské praxe zavedeny 1942
- depolarizující - succinylcholinjodid
- nedepolarizující - Pancuronium, Vecuronium, Atracurium, Rocuronium,...

Relaxancia

cca 12500 „dávek“



2001



2008

Inhalační anestetika



- (Halotan), Isofluran, Sevofluran, Desfluran
- aplikace pomocí speciálních odpařovačů
- vstupní branou jsou plíce, hlavním místem účinku je mozek, šíří se ve směru gradientu parciálních tlaků.



Spotřeba inhal. anestetik FNUSA

[litrů / rok]

- Obměna anesteziologických přístrojů 2005
(low flow anestezie)
- Halothan: hepatitida, kardiodepresivní ... Zentiva nevyrábí



Maligní hypertermie

- život ohrožujících komplikace celkové anestezie
- „farmakogenetické“ autozomálně dominantní onemocnění = po expozici tzv. vyvolávajícím substancím (volatilní anestetika a sukcinylcholin)
- Projevy:
 - hypermetabolický stav svalové tkáně, - příčinou je porucha regulace metabolismu kalcia ve svalové buňce s nadprodukcí metabolitů, zejména CO₂, laktátu a tepla.

Vyvedení z anestezie

Podmínky:

- ukončen operační výkon
- není známk chirurgického krvácení
- stabilní ABC
 - dýchací cesty nejsou ohroženy otokem
 - normální tělesná teplota
 - normální vědomí před výkonem
- obnovena svalová síla
- vydýchána inhalační anestetika
- i.v. metabolizována / redistribuce / exkrece

Pooperační péče

Překlad

- standardní oddělení
- JIP, ARO

Monitorace dle rozsahu operačního výkonu,
kontrolní laboratorní vyšetření

Léčba akutní bolesti, PONV,
Infúzní terapie, korekce vnitřního prostředí, KO,
koagulačních parametrů.



Pooperační bolest dospělých

- paracetamol 1000mg i.v. á 6-8 hodin
- Dipidolor (piritramid) i.v./i.m.; tramadol;
- morfin 10mg i.v. / s.c. (nástup 5/15 min) á 4h; zvyšovat o 5-10mg;
- Sufenta kontinuálně (5-10 ug/h i.v.)
POZOR NAý ú...m.

Analgetika je nezbytné podávat

- v dostatečném množství,
- dostatečně dlouho
- v časových intervalech odpovídajících biologickému poločasu.

regionální
anestezie

Pooperační nevolnost a zvracení


(P_{OST}O_{PERATIVE}N_{AUSEA AND V_{OMITING}})

Příčina multifaktoriální:

- chemoreceptory – anestetika, bolest, hypovolemie
- operace – chirurg
 - Gyn
 - ORL
 - Strabismus
 - Prso
 - Laparoscopy/Laparotomy
 - Craniotomy

Def:

- Nausea – subjektivní pocit potřeby zvracet.
- Zvracení – usilovné vypuzení žaludečního obsahu ústv.



Léčba PONV:

- 5-HT3 receptor antagonists – Ondansetron
- Dopamine antagonists
 - (droperidol)
 - Torecan (thiethylperazinum) - antivertiginosum
 - Degan (metoklopramid) – prokinetikum + ..
- Anticholinergic – Atropin – blokáda n. X.
- Antihistamines – Prothazin (promethazine) - premed.
- kortikoid – Dexamethasone

Prevence:

- bez N₂O

Doporučené webové stránky

- www.gasnet.org
- <http://www.virtual-anaesthesia-textbook.com/>
- www.mhinfo.cz

Virtual Anesthesia Machine:

- <http://www.anest.ufl.edu/vam/>
- nebo
- www.simanest.org





je pátek - čas jít domu...