

Adenomyoza je endometrióza:

- cervikálních žláz
- ovaria
- myometria
- sakrouterinných vazů

Adnexitumor je:

- benigní nádor ovaria s převahou kolagenní složky
- adnexa změněná aktinoterapií
- forma adenokarcinomu ovaria
- zánětlivé spojení vejcovodu s vaječníkem v objemný konvolut

Adrenogenitální syndrom:

- je pseudohermafroditismus femininus
- je způsoben defektem 21-hydroxylázy
- maskulinizace genitálu se hodnotí podle Navota
- bývá spojen s chromozomální aberací

- je pseudohermafroditismus masculinus
- je způsoben defektem 17-aromatázy
- maskulinizace genitálu se hodnotí podle Pradera
- bývá spojen s chromozomální aberací

- je pseudohermafroditismus femininus
- je způsoben defektem 21-hydroxylázy
- maskulinizace genitálu se hodnotí podle Pradera
- nebývá spojen s chromozomální aberací

Aktinomykosu léčíme nejčastěji:

- antimykotiky
- blokádou danazolem alespoň po 3 měsíce
- penicilinem
- chemoterapií

Aktivin:

- je steroid
- stimuluje sekreci FSH
- je chemicky příbuzný inhibinu
- je produkován buňkami granulózy

- patří mezi tumormarkery
- stimuluje sekreci FSH
- v kostní dřeni ovlivňuje vývoj leukocytů
- je produkován thekálními buňkami

- je sekernován do folikulární tekutiny
- stimuluje sekreci FSH
- v kostní dřeni ovlivňuje vývoj leukocytů
- se skládá z podjednotek alfa a beta

Analogu gonadoliberinu v protokolu stimulace ovarií mají:

- snižovat hladinu LH
- snížit hladinu prolactinu
- zvýšit receptivity endometria
- snížit riziko předčasné maturace oocytů

snížit spotřebu FSH
zvýšit hladinu LH
bránit předčasnému peaku LH
snížit hladinu FSH

Androgeny jsou odvozeny od androstanu, který má:

- 17 uhlíků
- 18 uhlíků
- 19 uhlíků
- 21 uhlíků

Arteria uterina:

odstupuje z a. iliaca interna
odstupuje z a. iliaca communis
prochází dorsálně od ureteru
prochází ventrálně od ureteru

Athelia je:

chybění mléčné žlázy bradavky
chybění ovaríí
chybění bradavky
chybění axilárního ochlupení

Azoospermie je:

počet spermíí v ejakulátu nižší než 40 mil/ml.
chybění ejakulátu
v ejakulátu chybějí spermie
jsou nepohyblivé spermie

Barrovo tělíska je:

chromatinové tělíska pod membránou jádra mužské buňky
fluoreskující tělíska, které vzniká přeměnou dlouhého raménka Y chromozomu
chromatinové tělíska pod membránou jádra ženské buňky
součást šroubovnice DNA

Bartholiniho žlázy jsou:

glandulae vestibularers minores
glandulae vastibularers maiores
bulbus vestibuli
duplicatura hymenu

Během užívání kombinované hormonální kontracepce je nutné provádět následující laboratorní vyšetření:

krevní obraz
jaterní testy
koagulace
žádné

Cervikální blebsy může způsobit:

porodní trauma
HPV infekce "high risk" kmeny
chronická gonorrhoea
endometriosa

Cetrorelix je:

superagonista GnRH
analog GnRH
selektivní antagonista GnRH
používán ve stimulačních protokolech IVF

Cílem podávání GnRH antagonistů při kontrolované ovariální hyperstimulaci je:

- zvýšit koncentraci FSH a LH
- zabránit předčasnemu peaku LH
- zvýšit koncentraci estradiolu
- zvýšit počet rostoucích folikulů

Co je Verresova jehla:

- nástroj na laparoskopickou punkci cysty
- nástroj na odsávání obsahu cavum Douglasi
- nástroj na koagulaci ložisek endometriózy
- nástroj na vytvoření pneumoperitonea

Collinsova zkouška slouží:

- k detekci patologického ložiska vulvy
- k detekci patologického ložiska pochvy
- k detekci HPV infekce exocervixu
- k detekci HPV infekce endocervixu

Columnae rugarum jsou:

- vazivové snopce mezi pochvou a močovým mechýrem
- Baze Douglasova prostoru vytvářející zadní klenbu poševní
- poševní příčné slizniční rasy
- vazivní pruhy v parakolpiu

Condylomata accuminata jsou vyvolána:

- luetickou infekcí
- difterií vulvy
- spálovou vulvitis
- HPV virozou

Délka hlavičky spermie je:

- 40 - 60 um
- 15 – 20 um
- 4 – 5 um
- 1 – 2 um

Děložní myomatóza je onemocnění vyvolané:

- četnými graviditami
- opakoványmi záněty
- relativním hyperestrinismem
- primární dysmenorrhoeou

Do obrazu syndromu polycystických ovarií (PCO) nepatří:

- akné
- oligo až amenorrhoea
- sterilita
- nadměrná výška

Döderleinův laktobacil:

vytváří kyselinu mléčnou
fagocytuje patogenní mikroorganismy
mechanicky brání vstupu infekce do hrdla
gramnegativní tyčka

Druhé pólové tělíska se z oocytu vyloučí:

vždy 36 hodin po ovulaci
po oplození
před oplozením
při pre-ovulačním peaku LH

Dysfunkční krvácení je způsobeno:

nadbytkem gestagenu
nadbytkem estrogenů
nadbytkem androgenů
děložní myomatozou

Endometritis vzniká po:

nitroděložních výkonech
zánětech parametria
častých dysmenorrhoeách
průniku STD

Estradiol:

stimuluje růst alveolární složky prsu
stimuluje růst duktální složky prsu
stimuluje růst tukové tkáně prsu
zvyšuje tlak v mlékovodech

Estrogenový test provádíme:

při negativním progesteronovém testu
při pozitivním progesteronovém testu
při negativním metoklopramidovém testu
při pozitivním metoklopramidovém testu

Estrogeny jsou

C-21 steroidy
C-18 steroidy
C-19 steroidy
nejsou steroidy

Fimbriae tubae se nachází v:

Pars interstitialis tubae
Infundibulum tubae
Pars isthmica tubae
Pars ampullaris tubae

Fitz-Hugh-Curtisův syndrom charakterizuje:

mezikličkový absces
intrauterinní synechie
perisalpingoophoritis
perihepatální adheze

Fixovaná retroverze děložní provází:

ulcerozní kolitis
endometriózu sakrouterinných vazů
ovariální cysty
chronický pánevní zánět

Folikulární cysty vznikají jako následek:

hyperstimulace LH
hypersekrece estrogenu
hyperstimulace FSH
autonomne

Ganirelix je:

superagonista GnRh
analog GnRH
selektivní antagonist GnRH
používán ve stimulačních protokolech IVF

Genitální tuberkulosa postihuje nejčastěji:

endometrium
vejcovody
cavum Douglasi
parametria

Gestageny jsou produkované:

žlutým tělkem
varletem
placentou
nadledvinkami

Herzfeldův příznak:

je bolestivost svalů Michaelisovy routy
bývá při mimoděložním těhotenství
jsou rektální tenesmy
je nucený na močení

je bolestivost svalů Michaelisovy routy
je bolest vystřelující do ramene
jsou rektální tenesmy
je nucený na močení

Hormonální novorozenecká krize je:

hyperplasie nadledvinek ve spojení s porodem
perzistující karence plícního surfaktantu u nedonošených dětí
poporodní atrezie primordiálních folikulu ovaria
působení mateřských placentárních hormonů na estrogen dependentní tkáně

Hraniční koncentrace spermí při normospermii je:

> 20 mil/ml
> 25 mil/ml
> 50 mil/ml
> 100 mil/ml

Hrma je:

vyklenutí zadní poševní stěny
Sulcus nympholabialis
perineální mons veneris
ventrální část zevních rodidel nad stydkou sponou

Hymen cribriformis je:

- kruhovitá panenská blána
- panenská blána sagitálně přepažena septem
- tuhá kožovitá panenská blána
- panenská blána s několika otvory

Hysterosalpingografie je metoda používaná při:

- diagnostice sterility
- diagnostice ovariálních tumorů
- diagnostice adenomyózy
- diagnostice vrozených vývojových vad dělohy

Inhibin:

- tvorba je stimulována FSH a LH
- je steroid
- dosahuje maximálních hladin v časném těhotenství
- je tvořen v buňkách thekálních
- je steroid
- se skládá z podjednotek alfa a beta
- dosahuje maximálních hladin při deskvamaci endometria
- je tvořen v buňkách granulózy
- dosahuje maximálních hladin v luteální fázi
- se skládá z podjednotek alfa a beta
- tvorba je stimulována FSH
- je tvořen v buňkách granulózy
- tvorba je stimulována LH
- se skládá z podjednotek alfa a beta
- dosahuje maximálních hladin v luteální fázi
- je tvořen v buňkách thekálních

Jaké jsou příznaky urgentní inkontinence:

- polakisurie
- nykturie
- dysurie
- oligurie

K superagonistům GnRH používaným ve stimulačních protokolech IVF patří:

- sumatriptan
- nafarelin
- tibolon
- ganirelix
- triptorelin
- leuprorelin
- clomifén
- tamoxifén
- triptorelin
- buserelin
- nafarelin
- tamoxifén

Kapacitace je:

získání schopnosti aktivního pohybu bičíku
diferenciace haploidní spermie
oddělení bičíku a osmotické zvětšení objemu hlavičky
destabilizace membrány spermie

Ke III. generaci gestagenů patří:

levonorgestrel

norethisteron

dydrogesteron

gestoden

levonorgestrel

desogestrel

norgestimát

gestoden

desogestrel

norgestimát

ciproteronacetát

dydrogesteron

Kmenová buňka, ze které se postupně vytváří spermie, se nazývá:

spermatida

spermatozoon

spermatogonie

spermatocyt

Kolpexin je:

toxin detekovaný při aminokolpitis

bariérová antikoncepcie

pomůcka pro gymnastiku pánevního dna

nástroj pro odběr knips – biopsie

Kombinovanou hormonální antikoncepcí je u zdravé ženy nekuřáčky možno doporučit do:

35 let

45 let

50 let

nástupu menopauzy

Kryptomenorrhoea je příznak provázející:

Mayerův Rokitanského Kusterův Hauserův syndrom

Atrezia hymenalis

Turnerův syndrom

hypoplazie pochvy

Kultivace oocytů a následně embryí in vitro může probíhat maximálně:

48 hod

72 hod

120 hod

nezadáno

Kurcrok-Millerův test:

je synonymum pro postcoitální test

sleduje průnik spermií do cervikálního hlenu

je indikován až po Kremerově testu

doplňuje vyšetření inkontinence

Léčba kolpitis senilis je:

separovaná abraze
lokální aplikace estrogenu
výplachy KMnO₄
pulzní diatermie

Léčba stresové inkontinence je:

rehabilitační
redukce tělesné váhy
závěsná korekce vezikouretrální junkce
aplikace adiuretik

Lékové skupiny uplatňující se v léčbě močové inkontinence jsou:

parasympatolytika
spasmolytika
antidepresiva
estrogeny

Lenanderův příznak je:

bolest v ileocaekální krajině po otočení pacientky na pravý bok
bolelivost v ileocaekální krajině po poklepu na levou hranu děložní
známka odloučení placenty
rozdíl axilární a rektální teploty

Luteální insuficience je:

relativní nedostatek estrogenu
nedostatečná produkce progesteronu
peristující neprasklý Graafuv folikl
placentární hypofunkce

Maximální doporučený počet transferovaných embryí v ČR:

2
1
3
4

Menopauza je:

poslední menstruační krvácení řízené ovariálními steroidy
období po ukončení pravidelného menstruačního krvácení
vazomotorické návaly horka
psychické změny v klimakteriu

Menstruační krev se nesráží pro příměs:

Tryptofamu
Transmethylu
Trimethylaminu
Triglyceridu

Mezi gestageny tzv. 3. generace nepatří:

norgestimát
lynesternol
gestoden
desogestrel

Mezi metody asistované reprodukce nepatří:

intrauterinní inseminace

IVF + ET

klínovitá resekce ovarií

MESA, TESE

Mezi negativní kolposkopické nálezy patří:

políčkování

pásмо epitheliální přeměny

leukoplakie

ektropium

Mezi STD nepatří:

Herpes virus hominis /HVH/

Trichomoniasis

Hepatitis B

Infekce candida albicans

Mezi urodyynamické vyšetřovací metody patří:

uretrocystografie

cystometrie

uroflowmetrie

vylučovací urografie

Mola hydatidóza se diagnostikuje:

histologickým vyšetřením materiálu získaného kyretáží

ultrazvukovým vyšetřením obsahu dutiny děložní

dynamickým sledováním hladin hCG

dynamickým sledováním hladin progesteronu

Myelanův příznak:

je bolestivost svalů Michaelisovy routy

je bolest vystřelující do ramene

jsou rektální tenesmy

je nucení na močení

je bolestivost svalů Michaelisovy routy

bývá při HELLP syndromu

jsou rektální tenesmy

bývá při mimoděložním těhotenství

Na cévním zásobení pochvy se podílí především:

a. uterina

a. ilica externa

a. rectalis media

a. labialis

Na cévním zásobení pochvy se podílí především:

a. pudenda interna

a. uterina

a. rectalis media

a. labialis

Nejčastěji používané operační techniky v léčbě stresové inkontinence jsou:

uretropexe

kolposuspense

kolporrhaphia anterior et kolpopérineoplastika

Labhartova operace

Nejčastější gynekologická onemocnění dětského věku jsou:

- ovariální cysty
- poranění genitálu
- cizí tělesa v pochvě
- vulvovaginitis

Nejnižší viskozita cervikálního hlenu je v období:

- proliferačním
- ovulačním
- sekrecním
- menstruačním

Odběry krve na stanovení hladiny prolactinu se provádějí:

- na lačno
- minimálně 2 hodiny po probuzení
- po větší tělesné zátěži
- po vypití alespoň 0,5 litru tekutin

Oehleckerův příznak:

- je bolestivost svalů Michaelisovy routy
- je bolest vystřelující do ramene
- bývá při předčasném porodu
- bývá při dolores praesagientes

- je součástí syndromu mrtvého plodu
- bývá při preeclampsii
- je součástí premenstruačního syndromu
- bývá při mimoděložním těhotenství

- je bolestivost svalů Michaelisovy routy
- je bolest vystřelující do ramene
- jsou rektální tenesmy
- je nucení na močení

Operačnímu hysteroskopu se vžilo jiné pojmenování:

- fertiloskop
- resektoskop
- disektor
- hysteromat

Parakolpium je:

- svalovina poševní
- introitus vaginae
- vazivo obklopující pochvu
- postranní klenby poševní

Patologická amenorrhoea je nejčastěji původu:

- suprahypothalamického
- hypothalamohypofyzárního
- ovariálního
- uterinního

Pearlův index nitroděložního tělíska se udává přibližně:

- 0,1 – 0,3
- 0,8 – 3
- 4,5 – 5,0
- 7,0 – 20

Polymastia se nejčastěji vyskytuje v:

- pupku
- inguine
- axile
- submamární rýze

Poměr hrdla a těla v seniu je:

- 1:1
- 2:1
- 1:2
- 1:3

Pravidelné intermenstruační krvácení je spojeno s:

- ovulací
- nadprodukci gestagenu
- syndromem polycystických ledvin
- dysmenorrheou

Primární dysmenorrhoea je vyvolána nejčastěji:

- Hyperprodukci endometriálních prostaglandinů
- Hyperfunkci žlutého tělska
- Anorexií dospívajících dívek
- Cervikální stenozou

Pro alfa-receptory sympatiku platí:

- jsou lokalizovány především ve stěně močového měchýře
- jsou lokalizovány především v hrdle močového měchýře a uretře
- stimulace vede k mikci
- stimulace vede k dilataci měchýře

Pro beta-receptory sympathiku platí:

- jsou lokalizovány především ve stěně močového měchýře
- jsou lokalizovány především v hrdle močového měchýře a uretře
- stimulace vede k relaxaci močového měchýře
- stimulace vede k mikci

Pro kombinovanou hormonální antikoncepci platí:

- snižuje riziko karcinomu endometria a ovaria
- snižuje riziko preeklampsie
- zvyšuje hodnoty jaterních transamináz
- snižuje výskyt mastopatií

- snižuje krevní ztráty při menses
- riziko trombembolie je vyšší než v těhotenství
- zlepšuje akné
- zvyšuje riziko ektopické gravidity

Pro močovou kontinenci je důležitá správná funkce:

- ligamenta pubourethralia
- ligamenta Cooperi
- musculus levator ani
- ligamenta sacrouterina

Progesteron:

stimuluje růst alveolární složky prsu
stimuluje růst duktální složky prsu
stimuluje růst tukové tkáně prsu
zvyšuje tlak v mlékovodech

První dítě po metodě GIFT na světě se narodilo:

v 1982 na Gyn.-por klinice Obilní trh v Brně
v 1985 na Gyn.-por klinice Obilní trh v Brně
v 1978 ve Velké Británii v Bourn Hall
v 1980 v Bruselu v Belgii

První znak puberty u dívky je:

růst prsu
menarché
adrenarché
zmena poševního pH

Při diagnostice močové inkontinence používáme test:

Burchův
Stameyův
Marshallův
Bonneyho

Při jakém objemu residuální moči není nutno nadále drenovat měchýř po závěsné operaci:

300 ml
200 - 300 ml
100 - 200 ml
100 ml a méně

Při kolpitis se pH pochvy:

okyseluje
je neutrální
nemění se
alkalizuje se

Při metodě GIFT se provádí:

aplikace spermíí pod zonu pellucidu
přenos spermie a vajíčka do vejcovodu
přenos embrya do vejcovodu
protnutí zona pellucida

Při prolapsu u starých žen vzniká:

dekubitální vřed
krvácení z endometria
karcinom pochvy
hyperplazie endometria

Při terapii stressové inkontinence se používá:

gymnastika pánevního dna
alfa-sympatomimetika
kolpopexe
uretropexe

Při terapii urgentní inkontinence se používá:

léčba infekce močových cest

parasympatolytika

uretropexe

beta-sympatomimetika

Pseudocyesis je syndromem:

zvýšené pigmentace v těhotenství

zdánlivého těhotenství

poporodní amenorey

hypertrichózy

Pyometra vzniká nejčastěji:

v pubertě

v šestinedělích

v klimakteriu

v seniu

Revize dutiny děložní je:

odstranění sliznice dutiny děložní při dysfunkční metrorragii

umělé ukončení těhotenství

odstranění zbytku plodového vejce po samovolném potratu

verifikace podezření na adenokarcinom endometria

Růst pubického ochlupení je vyvolán:

estrogeny

progesteronem

FSH

androgeny

Sactosalpinx je:

vejcovod naplněný hnismem

vejcovod naplněný krví

vejcovod naplněný serózní tekutinou

vejcovod s ektopickou graviditou

Salpingitis isthmica nodosa může být způsobena:

endometriozou

tuberkulozou

chlamydiemi

gonorrhoeou

Samovyšetření prsů ve fertilním věku se provádí v:

období menstruace

období proliferačním

dobe ovulace

období sekrečním

Solovjevův příznak bývá přítomen při:

krevních koagulech v Douglasově prostoru

aktinomykoze parametrií

urgentní inkontinenci

stresové inkontinenci

Steroidní buňky ovaria vznikají vývojově z:

gonocytů
Mullerova vývodu
coelomového epitelu
ze všech uvedených

Syndrom Rokitanského - Küsterův:

u ženy jsou ovaria normálně vyvinuta
u ženy nejsou vyvinuty vejcovody
u ženy není vyvinuta děloha
u ženy není vyvinuta pochva

u ženy nejsou vyvinuty vejcovody
u ženy není vyvinuta děloha
bývá zdvojená pochva
hladiny estrogenů v krvi bývají v normě

u ženy nejsou vyvinuta ovaria
u ženy není vyvinuta pochva
bývá hematometra
bývá hirsutismus

Syndrom testikulární feminizace:

je pseudohermafroditismus femininus
děloha nebývá vyvinuta
nejsou vyvinuty receptory pro estrogeny
bývá hirsutismus

je pseudohermafroditismus masculinus
pochva bývá částečně vyvinuta
nejsou vyvinuty receptory pro androgeny
není vyvinuto axilární ochlupení

je pseudohermafroditismus masculinus
děloha bývá vyvinuta
nejsou vyvinuty receptory pro androgeny
není vyvinuto axilární ochlupení

Syndrom toxického šoku:

vyvolávají anaerobní bakterie
je multifunkční toxicke postižení organismu
je charakterizován hněavým poševním zánětem, bolestí hlavy a kožním erytémem
je vyvolán infekcí E. coli

Telarché je:

psychogenní ovlivnění menstruačního cyklu
autonomní růst ovariálních folikulů
proliferace endometria v pubertě
pubertální růst prsu

Torze adnex je spojena s:

metrorrhagii
výraznou bolestivostí
peritoneálními příznaky
selháním ledvin

Tubercula Morgagni se nacházejí:

na vulvě
v pochvě
na zevní porci čípku
na bradavce

Turnerův syndrom má karyotyp:

- 46, XX
- 47, XXX
- 47, XXY
- 45, X0

Typické symptomy urgentní inkontinence jsou:

- polakisurie
- dysurie
- nykturie
- Burchovo znamení

U kuřáků bylo prokázáno zhoršení parametrů spermiogramu o:

- 15 – 20 %
- 25 – 30 %
- 35 – 40 %
- 45 – 50 %

U kterých endoskopických metod je využíván přístup do břišní dutiny zadní poševní klenbou:

- laparoskopie
- hysteroskopie
- kuldoskopie
- transvaginální hydrolaparoskopie (THL)

Uretrocystokele je:

- everze sliznice uretry a močového mechýře
- kongenitální divertikl uretrovezikální junkce
- sestup přední stěny poševní
- typ močové inkontinence

Uretropexe je:

- operace pro stresovou inkontinenci moči
- operace stenosy uretry
- operace pro urgentní inkontinenci moči
- korekční operace rektokole

Uretrovesikální junkce je:

- místo spojení močové trubice a m. měchýře
- jednotka měření tlaku v močovém měchýři
- část urodynamické jednotky
- operační výkon na spodině močového měchýře

Urgentní inkontinence je:

- samovolný odtok malého množství moči z přeplněného močového měchýře
- občasný únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku
- bezděčné pomočování bez předcházejícího pocitu nucení k močení
- nechtěné vyprázdnění močového měchýře po imperativním pocitu nucení k močení

Uroflowmetrie je:

vyhodnocení průtoku moči
vyšetřovací metoda na stenosu uretry
vyhodnocení tlaku v uretře
měření v ureteru

Uterus arcuatus je:

deprese děložního fundu
hyperanteverze flexe dělohy
hypertrofie děložní svaloviny
chybění jednoho děložního rohu

Vagina se vyvíjí z:

Kloaky
Mullerových vývodů a urogenitálního sinu
Wolfova vývodu
Ductus Gártneri

Vaginismus je:

křec musculus ischio cavernosus
kontrakce musculus bulbocavernosus
psychosomatická porucha
chronický zánět pochvy

Vývoj prsu v pubertě se klasifikuje podle:

Montgomeryho
Tannera
Mullera
Riedingera

Yuspeho metoda se uplatňuje při:

relaxaci detruzoru močového měchýře
stimulaci ovulace
intercepcí
urethropexi

Za 1 měsíc se v ovariu dospělé ženy s funkčním menstruačním cyklem vytvoří přibližně:

100 primordiálních folikulů
10 primordiálních folikulů
1 primordiální folikul
žádný primordiální folikul

Základem pro Collinsonovu zkoušku je:

aplikace 3 % kyseliny octové
aplikace 5 % kyseliny octové
aplikace toluidinové modři
aplikace Lugolova roztoku

Ze kterých buněk není složena hypofýza:

neutrofilní
bazofilní
cosinofilní
chromofobní

Změna přípravku kombinované hormonální antikoncepce:

je doporučena vždy po 2 letech

je doporučena vždy po 3 letech

není nutná

je doporučena po 5 letech

Žloutkový váček by měl být na UZ patrný od:

4. týdne gravidity

5. týdne gravidity

6. týdne gravidity

7. týdne gravidity

