

# Epidemiologie

---

- posuzování **vztahů mezi nemocemi**, jejich **příčinami** a **podmínkami vzniku** → důležitou roli hraje **statistika** – metody na měření vztahu (asociace) mezi sledovanými jevy
  - **Míry rizika** – míry asociace – označují těsnost (sílu) vztahu mezi sledovanými jevy
  - statistické závěry – platí pouze s určitou pravděpodobností!!!
-

# Epidemiologie

---

**Stat. závislost** – není sama důkazem

→ možná vysvětlení:

- Náhoda
- Confounding
- Bias
- Kauzální vztah

některé vztahy se mohou jevit jako kauzální, i když ve skutečnosti nejsou, jde o tzv. **zavádějící faktory - confoundery**

---

# Epidemiologie

---

□ z epidemiologického hlediska → důležité ty faktory, jejichž změna vede ke změně incidence nemoci nebo úmrtnosti

- ZVÝŠENÍ – **rizikové faktory**
  - SNÍŽENÍ – **protektivní faktory**
-

# **Příčiny nemocí a jejich studium (1)**

---

→ nejvýznamnější oblast epidemiologie

**Etiologie** – soubor poznatků o příčinách nemoci

**Patogeneze** – racionální výklad vnitřního fyziologického mechanismu vedoucího od zdraví k nemoci

**Etiopatogeneze** – představuje úzkou návaznost obou procesů

---

# Příčiny nemocí a jejich studium (2)

---

- Studium etiologie a patogeneze jednotlivých nemocí je předmětem zkoumání příslušných lékařských oborů - **epidemiologie speciální**
  
  - Obecné zásady všeobecně použitelné při studiu všech nemocí - **epidemiologie obecná**
-

# Příčiny nemocí a jejich studium (3)

---

složitost biologických a společenských jevů → nutí pozorovat jevy v nejširších souvislostech

- hlavní příčinné agens → určuje kvalitu následku
- vedlejší podmiňující činitelé → určují intenzitu a variace následku

**příčina** + **podmínka** → komplex určujících příčinných faktorů – **determinant jevu**

---

# Příčiny nemocí a jejich studium (4)

---

1. Singularistický přístup: A→B
2. Pluralistický přístup:

Dvě krajní schémata:

- a) Jedna příčina → mnoho následků
- b) Mnoho příčin → jeden následek

**Multifaktoriální koncepce etiologie nemoci** dnes všeobecně přijímána.

Zjednodušující modely:

- osoba – místo – čas
- osoba – etiologický činitel – prostředí
- osoba – znak – nemoc

*Pozn.: závěry zobecňovány až po věrohodném ověření v praxi*

---

# Riziko v epidemiologii (1)

---

= *pravděpodobnost, že nastane nějaký nepříznivý jev, např. že osoba onemocní nebo zemře*

***Riziko X Naděje***

- k hodnocení rizika můžeme využít **matematickou statistiku**
  - Pravděpodobnost se obvykle váže k určitému souboru osob a k vymezenému časovému intervalu
-

# Riziko v epidemiologii (2)

---

**Riziko** - podíl případů, v nichž sledovaný jev nastal, k celkovému počtu případů, v nichž nastat mohl x opak rizika – **naděje**

**Rizikový faktor** → taková vlastnost člověka nebo charakteristika životního prostředí, u kt. bylo zjištěno že přispívá (s urč. pravděpodobností) ke vzniku poruchy zdraví (úmrtí) nebo ke zhoršení zdravotního stavu

**Riziková skupina** → osoby vystavené působení rizikového faktoru, např. osoby s dědičnou zátěží, vystavené nebezpečí infekce, záření, hluku apod.

---

# Měření a srovnávání rizika

---

Porovnat velikost dvou čísel – možno 2  
způsoby:

**podílem** → RR

**rozdílem** → AR



# Míry rizika

---

- a) **Relativní riziko RR** → **podíl** výskytu nemoci nebo úmrtí v souboru exponovaném (rizikovém) k výskytu nemoci nebo úmrtí v souboru neexponovaném (kontrolním).
  - b) **Atributivní riziko AR** → s jakou pravděpodobností onemocní, popřípadě umírají, osoby v důsledku působení výhradně jen rizikového faktoru → **rozdíl** výskytu nemoci nebo úmrtí v souboru rizikovém a v souboru osob, které riziku nebyly vystaveny.
  - c) **Populační atributivní riziko** → viz AR, ale vztaženo na celou populaci
  - d) **Podíl populačního atributivního rizika (frakce)** → udává, v jaké části populace byl výskyt hodnoceného jevu vyvolán rizikovým faktorem
-

## a) Relativní riziko RR (1)

- ukazatel vystihující vztah mezi expozicí rizikovému faktoru a zdravotním následkem, určující míru zjištěné asociace.  
Je vyjádřeno **poměrem incidencí** v exponované a neexponované (kontrolní) skupině kohortové studie, neboli **kolikrát** je vyšší nebo nižší v základním než v kontrolním souboru.
- výsledkem je absolutní číslo, jehož výše odpovídá o síle asociace

incidence následku u exp.osob      Ie

**RR = incidence následku u neexp.osob = In**

$$RR = \frac{\frac{a}{c + d}}{\frac{a + b}{c + d}} = \frac{a}{a + b} * \frac{c + d}{c}$$

## a) Relativní riziko RR (1)

---

- RR>1** ⇒ expozice ***zvyšuje riziko***  
onemocnění resp. úmrtí → **rizikový faktor**
- RR<1** ⇒ sledovaný faktor má naopak  
***ochranný efekt***
- RR=1** ⇒ ***nezávislost***

Čím větší je hodnota RR, tím silnější asociace je prokázána (RR>3 ***silná asociace***, RR>10 ***velmi silná asociace***)

nabývá hodnot: 0 až  $\infty$

Význam při hodnocení etiologie nemocí.

---

## b) Atributivní riziko AR (1)

---

- **absolutní efekt expozice**, neboli **o kolik** je incidence vyšší u exponovaných než u neexponovaných

$$AR = I_e - I_n$$

**ROZDÍL** vyjadřuje absolutní efekt expozice. Umožňuje odhadnout velikost nadbytečných ztrát v důsledku působení rizikového faktoru.

Je tedy mírou rozsahu studovaného zdravotního problému ve skupině exponovaných.

---

## **b) Atributivní riziko AR (2)**

---

Interpretace:

**AR=0**       $\Rightarrow$       *nezávislost*

**AR=1<sub>e</sub>**       $\Rightarrow$       všechny případy nemoci  
lze přičíst sledovanému  
faktoru

**AR<0**       $\Rightarrow$       *ochranný faktor*

---

## c) Populační atributivní riziko PAR

---

obdoba AR, ale vychází z **incidence nemoci v celém souboru, ne pouze v exponované skupině**

$$\text{PAR} = \text{It} - \text{Io}$$

**It** ... incidence jevu **v celé populaci**

**Io** ... incidence jevu **v neexponované části populace**

$$\text{PAR} = p(\text{I}_e - \text{I}_n) = p \times \text{AR}$$

Ize použít, pokud je znám podíl exponovaných v celé populaci (p)

→ uvádí, **kolik případů** (nemoci, komplikace, úmrtí) lze připsat na vrub sledovaného činitele v **celé populaci** (podmínkou je reprezentativní výběr)

---

## d) Podíl atributivního rizika PAF (atributivní frakce)

→ **podíl** případů, které lze přisoudit expozici (lze připsat na vrub rizik.faktoru) → rozdíl mezi výskytem následku u exponovaných a neexponovaných vztažený na incidenci v celé populaci

$$PAF = PAR/It = It - Io / It$$

Pokud známe RR, lze použít:

$$PAF = p(RR-1)/[1+p(RR-1)],$$

kde  $p$  je podíl osob v populaci vystavených riziku

- vztahuje se pouze ke skupině exponovaných!!!
- vyjadřuje se zpravidla v procentech  $PAF \cdot 100 [\%]$

# **Výpočet rizik u prospektivní studie (1)**

---

U prospektivních studií může výpočet rizik vycházet z:

- incidence risk**
  - incidence rate**
  - incidence odds**
-

# Výpočet rizik u prospektivní studie (2)

---

	<b>Nemocní</b>	<b>zdraví</b>	$\Sigma$
<b>Exponovaní (RF)</b>	a	b	a+b
<b>Neexp. (bez RF)</b>	c	d	c+d
$\Sigma$	a+c	b+d	a+b+c+d

---

# Výpočet rizik u prospektivní studie (3)

---

$r_1$  ... pravděpodobnost (riziko), že exponovaná osoba onemocní, odhad  $P(N/E)$

$$r_1 = a/(a+b)$$

$r_0$  ... pravděpodobnost, že onemocná osoba neexponovaná, odhad  $P(N/\text{non}E)$

$$r_0 = c/(c+d)$$

$$RR = r_1 / r_0$$

$$AR = r_1 - r_0$$

Pozn.: Ve jmenovateli může být místo počtu osob počet sledovaných roků bez nemoci → incidence rate

---

# Příklad (prospektivní studie)

---

V letech 1965-68 bylo v rámci kardiovaskulárního programu v Honolulu zahájeno sledování 8 006 mužů. Při zahájení studie nemělo v anamnéze mrtvici 7 872 mužů, z toho 3 435 kuřáků a 4 437 nekuřáků. Po 12 letech se mrtvice vyskytla u 171 kuřáků s 117 nekuřáků.

1. Vypočítejte incidence risk, odhad RR a AR
  2. Vypočítejte incidenci ODDS, odhad RR a AR
-

# **Výpočet rizik u retrospektivní studie (1)**

---

U retrospektivních studií nelze přímo stanovit incidenci nemoci, a tudíž ani AR a RR tak, jak uvedeno dříve.

Vychází se z **incidence ODDS** expozice!

---

# **ODDS ratio (OR, odhad relativního rizika u retrospektivních studií)**

	Případy /nemoc ano/	Kontroly /nemoc ne/	celkem
Expozice ano	a	b	a+b
Expozice ne	c	d	c+d
celkem	a+c	b+d	a+b+c+d

# ODDS ratio (OR, odhad relativního rizika u retrospektivních studií)

---

retrospektivně bylo zjištěno, že z celkového počtu nemocných bylo vystaveno riziku a osob a z celkového počtu zdravých bylo riziku vystaveno b osob

- Pravděpodobnost nemocného být exponován  
 $a/(a+c)$
  - Pravděpodobnost nemocného nebýt exponován  
 $c/(a+c)$
  - Odds expozice u nemocných  
 $[a/(a+c)]/[c/(a+c)]=a/c$
  - Odds expozice u kontrol  
 $[b/(b+d)]/[d/(b+d)]=b/d$
-

# Výpočet rizik u retrospektivní studie (2)

---

Za urč.předpokladu možno provést odhad RR.

*Předpoklady:*

- nízká frekvence nemoci
- reprezentativní výběry

$$\begin{aligned} \textbf{Odhad RR} &= \textbf{ODDS RATIO (OR)} = \\ &(a \times d) / (b \times c) \end{aligned}$$

Odhad vychází ze sázkového rizika

$$OR = (a/c)/(b/d) = ad/bc = \textbf{ODDS expozice u nemocných}/\textbf{ODDS expozice u kontrol}$$

Dále můžeme vypočítat PAF.

---

# Příklad (retrospektivní studie)

---

V souboru 536 dětí narozených s vrozenou vývojovou vadou a 466 dětí narozených bez vady se sledoval vztah mezi výskytem vady novorozence a výskytem vady v rodině otce.

Z 536 dětí s vadou se současně vada vyskytovala v rodině otce u 50 dětí, z 466 dětí kontrolních (narozených bez vady) se vada v rodině otce vyskytovala u 8 dětí.

1. Odhadněte **relativní riziko OR**
  2. Určete podíl **atributivní frakce (PAF)**;  $p=0,015$
  3. Výsledky interpretujte
-