

INFEKCE

Typicky pneumonie, která je také nejčastější příčinou úmrtí u dětí v terminální fázi nevléčitelného onemocnění.

Na druhé straně máme zkušenost, že děti v domácím prostředí trpí méně často infekčními komplikacemi, i když jsou výrazně imunosuprimované a domácnosti rozhodně nejsou sterilní. Roli hraje osídlení organismu „známými“ mikrobiálními kmeny a také psychické nastavení dítěte a domácí strava.

Léčba:

Antibiotická léčba – v terminální fázi je její podání otázkou, vždy záleží na konkrétním dítěti a situaci, může zmírnit nepříjemné příznaky zánětu (febrilie, kašel, dušnost) a dítěti tak ulevit. Je také možné antibiotika nepodat, toto rozhodnutí však musí být výsledkem komunikace s rodiči a dítětem.

Léčba možných krvácivých projevů

V první řadě bychom měli rodinu na možnost krvácení připravit, pokud je toto pravděpodobné. Pokud jej očekáváme u menstrujících dívek, je vhodné zvážit hormonální terapii.

Krvácení z dásní

- Používat měkký zubní kartáček a vyplachovat dutinu ústní dezinfekčními přípravky jako prevenci infekce.
- Pokud je příčinou nízká hladina trombocytů, pak za určitých okolností zvažujeme podání trombokoncentrátu.
- Kyselina trenaxemová – lokálně na krvácející místo či celkově p. o.

Drobná krvácení

- Kyselina trenaxemová, etamsylát
- Adrenalin lokálně (například mul namočený v adrenalinu)

Život ohrožující krvácení

- Morfin s benzodiazepiny (midazolam, diazepam)
- Použití červených či tmavých ručníků a tkanin ke snížení úzkosti dítěte i okolí