

Úvod do imunologie

Jiří Litzman

Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU
Brno

Imunitní systém

- Jeden ze základních homeostatických mechanismů organismů.
- Jeho funkcí je udržení integrity organismu rozpoznáním cizorodého /škodlivého pro vlastní organismus.
- Imunitní systém má schopnost rozpoznané cizorodé/nebezpečné látky eliminovat.

Imunitní systém

- Reaguje s cizorodými/nebezpečnými substancemi z vnějšího prostředí (zejména antimikrobiální ochrana).
- Účastní se odstraňování starých a poškozených buněk vlastního těla.
- Napadá nádorové a viry infikované buňky vlastního těla.

Základní projevy imunitního systému

- Obranyschopnost
- Autotolerance
- Imunitní dohled

Antigen

- Látka rozpoznaná imunitním systémem vyvolávající imunitní reakci – imunogennost (imunogen)
- Produkty imunitní reakce (protilátky, T-lymfocyty) mají schopnost s antigenem specificky reagovat.


Podmínky imunogenicity

- Cizorodost
- Dostatečná molekulová hmotnost ($> 6 \text{ kDa}$)
- Komplexní struktura


Antigen – základní složení

- Nosičská část molekuly
- Antigenní determinanty (epitopy)
(cca 5-7 aminokyselin!)


Vztah antigenu a epitopu, nosičská část



Vztah antigenu a epitopu, nosičská část...



Vztah antigenu a epitopu




Chemické složení antigenů

- Proteiny – obvykle výborné imunogeny.
- Polysacharidy- jsou dobrými imunogeny zejména jako součást glykoproteinů.
- Nukleové kyseliny- špatná imunogenicita, vázána zejména na komplexy nukleových kyselin a proteinů.
- Tuky – velmi zřídka se uplatňují jako imunogeny. Nejznámější jsou sfingolipidy.

Hapten

- Nízkomolekulární látky které vyvolávají imunitní reakci po vazbě na jiné vysokomolekulární látky.
- Mají schopnost s produkty imunitní reakce reagovat.
- Typickými hapteny jsou některé kovy, vyvolávají IV. (buněčný) typ přecitlivělosti, nebo léky způsobující I. (atopický) typ přecitlivělosti.


Imunogenicita haptenu




Zkřížená reaktiva antigenů

- Produkty imunitní reakce mohou někdy reagovat se substancemi odlišnými než byly spouštěče vlastní reakce.
- Imunologická „podobnost“ nemusí vyjadřovat „podobnost“ chemickou.
- Stupeň zkřížené reaktivity může být různý.
- Zkřížená reaktivita se uplatňuje při patogenezi některých autoimunitních chorob (např. revmatická horečka).

Zkřížená reaktivita antigenů





Vztahy imunitního systému k nervové soustavě

- Ovlivnění nervového systému – například vliv IL-1, IL-6, TNF- α na hypotalamická termoregulační centra.
- Ovlivnění funkcí imunitního systému nervovou soustavou: inervace lymfatických tkání, receptory neurohormonů na buňkách imunitního systému. Je možné vypěstovat podmíněné reflexní reakce.

Vztahy imunitního systému k endokrinní soustavě

- Na buňkách imunitního systému jsou receptory pro řadu hormonů. Nejvýrazněji imunitní systém ovlivňují glukokortikoidy.
- Buňky imunitního systému produkují řadu endokrinně aktivních působků (endorfiny, TSH...). Některé cytokiny přímo nebo nepřímo působí na endokrinní systém.

IMUNITA VROZENÁ A ZÍSKANÁ

| Vlastnost | Imunita vrozená | Imunita získaná |
|-------------------------------------|---|--|
| Specifickost | struktury společné pro různá agens (molekulární znaky patogenů – „PAMP“ – dsRNA, CpG, LPS, manany, glykany, fosforylcholin...) | strukturální detailly antigenů (antigenní determinnty, epitopy) |
| Receptory | zakódované v genomu buněk zárodečné linie, není nutné přeskupování genů | vytvářejí se během vývoje somatickými rekombinacemi, přeskupování genů nutné |
| Distribuce receptorů | neklonální: všechny buňky dané skupiny jsou identické | klonální: klony buněk odlišné specifičnosti mají odlišné receptory |
| Odlišení vlastního od cizorodého | perfektní vyselektováno v evoluci | ano, ale není perfektní (autoimunizace) |
| Nástup reakce | bezprostřední (0-4-96 hod) | s latencí (> 96 hod) |
| Paměť | nevzniká | vzniká |

Základní hnací silou imunitního systému
není odlišování vlastního od cizího,
ale vnímání nebezpečí a obrana
proti němu.

Polly Matzinger:
Tolerance, Danger, and the Extended Family
(Annu Rev Immunol 1994; 12: 991-1045)


PAMPs - Pathogen-associated molecular patterns
tj. molekulární motivy (vzory) asociované
s patogenem

PRRs - Pattern recognition receptors
tj. Receptory na buňkách hostitele,
rozeznávající PAMPs

Buňky imunitního systému


- Hlavní buňky imunitního systému
 - Lymfocyty (T a B)
- Vedlejší buňky imunitního systému
 - Granulocyty
 - Monocyty
 - Tkáňové makrogágy
 - Mastocyty
 - Dendritické buňky
 - NK buňky
 - Endotelie
 - Trombocyty, erytrocyty, fibroblasty, epiteliální buňky

Kostní dřeň jako místo vzniku buněk imunitního systému



Dendritické buňky


- Hlavní funkcí je zpracování antigenu a jeho prezentace T-lymfcytům.
- Jsou i důležitým zdrojem kostimulačních signálů.
- Langerhansovy dendritické buňky se významně uplatňují v přenosu antigenů z epidermis kůže.



Folikulární dendritické buňky


- Nevyvíjejí se z buněk pocházejících z kostní dřeně
- Jsou přítomny ve folikulech mízních uzlin, sleziny, podslizničních tkání.
- Váží komplexy antigen-protilátka, tyto komplexy předkládají B-lymfocytům.

Orgány imunitního systému





Lymphocytes and lymph return to blood via the thoracic duct

Naive lymphocytes enter lymph nodes from blood





Antigens from sites of infection reach lymph nodes via lymphatics

Struktura lymfatické uzliny





Slezina jako orgán imunitního systému



Marginální zóna sleziny

- Je mezi bílou a červenou pulpou
- B-lymfocyty marginální zóny zajišťují rychlou odpověď, zejména na polysacharidové antigeny, T-independentní
- Odpověď je zejména ve třídě IgM
- Antigeny přinášeny krevní cestou


Struktura Payerových plaků




High endothelial venules

- Specializované venuly, jsou místem kde lymfocyty pronikají z krevního oběhu do stromatu lymfatických uzlin nebo do slizničního imunitního systému.
- Jsou na nich adhezivní molekuly umožňující vazbu zejména „naivních“ (panenských) T- lymfocytů.


Řízená migrace lymfocytů do lymfatické uzliny a do tkání



Cirkulace lymfocytů v těle, role High Endotelial Venules



Cirkulace lymfocytů v těle




IMUNOLOGIE

HUMÁNNÍ IMUNOLOGIE
LÉKAŘSKÁ IMUNOLOGIE
KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Klinický a laboratorní obor, zabývající se studiem, diagnostikou a léčením pacientů trpících chorobnými procesy způsobenými poruchami imunologických mechanismů a chorobami, u nichž je ovlivňování imunity důležitou součástí léčby a prevence. (Memorandum WHO/IUIS/IAACI 1992)

Poruchy imunitního systému



IMUNODEFICIENCE

PRIMÁRNÍ
(VROZENÉ)

SEKUNDÁRNÍ
(ZÍSKANÉ)

Zvýšená vnímavost k infekčním agens

Náchylnost k maligním procesům

Autoimunitní projevy

Dysregulace imunitního systému

Prevalence autoimunitních chorob

(Mackay IR, BMJ 2000; 321: 93-96)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Choroby štítné žlázy: | > 3% dospělých žen |
| Revmatoidní artritida: | 1% celkové populace, převaha žen |
| Primární Sjögrenův syndrom: | 0,6-3% dospělých žen |
| Systémový lupus erytematosus: | 0,12% celkové populace, převaha žen |
| Roztroušená skleróza: | 0,1% celkové populace, převaha žen |
| Diabetes I. typu: | 0,1% dětí |
| Primární biliární cirhóza: | 0,05-0,1% žen středního a staršího věku |
| Myasthenia gravis: | 0,01% celkové populace, převaha žen |

Infekční choroby globální problém lidstva

- Každou hodinu zemře na infekční choroby cca 1500 lidí, z nichž polovina je dětí do 5 let
- Příčina cca 13 milionů úmrtí za rok
- Rizikovou skupinu představuje stárnoucí populace
- Vynořuje se problém nemocných s podloženou imunitou (imunologicky kompromitovaný, kriticky nemocný pacient)

Záměrné a cílené ovlivnění imunity

- IMUNIZACE
 - aktivní (vakcinace)
 - pasivní („hyperimunní“ antiséra)
- IMUNOSUBSTITUCE
 - „normální“ gamaglobulin
- IMUNOMODULACE
 - imunosuprese
 - imunostimulace
 - plasmaferéza a imunoadsorpce

Přitažlivost a význam imunologie pro lékaře nespočívá pouze v tom,
že dokáže odhalit diagnózu a zajistit racionální terapii pacientů,
ale také v tom, že je schopna silit zdravé v jejich zdraví.

(Ctirad John)