



Gramnegativní nefermentující tyčky


M.Hanslianová
OKM FN Brno



- = velká skupina rodů gramnegativních tyček
neschopných fermentovat glukózu
- Nesourodá skupina mikrobů, běžně přítomné v půdě, vodě, na rostlinách
- Zařazení do čeledí je spíše formální
- Počet rodů gramnegativních nefermentujících tyček se mění v souvislosti s podrobnějšími studiemi genotypu

- Kultivačně nenáročné
- Dobře rostou na běžných půdách- krevní agar, Endova půda
- Výhodnější kultivační teplota 30 stC
- Mnohdy prodloužená kultivace na 48 hodin
- Dostatečná vlhkost prostředí (zdravotnická zařízení- nebulizace, gely, roztoky)

- Kolonie na půdách nejsou většinou nijak typické (výjimky- *Pseudomonas aeruginosa*, *Chryseobacterium meningosepticum*)
- Identifikace podle biochemické aktivity
- MALDI-tof






- Patogenita pro člověka je u této skupiny mikrobů obecně velmi nízká
- Oportunní patogeny- infekce prakticky vždy u oslabených osob (primární imunodeficiency, pac. s hematologickou malignitou, transplantovaní, popálení), u těch pak můžou mít těžký průběh s fatálním koncem

- Zdrojem infekce je místo kolonizované nefermentující tyčkou- tracheální kanyly, flexily, močové katetry...)
- Obtížné odlišení kolonizace a infekce
- Často jsou původci nozokomiálních nákaz
- Polyrezistentní vůči antibiotikům i dezinfekčním látkám, biofilm!
- Antibiogram se nedá odhadnout!

Rozdělení gramnegativních nefrmentujících tyček podle abecedy

- **Acinetobacter**
- Agrobacterium
- Alcaligenes
- **Bordetella**
- Brevundimonas
- **Burkholderia**
- Comamonas
- Eikenella
- Flavimonas
- Chryseobacterium
- Kingella
- Methylomonas
- Moraxella
- Ochrobacterium
- Oligella
- **Pseudomonas**
- Psychrobacter
- Ralstonia
- Shewanella
- Sphingobacterium
- **Stenotrophomonas**
- Suttonella
- Weeksella
- Xanthomonas



Bordetella pertussis

- Gramnegativní nefermentující tyčka,
ale kultivačně náročná
- Neroste na běžných kultivačních
půdách, některé součásti agaru jsou
pro ni toxické, vyžaduje suplementy
- Kultivace trvá 3-5 dní, roste v
drobných koloniích, mohou mít zónu
hemolýzy

- Původce pertuse= dávivý kašel
- Kapénkový přenos, 7-10 denní inkubace
- 3 stadia onemocnění:
 - 1) Katarální
 - 2) Paroxysmální
 - 3) Rekonvalescentní

- V katarálním stadiu lze bordetely vypěstovat a lze ovlivnit průběh onemocnění antibiotiky
- Paroxysmální stadium- toxin, průkaz onemocnění sérologickými metodami
- Léky volby- makrolidová antibiotika

- celoplošná vakcinace 40.- 50. léta 20. století
 - očkování probíhá více než 50 let
 - člověk - jediný zdroj B. pertussis
 - pertuse – adept na eliminaci ?!
-
- ALE

- Nárůst výskytu pertuse v posledních dvou desetiletích
- Výskyt onemocnění v adolescentní a dospělé populaci
- Výskyt nových genetických variant, oslabení postvakcinační imunity

Vývoj onemocnění pertusí v ČR v letech 1982–2009

Trends in the incidence of pertussis in the Czech Republic in 1982–2009

Kateřina Fabiánová, Bohumír Kříž, Čestmír Beneš

Souhrn • Summary

Přes vysokou proočkovovanost populace v ČR narůstá od devadesátých let nemocnost pertusí. Ve sledovaném období bylo zjištěno, že úplné očkování tzn. 5 dávkami je vykázáno u 75,3 % případů. Nemocnost pertusí je nejvyšší ve skupině 10–14letých dětí. V souvislosti s pertusí byla zaznamenána i tři úmrtí u dosud neočkoványch dětí do jednoho roku života.

Despite the high vaccination coverage of the population in the Czech Republic, an upward trend has been observed in the incidence of pertussis since the 1990s. The full five-dose vaccination rate in 1982–2009 was 75.3%. The highest morbidity is found in the group of 10–14-year-olds. Three deaths from pertussis were reported in non-vaccinated children under one year of age.

Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2009; 18(12): 368–370.

Klíčová slova: pertuse, nemocnost, očkování
Keywords: pertussis, incidence, vaccination

Nejvyšší nemocnost pertuse v ČR byla zaznamenána v roce 1956 – 520,5/100 000. Po zavedení očkování proti pertusi v roce 1958 do povinného očkovacího kalendáře počty hlášených případů onemocnění rychle klesaly, ale nikdy nedosáhly nulových hodnot (z počátečních 30 000–50 000 případů dávivého kaše ročně až na 5–48 případů od druhé poloviny 70. let do roku 1992).

Od roku 1993 je registrován stoupající trend onemocnění. Nejvíce nemocných dávivým kašlem je opakováno registrováno ve skupině 10–14letých dětí. V roce 2009 bylo nahlášeno celkem 890 případů onemocnění, což je nejvíce od roku 1966.

Nemocnost podle věkových skupin a pohlaví

Incidence v 80. letech se pohybovala v rozmezí 0,1–0,3/100 000.

Stoupající trend nemocnosti pertusí v ČR je registrován od 90. let minulého století se zatím nejvyšším výskytem za posledních 43 let v roce 2009 – incidence 8,5/100 000 obyvatel (890 případů) – graf 1.

Většina hlášených případů pertuse z celé populace je hlášena v kategorii 0–19 let.


Nemocnost se postupně přesunovala z kategorie nejménších a předškolních dětí do kategorie mladších a starších školních dětí – graf 2.

Nejvyšší nárůst případů je ve skupině dětí 10–14 let (za poslední dekádu narostl počet hlášených případů v této skupině šestinásobně) a stoupá rovněž počet hlášených případů pertuse ze věkových skupin 5–9, 15–19 a ve skupině Oletých dětí (řazeno sestupně) – graf 3.

Nárůst nemocnosti je rovněž registrován ve skupinách potencionálních „rodičů“ a „prarodičů“.

Incidence ve skupině Oletých dětí klesala od padesátych let minulého století (3 804,9/100 000 v roce 1956 – pokles nemocnosti díky terapii chloramfenikolem a zavedením očkování) a v letech 1974 až 1999 se udržovala pod hranicí 10,0/100 000, postupně však začala narůstat, v roce 2008 26,7/100 000, v roce 2009 25,8/100 000 obyvatel. Po 35 letech byla dokonce v této věkové skupině zaznamenána postupně 3 úmrtí; v roce 2005, 2007 a 2009. Ve všech třech případech se jednalo o dosud ne-

Graf 1: PERTUSE, Česká republika, 1982–2009, nemocnost na 100 obyvatel






Imunita

- Po prodělaném onemocnění 4-20 let
- Po vakcinaci 3-12 let
- Transplacentárně přenesené protilátky mizí 4.-8.týden po narození

- Adolescenti a dospělí mohou být rezervoárem pro malé děti
- Doporučení přeočkování alespoň 1x v dospělosti

- Klinicky nejvýznamnější pro člověka jsou rody
 - 1) *Acinetobacter*
 - 2) *Pseudomonas*
 - 3) *Stenotrophomonas*
 - 4) *Burkholderia*




1) *Acinetobacter*

- První kmen izolovaný z půdy v roce 1911 *Micrococcus calcoaceticus*
- Několikrát znovuobjeven a přejmenován
- V roce 1954 vytvořili Brisou a Prévot rod *Acinetobacter*, do kterého spadaly gramnegativní nefermentující tyčky netvořící pigment a nepohyblivé

- Zahrnuty i baktérie, které dle dnešní nomenklatury s rodem *Acinetobacter* nesouvisí (kmeny oxidáza- pozitivní)
- V roce 1968 Baumann prokázal odlišnost oxidáza- negativních kmenů od oxidáza- pozitivních
- V rodu *Acinetobacter* zůstaly oxidáza- negativní diplokoky

Gramnegativní diplokoky





- Většina kmenů izolovaných z klinického materiálu patří do rodu *A.baumannii*
 - Fenotypově v podstatě neodlišitelný od *A.calcoaceticus*
- 
- *A.calcoaceticus-baumannii* komplex


- Válečná poranění (Iraqibacter)
- Zástupci rodu *Acinetobacter* bývají izolováni z materiálu od oslabených pacientů
- Široké spektrum infekcí
- Často multirezistence k antibiotikům

Acinetobacter sp.

% rezistence k vybraným antibiotikům




Legenda: AMS=ampicilin/sulbactam (Unasyn), PPT=piperacilin/tazobactam (Tazocin), MER=meropenem, CPS=cefoperazon/sulbactam (Sulperazon), CPM=cefepim





2) *Pseudomonas*

- Gramnegativní tyčinka řazená do čeledi Pseudomonadaceae
- Nejčastěji izolovaný a klinicky nejvýznamnější druh= *Pseudomonas aeruginosa*
- Výrazný pigment a vůně, hemolýza na krevním agaru, oxidáza- pozitivní, pohyblivé



- Infekce u oslabených lidí
- Jeden z nejčastějších původců nozokomiálních nákaz (ventilátorové pneumonie, infekce u popálených, osteomyelitidy, otitidy, endoftalmitidy...)
- Svízelná terapie infekcí vyvolaných pseudomonádami- omezená škála antibiotik k užití i u citlivých kmenů





Kasuistika 1

- Pacient LV, nar. 1930, **4.6.2008** přeložen na Neurologickou kliniku FN Brno z FNuSA, kde provedena prostatektomie pro benigní hypertrofii
- Průběh hospitalizace ve FNuSA komplikován urosepsí vyvolanou citlivým kmenem *Pseudomonas aeruginosa* (*PSAE*), zaléčen kombinací antibiotik ceftazidim+ gentamicin

- Na NK přijat pro lumbalgie, zjištěn opět uroinfekt vyvolaný PSAE rezistentní k chinolonům, febrilní, CRP 205
- Indikováno CT páteře, doporučena kombinace antibiotik- opět ceftazidim+gentamicin- ten, vzhledem k horší funkci ledvin v redukované dávce

- Dle CT a NMR zjištěna spondylodiscitis L3-4, předpokládané agens PSAE (hemokultivace negativní), navýšena dávka ceftazidimu na 12g/den+ ponechán gentamicin- monitorovány hladiny antibiotika v séru a následně zvednuty i dávky gentamicinu

- **9.6.2008**- CRP pokles na 20, pacient zlepšený, afebrilní, s úlevou bolestí
- **13.6.2008**- CRP 8, dobrý, atb 10 dní, vysazen gentamicin, ponechána terapie ceftazidimem
- **23.6.2008**- CRP 1, dobrý, 20 den na ceftazidimu, snížení dávky, na domů?

- Překlad pacienta z oddělení na oddělení- nutnost dlouhodobé terapie u PSAE vyvolané spondylodiscitidy, ale není k dispozici p.o. antibiotikum-parenterální terapie při hospitalizaci pacienta s nízkým CRP a v klinicky dobrém stavu

- **14.7.2008**- 42 dní i.v. terapie ceftazidimem, CRP nízké, klinicky dobrý, propuštěn bez antibiotik domů
- **21.7.2008**- opět přijat, ortopedie, CRP 150, febrilní, opět úporné bolesti zad, febrilie, dle CT opět progrese nálezu

- Opět hospitalizace na různých odděleních FN Brno i FNuSA- nutnost i.v. terapie ceftazidimem ve vyšších dávkách
- Jednání se ZP ohledně případné i.v. ambulantní aplikace a úhrady léků
- Nakonec pacient léčen za hospitalizace, celková doba terapie se blíží 6 měsícům

- Hrozbou jsou **polyrezistentní kmeny** pseudomonád
- Ve FN Brno rozšířený kmen polyrezistentní *Pseudomonas aeruginosa* citlivý pouze ke kolistinu a amikacinu (variabilně)
- Zavlečen do nemocnice v roce 2006- transport kolonizovaného pacienta

- V současné době rozšířen po celé nemocnici
- Nejvýrazněji JIP a ARO - vysoké procento ventilovaných pacientů
- Odolává snahám o eradikaci

- Problém- kmeny pseudomonád s produkcí **metalobetalaktamáz**


Eflux

metalobetalaktamáza




Možnost přenosu rezistence na enterobaktérie!!!!!!!

- Obtížná terapie infekcí vyvolaných těmito kmeny pseufomonád
- Synergie??




Ps.aeruginosa s produkcí MBL ve FN Brno


Rezistence *P.aeruginosa* k ceftazidimu, EARS-Net 2012




P.aeruginosa -kmeny rezistentní a sníženě citlivé ke karbapenemům, EARS-Net 2012



Rezistence *Pseudomonas aeruginosa* k antibiotikům v %, PMDV FN Brno, 2011-2013







3) *Stenotrophomonas*

- Gramnegativní tyčinka, pohyblivá, aerobní, oxidáza negativní (opožděná)
- Čeleď Pseudomonadaceae
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Pseudomonas-* *Xanthomonas-* *Stenotrophomonas*
- Přirozená rezistence k meropenemu, polyrezistentní

- Původce nozokomiálních infekcí:
 - bakteriémie
 - pneumonie
 - meningitidy
 - rané infekce
 - močového traktu



5 μm



4) Burkholderia

- Gramnegativní tyčinka, pohyblivá, oxidáza- pozitivní
- Čeleď Pseudomonadaceae
- V roce 1949 popsaná Walterem Burkholderem jako původce onemocnění cibule (cepa= cibule)

- Oportunní patogen
- Původce nozokomiálních infekcí
- Nejvíce infekcí vyvolaných burkholderiemi u
 1. nemocných s chlopenními náhradami a cévními implantáty
 2. nemocných s cystickou fibrózou

- Ve FN Brno se nejčastěji setkáváme s infekcí *Burkholderia cepacia* u pacientů s cystickou fibrózou (centrum pro léčbu CF)
- CF- onemocnění s poruchou metabolismu minerálů a tvorby hlenu- v dýchacích cestách se tvoří hustý, vazký hlen, který je blokuje a je živnou půdou pro mikroorganismy

- Opakované infekce dýchacích cest vyvolané polyrezistentními kmeny-*Burkholderia cepacia*, *Pseudomonas aeruginosa*
- Kmeny *B.cepacia* u pacientů s CF jsou nezřídka rezistentní ke **všem dostupným antibiotikům**

- Prognosticky významný faktor (přežití)
- Transplantace plic – některá centra
absolutní kontraindikace
- Multirezistence – panrezistence
- Eradikace velmi nepravděpodobná
- Závažné psychosociální aspekty
izolace kolonizovaných

Odebrán: Brno
Oddělení klinické mikrobiologie
Přím. MUDr. Alena Ševáčková
Jihlavská 20
625 00 Brno - Bohunice

KNPT: FN Brno
Oddělení: KNPT-amb.příl., 2565
Jihlavská 20
625 00 Brno

Provedeno na FN KNPT-amb.příl., 2565

Pacient: # [REDACTED]
Vyzadil: #
Diagnóza: #
Komentář: #
Vyšetření: Kultivační vyšetření - Snubum

Odebráno: 5.1.2009; 00:00
Přijato: 5.1.2009; 12:37
Odesláno: 10.1.2009; 13:39
Záznam: 44/000000000000
Kdo hradil: VZP

Aerobní kultivace:

Nález: **Pedéni sputa 10 na -7 Burkholderia cepacia**

Standovení kvalitativního citlivosti na antibiotiky:
ampicilin.....R cefoperazin (Sulperazon) ..R
Augmentin (Unasyn).....R cefepim (Maxipim).....R
piper./taxobact. (Tazocin) ..R ciprofloxacin (Ciprobay) ..R
chloramfenikol.....R kolistin.....R
tetracyklin.....R gentamicin.....R
cotrimoxazol (Septrin).....R amikacin.....R
cefazolin (Kefzol), cefalotin ..R tobramycin (Brulamycin) ..R
cefuroxim (Zinacef, Zinnat) ..R meropenem ..R
ceftazidim (Fortum).....R aztreonam (Azactam) ..R
cefotaxim (Claforan).....R

Nález: **Pedéni sputa 10 na -5 Candida albicans**

Standovení kvalitativního citlivosti na antifungálníky:
flukonazol (Mycomax).....C

Mikroskopické vyšetření materiálu:

Epitelius.....cítelné
Leucocyty.....+
G+ kolky ve dřevěných chvostech.....cítelné
G+ kolky v metickových chvostech.....cítelné
G+ diplokoky.....cítelné
G+ tyčinky.....++
Kvasinky.....cítelné


Výsledek: ke konzistenci zpracovaného sputa
nález v Pedéni 10 na -3 je pozitivní. Nález je krit. DCO
složka: 100% kolky + 25% G+ diplokoky + 10% G+ tyčinky

- Terapie těchto infekcí je velmi složitá
- V mikrobiologické laboratoři se zkouší „synergie antibiotik“ = pokud nefunguje ani jedno antibiotikum samotné, zda nefunguje některá z kombinací
- Účinnost in vivo nejistá



	Fermentace glukózy	Růst	Doba kultivace	Patogenita	Stanovení citlivosti
PSAE	Ne	Typický běžné půdy	24	oportunní častý	MIC i disková metoda
ACCA	Ne	Ne typický běžné půdy	24	oportunní	MIC i disková metoda
STMA	Ne	Ne typický běžné půdy	48	oportunní	MIC
BUCE	Ne	Ne typický běžné půdy	48	oportunní CF	MIC

PSAE=*Pseudomonas aeruginosa*, ACCA= *Acinetobacter sp.*, STMA=*Stenotrophomonas maltophilia*,
BUCE= *Burholderia cepacia*



Děkuji za pozornost