

PP u intoxikací a požití návykových látek

Mgr. Liana Greiffeneggová

CHARAKTERISTIKA

- ☞ Za jedovatou považujeme každou látku - pevnou, plynnou, tekutou, která po vniknutí do organismu způsobuje poškození zdraví,
- ☞ nejnebezpečnější jsou kombinace různých látek,
- ☞ řada postižených umírá na následky komplikací vzniklých po požití jedu,

Jed vniká do organismu

☞ ústy,

☞ plícemi,

☞ kůží,

☞ zažívacím traktem,

☞ aplikací injekce,

☞ sliznicí, ...

PŘÍZNAKY

- ☞ NEVOLNOST, ZVRACENÍ, BOLESTI, SLABOST, OSPALOST, PORUCHY VIDĚNÍ A SLUCHU,
- ☞ POSTIŽENÝ JE DEPRESIVNÍ, NEKLIDNÝ, AGRESIVNÍ, MŮŽE MÍT ZMĚNĚNOU ORIENTACI V ČASE A PROSTORU,
- ☞ ZMĚNA BARVY A TEPLoty KŮŽE A SLIZNIC,
- ☞ BEZVĚDOMÍ.

POSTUP PRVNÍ POMOCI

postižený při vědomí

Jedu bylo málo, nebo se nestačil vstřebat,

📄 zklidněte postiženého i okolí,

📄 zjistěte CO -KOLIK- KDY požil - vdechl - aplikoval si injekcí,...

📄 vyšetřete základní životní funkce, případná další poranění,

📄 ptejte se na bolesti, zjistěte míru zachování vědomí (orientaci v místě-čase-osobě).

POSTIŽENÍ VDECHNUTÍM

- ☞ TP: PŘENESETE POSTIŽENÉHO NA ČERSTVÝ VZDUCH, NEBO ZAJISTĚTE PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU,
- ☞ UVOLNĚTE TÍSNÍCÍ ODĚV,
- ☞ DÁLE POSTUPUJTE DLE OBECNÝCH POKYŇŮ pro PP.
- ☞ Je maximálně vhodné předat spolu s postiženým vzorek látky (potravin, léků) lékařům!

POSTIŽENÍ POŽITÍM

- ☞ Postiženému podejte (je-li PLNĚ zachováno vědomí) 0,5-1,0 litr vody s přidavkem kuchyňské soli,
- ☞ do tekutiny je možné přidat 4 tbl. živočišného uhlí (rozdrtit!),
- ☞ pokuste se vyvolat zvracení drážděním hltanu,
- ☞ zvracení nesmíte užít u kyselin-zásad (poleptání!)-saponátů-ropných produktů (vdechnutí)!!!
- ☞ buďte rázní a důslední, postižení někdy nespolupracují.

POSTIŽENÍ APLIKACÍ INJEKCE

- 📄 Zjistěte typ látky a místo aplikace (kůže, pod kůží, sval, žíla),
- 📄 ihned zajistěte prevoz do zdravotnického zařízení,
- 📄 až do předání intenzívně sledujte celkový stav.

POSTIŽENÍ POTŘÍSNĚNÍM KŮŽE-SLIZNICE

- ☞ Odstraňte postřísněný oděv (RUKAVICE!), ihned zahajte oplachování čistou vodou,
- ☞ jde-li o práškovou podobu chemikálie, nejdříve ji nasucho oprašte,
- ☞ při oplachování směřujte vodu tak, aby netekla na nezasažená místa nebo do zdravého oka!!!
- ☞ Oplachování má být dostatečně dlouhé, aby se max.snížila koncentrace látky (min.30 min.),
- ☞ postižené místo (oko) kryjte jako popáleninu,
- ☞ 5 T, okamžitý převoz do zdrav.zařízení.

POSTUP PRVNÍ POMOCI

postižený v bezvědomí

- ☞ Postupujte jako u všech případů v bezvědomí, volejte ZZS,
- ☞ zjistěte, co je příčinou intoxikace,
- ☞ sledujte celkový stav, zejména dýchání-oběh-vědomí, pečujte o volné dýchací cesty (stabilizovaná poloha),
- ☞ nikdy nepodávejte tekutiny, nevyvolávejte zvracení, i když se postižený probere!!!

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- ☞ U otrav léky na uklidnění a na spaní dochází při rozvinutí účinku léků k útlumu dýchacího centra!!!, následně selhává oběh a ledviny!,
- ☞ při otravách alkoholem se dostavuje spavost, rozšířené zornice, poruchy dýchání, poruchy termoregulace,
- ☞ nebezpečná je kombinace alkoholu a léků na spaní - ihned zajistěte odvoz do zdrav.zařízení, hrozí zástava oběhu a dýchání!!!