



Zdravotnické pomůcky vybavení lékárničky



2 096 Kč



2 351 Kč

Travel-Gum 20

por.gum.10x20mg



účinné při nevolnosti a zvracení. Místem zásahu jsou nervové dráhy orgánu rovnováhy (vestibulární neurony). Léčivá látka se žvýkáním uvolní z perorální gumy a je i sliznicí úst vstřebána do krve. Tento způsob užití je výhodný na cestách nebo u dětí, protože se lék nemusí polykat. Účinkuje tudíž i tehdy, když k nevolnosti či zvracení už došlo. Travel-gum je proto vhodný k léčení cestovní nevolnosti a zvracení.

DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

- ***Betadine roztok,***
- ***Septonex spray,***
- ***Jodisol spray*** – doporučuje se pro aplikaci na místa po přisátí klíštěte
- ***peroxid vodíku.***

BETADINE sol.



- **Charakteristika:** dezinfekční prostředek, který ničí řadu choroboplodných zárodků a je vhodný *k dezinfekci pokožky a sliznic*. Působí na bakterie, plísně, viry a prvoky. Přípravek je prakticky netoxický.
- Betadine roztok se používá k místní dezinfekci pokožky i sliznic **včetně dezinfekce otevřených poranění** a předoperační dezinfekci. Betadine roztok je také určen *k léčení bakteriálních a plísňových onemocnění*.
- Betadine roztok mohou použít dospělí i děti od 6 měsíců věku.
- asi 50,- Kč

Betadine - mast



- Mast Betadine je antiseptický, desinfekční přípravek se širokým spektrem účinku proti bakteriím, virům, plísním a prvokům
- Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí (asi 50,- Kč)

Septonex-spray

- Ošetření drobných kožních poraně (oděrek, řezných a tržných ran, drobných popálenin I.-II. stupně) nevyžadujících chirurgické ošetření. Dezinfekce a lokální anestezie kůže před povrchovými chirurgickými výkony. Drobné projevy kožního hnisání projevující se zarudnutím, mokváním a strupy (impetigo), dohojení projevů oparu. Doléčení pooperačních jizev a píštělí.
- Přípravek nenanášet častěji než 2-3krát denně. Interval mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 3 hodiny.



Jodisol



- Jodisol roztok je vysoce účinný dezinfekční přípravek. Je to tříprocentní lihový roztok komplexní sloučeniny (jodofor) s možností širokého použití. Má velký rozsah účinku na množící se formy mikroorganismů t.j.bakterie, plísně i na viry. Jod vázaný v komplexu se uvolňuje v koncentraci, která postačuje k dezinfekci, ale nepoškozuje kůži ani sliznici. Plné působení nastupuje za 1 - 5 minut po použití. Na pokožce a sliznici trvale hubí růst choroboplodných mikroorganismů

A. Ošetření lékařem u dětí, mladistvých a dospělých:

- 1.)povrchová dezinfekce kůže před drobnými výkony (odstranění třísky, klíštěte,...)
- 3.)ošetření při obtížném prořezávání zubů
- 4.)ošetření po odstranění mandlí

B. Použití bez lékařské pomoci u dětí, mladistvých a dospělých:

- 1.)dezinfekce rukou
- 2.)ošetření drobných poranění kůže (trhlinky)
- 3.)ošetření oparů
- 4.)ošetření při zánětu ústní sliznice
- 5.)ošetření po bodnutí hmyzem

C. Použití ve vodném roztoku 1 : 20:

- a.)výplachy
- b.)obklady
- c.)kloktání



- Jodisol® ztrácí účinnost při styku s mýdlem, alkalickými látkami, mlékem a bílkovinami. Uchovávat při teplotě 10 – 25 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu světlu.

PEROXID VODÍKU 3%

- **Indikační skupina**
Kožní roztok, antiseptikum.

Kdy se lék používá?

Používá se zevně k oplachování jako desinfekce a k rychlejšímu zastavení krvácení u ran jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod.. Lze použít i k výplachům úst k odstranění zápachu.

- Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3% se poraďte s lékařem. Nepoužívejte při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou nebo difosforečnan sodný.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky Peroxidu vodíku 3% nebyly popsány.

- 27,00 Kč, chraňte před slunečním zářením nebo jiným zdrojem tepla.



Hojivý měsíčkový gel s arnikou



- urychluje hojení, vhodný k ošetření prasklin, odřenin, jizev, má protizánětlivé a protiplísňové účinky, zklidňuje kůži po opálení, popálení,...

CALCIUM PANTHOTENICUM ung.



- Mast se používá místně k podpoře hojení a epitelizaci malých poranění (drobná popálení a oděrky), podráždění kůže (jako důsledek např. ozáření rentgenem, po nadměrném slunění), chronických (vleklých) a bércových vředů, trhlín konečníku.
- Mast je vhodná pro suchou až velmi suchou kůži jako podpůrný prostředek při léčbě atopické dermatitidy, kontaktních ekzémů (kožní onemocnění), na doléčení herpes simplex labialis (opar rtu) a herpes zoster (pásový opar).
- Dále se používá pro pravidelné ošetřování prsů u kojící matek a léčbu poranění a ragád (trhlín) prsních bradavek, v péči o kojence jako prevence a léčba plenkové dermatitidy (opruzení).
- Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé, děti, pro těhotné i kojící ženy.
- CENA: asi 50,- Kč



Přípravky na popáleniny

- Ideální přípravky na popáleniny a zarudnutí způsobené nadměrným sluněním obsahují vysoký obsah panthenolu nebo dexpanthenolu, v některých je i dezinfekční přísada.
- Nejlepší jsou přípravky ve formě sprejů, které nedráždí pokožku a mívají také chladivý efekt na postižená místa.




WaterJel 120ml - lahvička



WATER-JEL® je prostředek první pomoci při termických popáleninách, to znamená, že je využitelný všude tam, kde existuje reálné riziko popálení, např. přímým ohněm, horkou tekutinou, párou, hořícím kovem, zásahem elektrického proudu, případně výbuchem apod. Prostředek je zejména určen pro zásahové jednotky požární ochrany, vozy rychlé záchranné služby první pomoci, lékárníček první pomoci na pracovištích, ale i v domácnosti apod. Výrazným způsobem zkracuje čas při poskytnutí pomoci a tím zabraňuje rozšíření a prohloubení popáleninového zranění.

273 Kč



Burnshield - Hydrogel



- na popáleniny: vhodný jako první pomoc při drobných popáleninách, opařeních a spáleninách od slunce. Zvlhčuje, chladí a tiší bolest. Minimalizuje poranění a chrání před infekcí. Je nepřilnavý a netoxický. Tento výrobek je bezpečný také pro děti.
- **Combudoron tinktura WELEDA:** na popáleniny a opaření. Ihned po vzniku popáleniny 1.stupně, po bodnutí hmyzem či při postižení kůže nadměrným sluněním je vhodná rychlá pomoc. Popálené místo omýváme chladnou tekoucí vodou. Bezprostředně po tomto chlazení přikládáme obklady s Combudoron® tinkturou WELEDA. Obklad udržujeme vlhký do odeznění bolesti, pak přecházíme na přípravek Combudoron® gel či mast.



Náplast URGO (2,6 €)

- Jedinečná, k okamžitému použití připravená náplast, která se nepřilepí k ráně a jejíž podklad je velmi příjemný na dotek. Tato náplast je **určená k ošetření povrchových popálenin 2. stupně** a její účinnost je potvrzena klinickou studií na 30 osobách. Tato studie potvrdila, že ke zhojení popálenin došlo v průběhu 6 dní (průměrná doba hojení povrchové popáleniny 2. stupně je 14 dní). Náplast v sobě spojuje rychlé hojení a rychlou úlevu od bolesti díky jedinečné lipido-koloidní technologii. I výměna náplasti je díky použité technologii zcela bezbolestná.



NÁPLASTI - na poranění

- Jejich výběr záleží na prostředí, ve kterém budete. Náplasti lze vybrat s polštářkem či bez něj, lze zvolit i hypoalergenní a v různých šířkách.
- ***Vodě odolné náplasti,***
- ***náplasti elastické,***
- speciálně určené ***na puchýře,...***



HARTMANN Cosmos Classic (10x6cm)

Pevná náplast na rány z textilní tkaniny na hygienické a spolehlivé ošetření malých ran.
Balení: 5ks



Transparentní, prodyšné dělené náplasti pro diskrétní a optimální ošetření malých zranění.
Balení: 10ks

Hypoalergenní, pružné dělené náplasti z měkkého polyethylenové pěny, které mají polstrovací účinek na obzvláště namáhaných místech těla.
Balení: 20ks



URGO STRIPS

Hledáte náplast na scelení rovných okrajů rány (především řezné rány) i bez šití?

Použití / Vlastnosti

Rychlé, účinné a estetické hojení, velká pevnost i bez šití, výborná přilnavost, snadné použití, sterilní.



NEPOTŘEBUJTE NOSIT s SEBOU DESINFEKCI



Indikace : povrchová poranění, odřeniny, škrábnutí i na obtížně lokalizovaných partiích (lokty, kolena). Určen pro dospělé a děti již od 1 roku



Modré motýlkové náplasti jsou určeny k ošetření poranění na špičce prstu. Náplasti jsou omyvatelné a nealergizující

217,00 Kč

Náplast Urgo na popáleniny velký rozměr 4 ks



COPYRIGHT PEARS HEALTH CYBER



COPYRIGHT PEARS HEALTH CYBER



COPYRIGHT PEARS HEALTH CYBER

Chladiãvã hydrogelovã náplast je urãenã k první pomoci při popãlenãch, chladí, ztišãí bolest, pomáhã hojit



COPYRIGHT PEARS HEALTH CYBER

VIACELL M121
Modré náplasti na kloub

Náplast Viacell
chladivá na bolest
hlavy - dětská 2 ks



COPYRIGHT PEARS HEALTH CYBER



COPYRIGHT PEARS HEALTH CYBER

masážní prohřívací náplast



COPYRIGHT PEARS HEALTH CYBER

Podráždění očí

- ***Visine, Evercil*** – kapky na uklidnění podrážděných očí způsobených alergií, prachem.
- ***Ophthamo septonex*** – kapky nebo mast, pro vyčištění očí a jejich desinfekci

Ophthamo-Septonex oční kapky - 10 ml

Ophthamo-Septonex oční kapky se používají k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky. Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutno vyhledat lékaře. Ophthamo-Septonex oční kapky mohou užívat dospělí, mladiství a děti. U těhotných a kojících žen rozhodne o užívání přípravku lékař.

- Ophthamo-Septonex je obvykle dobře snášen, ale u citlivých jedinců se mohou vyskytnout projevy překrvení a pálení spojivky. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o možnosti dalšího používání přípravku poraďte s lékařem. Interakce: Interakce nejsou dosud známy.



Alergické reakce

- Na mírné alergické reakce (štípnutí hmyzem) lze doporučit lokálně aplikované gely – ***Fenistil gel, Tantum Verde gel.,...***
- Při silnějších alergických reakcích (štípnutí vosou, včelou, alergie na pyly apod.) jsou nejvhodnější léky ve formě tablet (***Cerex, Cetirizin, Loratadi, Reactin, Zorac, Zyrtec, atd.***).

Fenistil gel (124,- Kč)



- odstraňuje svědění nejrůznějšího původu vyjma toho, které provází stavy spojené s městnáním žluče ve žlučových cestách. Má velmi dobré uplatnění v léčbě reakcí z přecitlivělosti. Nejčastěji se používá při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, po pokousání a poštípání hmyzem, při poškození kůže slunečním zářením a u mírných povrchových popálenin. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře.



Léky proti nevolnosti

- ***Kinedryl*** – pro cestovní nevolnosti, kinetózy. Pozor, nežádoucím účinkem je únava, nesmí jej užívat řidiči!
- ***Travel gum*** – žvýkačky pro ty, kteří preferují jiný způsob aplikace než tablety.
- Tablety obsahující zázvor (***Avioplant, Ginger*** atd.) – rostlinný přípravek, který mohou ojedinele užívat i těhotné ženy.
- Homeopatický přípravek ***Cocculine***.

KINEDRYL



- Tablety se užívají k předcházení a léčbě onemocnění z pohybu, jako je nevolnost při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď) a také při nevolnostech a závratích nejrůznějšího původu.
- Používá se také při léčbě nevolností způsobených poruchou vestibulárního aparátu.



Známe to všichni

- **Akutní průjem** je časté onemocnění. Téměř všichni jsme se s ním již setkali a jistě na nás někde opět čeká. Vzniká náhle a ve většině případů během několika dnů odezní. Přesná příčina nebývá často ani zjištěna. Přesto je vhodné, a pokud chceme zkrátit dobu onemocnění i nezbytné, dodržet následující opatření:
 - Dostatečný přísun tekutin
 - Dieta s omezeným obsahem tuků
 - Použití některého z protiprůjmových léků

- **„Nejrychlejší pomoc“**
 - IMODIUM PLUS léčí průjem u 9 pacientů z 10 do 10 hodin. Významně zkracuje dobu onemocnění. Léčebný efekt přípravku se dostavuje bezprostředně po požití.
 - Přípravek IMODIUM PLUS je určen k léčbě akutního průjmu a jeho obvyklých doprovodných příznaků, zahrnujících často zvýšenou plynatost, nadýmání a křeče.

Léky na průjem



- Lékem, který se doporučuje užít nejdříve je **Carbo medicinalis** (živočišné uhlí), pro děti je pak nejvhodnější přípravek **Smecta sáčky**.
- Při déle trvajících průjmech a při cestách do jižních zemí (Egypt, Maroko Turecko apod.) je ideální **Endiaron tbl.** (užívá se 3krát denně jedna tableta). Nelze jej použít u dětí, jejichž tělesná hmotnost je nižší než 40 kg!
- Při cestovních průjmech způsobených například stresem (ne u těch, které vzniknou např. po požití zkažených potravin!!!) rychle pomohou **Imodium tbl., Loperamid tbl.**

Léky při zácpě



- ***Glycerinové čípky*** mají projímavý efekt, který se dostaví asi 30 minut po jejich zavedení.
- ***Fenolax tbl., Bisakodyl tbl.*** se užívají vždy večer, jejich efekt se projeví zhruba po 8 hodinách.
- ***Regulax, Gutalax, Laxygal*** – jejich efekt se projeví po 8 hodinách od užití.
- ***Pro úspěšnou léčbu zácpy je velmi důležitý dostatečně vysoký příjem tekutin!***
- ***Pozor na závislost!!!***



Léky proti bolesti

- ***Ibalgin tbl., Brufen tbl.*** – lze jej použít proti bolestem nohou, zad, hlavy atd. Také účinně snižuje horečku např. u virových onemocnění. Na cesty je nejlepší forma rozpustná přímo v ústech, která nevyžaduje zapíjení.
- ***Paralen tbl., Panadol tbl.*** – snižuje horečku a pomáhá při bolestech hlavy. Existují také jeho silnější kombinace s dalšími látkami a formy rozpustné ve vodě.
- Pro menší děti existují tyto přípravky ve formě sirupů, nebo rektálních čípků.

Panadol-baby



je určen ke snížení horečky a bolesti provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a očkování. Panadol Baby je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zoubků a bolesti zubů. Přípravek je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 let. Ke snížení horečky po očkování může být podán dětem od 2 měsíců.

Přípravky na odkášlování

Přípravky na tlumení kašle

Přípravky na rýmu, ucpaný nos

Přípravky proti bolesti v krku

Přípravky na stavění krvácení



- Sterilní, vstřebatelná želatinová houba k lokální zástavě krvácení, k tamponádě chirurgických ran, k vyplnění tkáňových defektů při operativních zákrocích nebo extrakcích zubů, k ošetření povrchových ran a k ošetření ran při bércových vředech. **(54,00 Kč)**

Přípravky na podlitiny, podvrtnutí

Dlaha Sam Splint - XL

dlaha SAM® SPLINT - dlaha s univerzálním použitím. Dlaha je RTG průhledná, odolná proti vodě a je opakovaně použitelná. Nepůsobí na ni teplotní extrémny nebo změny nadmořské výšky. velmi skladná, může být srolována, složena nebo použita jako opěra v batozích nebo v soupravě první pomoci.

Délka: 90 cm

Šířka: 14 cm

Tloušťka: 4mm (cena 338,-)





120 Kč




206 Kč

273 Kč



519 Kč





Peha-crepp - 6 cm (Peha-haft - kohezivní obinadlo - 8 cm)

Peha-crepp je elastické fixační obinadlo ze speciální měkké tkaniny s velkým podílem přírodních vláken. Jeho tažnost je cca 160% a vykazuje výborné vlastnosti při nošení.

Použití

K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických a oblých částech těla.

Charakteristika

- Díky vysoké elasticitě tkaniny je možno Peha-crepp aplikovat bez opakovaných otáček jednoduše na všech částech těla. Několik málo otáček stačí k bezpečné fixaci krytí ran.
- Obvazy spolehlivě sedí a nesklouzávají. Elasticita zůstává zachována i při delším používání.
- Peha-crepp se nezařezává, nenarušuje krevní oběh a nebrání v pohybu kloubů.
- Díky volné struktuře tkaniny je obinadlo Peha-crepp obzvlášť lehké, prodyšné a příjemně se nosí.
- Různé úpravy obinadla Peha-crepp jsou k dispozici v kompaktním balení po 100 kusech. Poskytují tak nejen ekonomické, ale i ekologické výhody: kompaktní balení šetří materiál, pomáhá omezovat odpad a snižuje dopravní a skladovací náklady.





