



# ŠOK


# *Co všechno šokem není...*

- psychický otřes
- emocionální vypjetí
- silné rozrušení, rozčilení, nebo úžas

# *Co všechno šokem není...*

- psychický otřes
- emocionální vypjetí
- silné rozrušení, rozčilení nebo úžas

**ŠOK NENÍ DUŠEVNÍ STAV !!!**



# *Definice a rozdělení*

= akutní selhání krevního oběhu s nedostatečnou dodávkou kyslíku a látek nezbytných pro metabolizmus buňky

## **HYPVOLEMICKÝ**

- *pokles cirkulujícího objemu*
- krvácení, popáleniny, průjmy, zvracení, dehydratace

## **DISTRIBUČNÍ**

- *dilatace cév (nepoměr mezi objemem krve a náplní cév)*
- sepse, anafylaxe, neurogenní šok (míšní trauma)

## **KARDIOGENNÍ**

- *selhání srdce jako pumpy*
- infarkt myokardu, akutní chlopní vady, akutní záněty

## **OBSTRUKTIVNÍ**

- *mechanická překážka oběhu*
- plicní embolie, srdeční tamponáda, tenzní PNO

# Příčina šoku

- Nepoměr mezi náplní a kapacitou cévního řečiště.
- Kapacita cévního řečiště je natolik velká, že lze „vykrvácat“ do vlastního řečiště, bez ztráty kapky krve! – povolení tonusu cévní stěny

# Příznaky šoku

## Centrální nervový systém:

úzkost, neklid, podrážděnost → apatie, slabost → bezvědomí  
silná žízeň, nevolnost, zvracení

## Kůže:

chladná, opocená (studený, lepkavý pot)  
bledá → šedá → cyanotická (důsledek zhoršujícího se prokrvení)

## Dýchání:

mělké a zrychlené


## Krevní oběh:

puls je zrychlený a slabý (nitkovitý), ↑100

klesající krevní tlak

zpomalený kapilární návrat (> 2s.)

***tzv. centralizace oběhu***



# *Fáze šoku*

## I. kompenzovaný šok:

- snaha udržet průtok krve životně důležitými orgány (srdce, mozek)
- redistribuce krve, centralizace oběhu

## II. dekompenzovaný šok:

- rozvoj tkáňové hypoxie, poruchy orgánových funkcí

## III. ireverzibilní šok:

- definitivní vyčerpání kompenzatorních mechanismů
- metabolický a energetický rozvrat
- nezvratné změny orgánů
- selhání základních životních funkcí → smrt



# *Prví pomoc*

- 1. léčba vyvolávající příčiny**
  - zastavit krvácení, ošetřit poranění
- 2. kontrola vitálních funkcí**
- 3. protišoková poloha**
  - zlomeniny
  - zvracení
  - kardiogenní šok
- 4. uvolnit oděv**
- 5. péče o tělesnou teplotu**
  - bránit podchlazení i přehřátí
- 6. nejíst, nepít, nekouřit**
- 7. vždy přivolat RZP !!!**



ADAM.

# *Prví pomoc – 5T*

- **TICHO**

- zbavit úzkosti, klid v okolí, přítomnost druhé osoby

- **TEPLO**

- mokrý oděv, přímé slunce, vítr – pokrývka, alufolie

- **TEKUTINY**

- nedávat pít, jen svlažit rty a dutinu ústní, citron

- **TIŠENÍ BOLESTI**

- nepodávat léky; znehybnění, úlevová poloha, obklad

- **TRANSPORT**

- šetrný rychlý převoz ZZS