


MUNI
MED



EMBRYOLOGIE

PRO PORODNÍ ASISTENTKY

PODZIM 2019

MUNI
LÉKAŘSKÁ
FAKULTA

Zuzana Holubcová
zholub@med.muni.cz




- vývoj srdečního a cévního systému - primitivní oběh krevní, přehled vývoje srdce
- fetální oběh krevní a změny po porodu
- přehled hlavních vývojových vad srdce



KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

- je derivován z
- splanchnického mezodermu
- paraxiálního a laterálního mezodermu
- buněk neurální lišty (**neural crest cells**)



Základy cévního systému

• Hematopéza


- vznik a vývoj krve

• Vaskulogeneze

- je proces tvorby cév *de novo* z progenitorů endoteliálních buněk, nezávislý na existenci jiných cév
- časná embryonální perioda od **3. týdne**

• Angiogeneze

- vznik nových cév z již existujících cév (prenatálně i postnatálně)



Základy cévního systému

VASKULOGENEZE


- cévní ostrůvky (*insulae sanguineae*)

- MEZODERM


→ hemangi

angioblasty → endotel cév


hematogenie → krvinky



mesenchymové
buňky



hemangioblasty




tvorba cévní trubice


Základy cévního systému

- **cévní ostrůvky (*insulae sanguineae*)**

- extraembryonální – od D16
 - žloutkový váček
 - zárodečný stvol
 - klaté chorium




- intraembryonální – od D17-18
 - laterální mezoderm kraniální části zárodku




Základy krevního systému

- diferenciací a propojením intraembryonálních ostrůvků se zformují hlavní cévy embrya




- párové aorty a vény splynou za vzniku primitivního srdce, *aorta dorsalis* a *vena cardialis communis*





Vývoj srdeční trubice

- **kardiogenní buňky** derivované ze splanchnického mezodermu, migrují po stranách primitivního proužku kraniálně před orofaryngovou membránu
- zde kardiogenní buňky nejprve zformují pravou a levou endotelovou trubici; ty po následném přiblížení splynou v jednoduchý základ srdeční trubice (*cor tubulare simplex*)
- díky flexi zárodku se perikardiální dutina a základ srdeční trubice přemístí ventrálně pod přední střevo




Vývoj srdeční trubice




Vývoj srdeční trubice

- splývání párových srdečních trubic





- viscerální mezoderm perikardialní dutiny se ztlušťuje a diferencuje v **epimyokardový plášť**, který je od endotelu srdeční trubice oddělen řídkým mezenchymem (**srdeční rosol**)
- z epimyokardu diferencují **myoblasty** a **epikard**
- na konci 4. týdne vývoje lze srdeční činnost detektovat ultrazvukem (**ozvy srdeční**)





Ohýbání srdeční trubice

- kraniální část trubice se ohne ventrálнě, kaudálně a doprava
- kaudální část trubice se posouvá dorzokraniálně a doleva



Ohýbání srdeční trubice

- 35 den vývoje zaujímá arteriální oddíl kraniální pozici, kaudálně se rozkládá ventrikulární oddíl, který vpředu pokračuje v *bulbus cordis* a *truncus arteriosus*



Vznik čtyřkomorového srdce


- **4-8. TÝDEN**

- rozdělení:

- 1) atrioventrikulárního kanálu



- 2) primordiální síně (atrium)

- 3) primordiální komory (ventriculus)




Vznik čtyřkomorového srdce

- **ATRIOVENTRIKULÁRNÍ ROZDĚLENÍ**
 - endoteliální buňky endokardia prochází epitelo-mesenchymální transformací a dají vzniknout **endokardiálním návalkům** (**endocardial cushions**, *tubera endocardiaca atrioventricularia*)
 - podíl buněk **neurální lišty** (*neural crest*)
 - fúze laterálních a ventrálních ztluštění dá vzniknout srdečním septům a trojcípé (vpravo) a mitrální (vlevo) chlopně



Vznik čtyřkomorového srdce


- **ROZDĚLENÍ SÍNÍ**
 - ***septum primum*** vyrůstá z dorzokraniální strany a rozděluje síň na levou a pravou část
 - komunikace pravé a levé části ***foramen primum*** (následně zaceleno)
následně vzniká apoptózou buněk primárního septa ***foramen secundum***
 - ***septum secundum*** - vyrůstá dorzokraniálně až překryje ***foramen secundum***
 - ve volném okraji ***septum secundum*** se nachází oválný otvor ***foramen ovale***
 - horní část ***septum primum*** zaniká



Vznik čtyřkomorového srdce

- ROZDĚLENÍ KOMOR**

- **septum interventriculare** roste z oblasti budoucího srdečního hrotu kraniálně směrem k endokardiálním návalkům
- **foramen interventriculare**
= dočasný otvor v septu
- po jeho uzavření se v místě **foramen interventriculare** objevuje ztenčení **pars membranacea septi interventricularis***







Arteriopulmonární septum a srdeční chlopně

VZNIK ARTERIOPULMONÁRNÍHO SEPTA


- spirálovité valy jsou tvořené mezenchymem derivovaným z neurálních lišť (***neural crest***)

A Ventral view through an embryo at week 5



VZNIK SRDEČNÍCH CHLOPNÍ


- ← mezenchym derivovaný z neurálních lišť (***neural crest****)



* neural crest dává vzniknout i autonomní inervaci srdce

Primitivní krevní oběh

- společný oběh umbilikální, žloutkový a vlastní embryonální



Vývoj velkých cév

AORTÁLNÍ OBLOUKY

- párové spojky mezi vetrálními a dorzálními aortami probíhající v žaberních obloucích
- celkem 6, vznikají a vyvíjejí se v kraniokaudálním směru


1. a 2. → zanikají

3. → *a. carotis communis*
a část *a. carotis interna*

4. → vlevo *arcus aortae*,
vpravo *a. subclavia*

5. → zaniká

6. → *a. pulmonalis (dextra*
a sinistra), vpravo část oblouku
mezi *a. pulmonalis dextrae* a
dorzální aortou obliteruje, vlevo
perzistuje jako ***ductus arteriosus***
(Botalova dučej)



Fetální oběh krevní a změny po porodu

„Zkraty“, které umožňují fungování fetálního oběhu a při narození se uzavírají:

1) **ductus venosus**


- okysličená krev z placenty obchází játra

2) **foramen ovale**

- okysličená krev přechází z pravé rovnou do levé síně a pumpovaná aortou do oběhu


3) **ductus arteriosus**

- spojnice plicnice s aortou,
- neokysličená krev obchází plíce, které nejsou u plodu funkční




Fetální oběh krevní a změny po porodu

UZAVŘENÍ FORAMEN OVALE




Fetální oběh krevní a změny po porodu



PŘED PORODEM




PO PORODU




Hematopoéza



Hematopoéza



Syntéza hemoglobinu



- fetální hemoglobin má větší afinitu pro O₂ než dospělý typ

Vývoj srdečního a cévního systému

First major embryonic organ system to form & begin functioning



Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 8

Heart and embryonic blood vessels begin to develop.

Embryonic circulation is established.

Heart begins to beat.

Cardiac looping completed.

Partitioning of the heart into 4 chambers begins.

Aortic arches undergo primary changes to adult form.

Formation of heart valves is completed.

Videa a animace

Vývoj srdce a cév:

<https://slideplayer.com/slide/3433875/>

<https://www.youtube.com/watch?v=uwswhoKfkmM&feature=related>

<https://www.youtube.com/watch?v=5DIUk9IXUaI>

Aortální oblouky:

http://www.indiana.edu/~anat550/cvanim/tests/no_consent/posttest_aarch.html

Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév


- **vysoká četnost:** přibližně 1,0% živě narozených dětí
 - 8% geneticky podmíněné (trisomie chr. 18, 21, Turnerův syndrom, mutace některých genů -DiGeorgeův syndrom),
 - 2% vlivy prostředí
 - většina –polyfaktoriální původ (klasické teratogeny: thalidomid, virus zarděnek, retinoidy, alkohol, diabetes závislý na inzulínu)
- nezaložení částí kardiovaskulárního systému
- anomální ohnutí srdeční trubice
- nezaložené nebo neúplné přepážky
- perzistence komunikací typických pro fetální období
- zúžení (stenóza) či neprůchodnost (atrézie)
- detekce UZ možná v 17.-18. týdnu
- některé neslučitelné s extrauterinním životem
- výskyt dle četnosti: 1) defekt komorového septa, 2) defekt síňového septa, 3) koarktace aorty, 4) Fallotova tetralogie, 5) transpozice velkých cév

Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév

1. S LEVOPRÁVÝM ZKRATEM (nejčastější)


- okysličená krev proudí z levé poloviny srdce do pravé nebo z aorty do plicní tepny
- zvýšený plicní průtok, chybění cyanózy (u malých defektů) nebo pozdní cyanóza (u velkých defektů)
- důležitá včasná diagnóza a korekce (hypertrofie pravé komory a ireversibilní postižení plicního řečiště)

DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA




morbus Rogeri

DEFEKT SÍŇOVÉHO SEPTA



foramen ovale apertum

OTEVŘENÁ BOTALOVA DUČEJ



ductus arteriosus apertus

Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév


2. S PRAVOLEVÝM ZKRATEM

- složité, kombinované malformace, kdy část žilní krve přestupuje přímo do velkého oběhu
- hypoxie –**cyanóza**

FALOTOVA TETRALOGIE

morbus coerulus

Příčina: posun *septum artericopulmonale*
→ nerovnoměrné rozdělení bulbu



Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév

2. S PRAVOLEVÝM ZKRATEM


- složité, kombinované malformace, kdy část žilní krve přestupuje přímo do velkého oběhu
- hypoxie –**cyanóza**

TRUNCUS ARTERIOSUS PERSISTENS

Příčina:

aorta a truncus pulmonalis neodděleny

- vždy spojeno s defektem komorového septa
 - krev do nerozdělených cév jde z obou komor
(resp. společná komora)
- *kompletní mísení krve*
→ *cyanóza celého těla*



Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév


2. S PRAVOLEVÝM ZKRATEM

- složité, kombinované malformace, kdy část žilní krve přestupuje přímo do velkého oběhu
- hypoxie –**cyanóza**

TRANSPOZICE VELKÝCH CÉV

aorta vystupuje z pravé a *truncus pulmonalis* z levé komory

- pokud jsou komory odděleny bez zkratu → neslučitelné se životem (oddelení malého akrevního oběhu)
- pokud spojena s defektem interventrikulárního či interatriálního septa nebo otevřeným d. arteriosus → řešitelné chirurgicky




Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév

2. S PRAVOLEVÝM ZKRATEM

- složité, kombinované malformace, kdy část žilní krve přestupuje přímo do velkého oběhu
- hypoxie –**cyanóza**

ATREZIE TRUNCUS PULMONARIS

- hypoplasie pravého srdce
- krev do plicních tepen jde pouze skrze *ductus arteriosus*
- otevřené *foramen ovale* je jedinou výtokovou cestou z pravé poloviny srdce




Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév

2. S PRAVOLEVÝM ZKRATEM

- složité, kombinované malformace, kdy část žilní krve přestupuje přímo do velkého oběhu
- hypoxie –**cyanóza**

ATREZIE TROJCÍPÉ CHLOPNĚ

- neprůchodný atrioventrikulární otvor vpravo
- vzácně samostatně, většinou kombinovaná s defekty síňového a komorového septa a otevřeným Botalovým dučejem
- krev z pravé síně přechází rovnou do levé síně
- levá komora vypuzuje krev do amlého i velkého oběhu



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention



Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév

3. VADY BEZ ZKRATŮ

- malý a velký oběh zůstávají odděleny



ATROFIE AORTY

- hypoplazie levého srdce
- široce otevřený *ductus arteriosus*
- zúžený aortální oblouk
- neslučitelné se životem



STENÓZA AORTY / TRUNCUS PULMONALIS

- porucha vývoje semilunárních chlopní (nedomykavost)
- hypertrofie levé/pravé komory
- → zpomalení vývoje




Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév

3. VADY BEZ ZKRATŮ

- malý a velký oběh zůstávají odděleny


KOARKTACE AORTY

- lumen aorty výrazně zúžené
- **preduktální**
- infantilní – nedožívají se dospělosti
- aorta zásobuje jen hlavu a horní končetiny, zbytek těla zásobuje *ductus arteriosus* (cyanóza dolní poloviny těla)



• **postduktální**

- adultní
- vysoký tlak krve v horní a nízký v dolní části těla, vytvořen kolaterální oběh přes aa. *intercostalesa aa. thoracicae int.*
- lze řešit chirurgicky



Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév


3. VADY BEZ ZKRATŮ

- malý a velký oběh zůstávají odděleny

ZDVOJENÝ AORTÁLNÍ OBLOUK

arcus aortae duplex


- zdvojený aortální oblouk
- perzistence 4. arteriálního oblouku vpravo
- může utlačovat tracheu a jícen



PRAVOSTRANÝ AORTÁLNÍ OBLOUK

arcus aortae dexter

- obliterace levého 4. oblouku a dorsální aorta
→ nahrazeny odpovídajícími cévami vpravo
- většinou asymptomatické




Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév

4. POLOHOVÉ ANOMALIE SRDCE

AKARDIE

chybění (nevynutí) srdce




ECTOPIA CORDIS

srdce uloženo na povrchu zárodku



DEXTROKARDIE

- Izolovaná – doprovázena těžkými defekty
- Součást *situs inversus* (bez symptomů)



ADAM.

