

Obecná onkologie

MARKÉTA HERMANOVÁ

Definice nádoru (neoplazie, tumoru)

- Abnormální masa tkáně, jejíž abnormální a nekoordinovaný růst přetrvává i poté, co přestala působit příčina nádor vyvolávající (Willis)
- Nádor je nevratnou/ireverzibilní změnou tkáně
- Nádor roste autonomně, nezávisle na fyziologických stimulech
- Nádor představuje klonální proliferaci expanzi nádorově transformované buňky (=nádor je monoklonální)

Příčiny vzniku nádorů

Genetické a regulační změny → funkční dysregulace dělení a přirozeného zániku buněk

Změny vznikající:

- v průběhu života ve tkáni/orgánu, kde tumor vzniká tzv. **sporadickými mutacemi (mutacemi v somatických buňkách)**
- vrozená mutace – **mutace v zárodeční linii**

Onkogeneze/karcinogeneze

Molekulárni podstata vzniku nádoru



- Onkogeneze je mnohostupňovým procesem na úrovni fenotypické i genotypické
- Neletální genetické poškození (nebo mutace)
 - faktory prostředí (chemické látky zevního prostředí, radiace, viry, hormonální faktory,...)
 - vnitřní faktory (působení toxických radikálů na DNA, ztráta schopnosti DNA reparace, nestabilita genomu, chromosomální přestavby...)
 - mutace v zárodečné linii

Cílové geny genetického poškození

- **Protoonkogeny** (dominantní; podpora proliferace buněk)
- **Tumor supresorové geny** (recesivní; inhibice růstu)
 - Strážci genomu (gatekeepers: *p53*, *RB*)
 - Dozorčí geny (caretakers: udržení integrity genomu a reparace DNA)
- **Geny regulující apoptózu**
- **Geny řídící reparaci DNA**
- **Onkogenní mikroRNA**

Molekulární základ nádoru

Role TSG p53



Dědičná onemocnění/syndromy spojené se zvýšeným rizikem nádorů

AD dědičné syndromy

(alterované antionkogeny, tumor supresorové geny, mismatch repair geny; vrozená mutace v 1 alelu TSG; 2. zásah v somatické buňce)

- *RB* (retinoblastom)
- *p53* (různé tumory – syndrom Li-Fraumeni)
- *p16* (melanom)
- *APC* (familiální adenomatovní polypóza/kolorektální karcinom)
- *NF1/NF2* (neurofibromatóza 1a 2)
- *BRCA1/BRCA2* (karcinom prsu a ovaria)
- *MEN1/RET* (syndrom mnohočetné endokrinní neoplazie 1 (parathyreoidea, pankreas, hypofýza) a MEN2 (medulární ca št. žlázy, feochromocytom,...)
- *MSH2, MLH1, MSH6* (Lynchův syndrom/hereditární nepolopózní karcinom tlustého střeva)
- *DPC4/SMAD4* (juvenilní polypóza střeva/kolorektální karcinom, karcinom endometria)
- *LKB/STK11* (Peutz-Jeghersův syndrom/ca žaludku a střev)
- *VHL* (von Hippel Lindau/ca ledvin)

Familiárně se vyskytující karcinomy

(karcinomy prsu, ovaria a pankreatu)

AR dědičné syndromy

(defektní DNA reparace, DNA instabilita; př. Fanconiho anémie, xeroderma pigmentosum, ataxia teleangiectasia)

Vysvětlení pojmu

Diferenciace: stupeň podobnosti nádorové a normální buňky původu (morfologicky i funkčně); podmiňuje grade tumoru

Anaplastie: ztráta diferenciace

Dysplazie (=intraepiteliální neoplazie (IN)) : ztráta uniformity a architektonického uspořádání epitelových buněk; low grade → high grade dysplazie → *carcinoma in situ* (dysplastické změny postihují celou tloušťku epitelu – preinvazivní neoplazie)

Pleomorfie: jaderná i buněčná variabilita tvarová i velikostní

Histogeneze: tkáňový původ

Metastáza: vytváření nových dceřinných (sekundárních) nádorových ložisek bez morfologické souvislosti s primárním tumorem

Prekancerózy:

premaligní léze či tkáňové změny, ve kterých vznikají nádorové procesy statisticky významněji

Premaligní léze:

- dysplazie/intraepitelové neoplazie
- in situ* karcinomy

Tkáňové změny a chronické záněty

- synonyma*: prekancerózní podmínky, fakultativní prekancerózy, prekancerózy v širším smyslu
- nejeví morfologicky žádné znaky nádorové transformace, statisticky k němu však v těchto lézích častěji dochází

Premaligní léze

Dysplazie/intraepiteliální neoplazie: ztráta uniformity a architektonického uspořádání epitelových buněk

Progrese dysplastických změn/intraepiteliálních neoplazií v invazivní karcinom:

low grade → high grade dysplazie → *carcinoma in situ* → invazivní karcinom (s invazí přes bazální membránu)

carcinoma in situ: dysplastické změny postihují celou tloušťku epitelu – preinvazivní neoplazie, riziko progrese v invazivní karcinom velmi vysoké

pozn. většina low grade dysplazií neprogrese v karcinom, naopak riziko progrese high grade dysplazií a *in situ* karcinomů velmi vysoké

Dysplazie/intraepitelová neoplazie:

ztráta uniformity a architektonického uspořádání epitelových buněk
reflektuje abnormality v proliferaci a diferenciaci buněk

Mitózy

Proliferační aktivita i mimo bazální vrstvu

Ztráta polarity buněk a jejich normální orientace

Zvýšený N/C poměr (nukleo/cytoplazmatický)

Zvětšená nepravidelná jádra s hyperchromazií

Prominující zvětšená jadérka


Nepravidelná stratifikace a abnormální maturace epitelu

Jaderný a buněčný pleomorfismus

Abnormální keratinizace

Redukce až ztráta kohezivity

High grade dysplazie/IN dlaždicového epitelu



Prekancerózy:

Premaligní léze: prekurzory příslušných karcinomů, jejich preinvazivní stádia (=dysplazie/IN)

- Adenomatovní polyp tlustého střeva
- CIN (cervikální IN) , VIN (vulvární IN), PanIN (pankreatická IN), PIN (prostataická IN)
- Atypická duktální a lobulární hyperplazie mammy
- Atypická hyperplazie endometria (EIN)

Tkáňové změny a chronické záněty: se zvýšeným rizikem rozvoje karcinomu v tomto terénu

- Chronická B gastritida (*Helicobacter pylori*)
- Chronická atrofická gastritida (autoimunní)
- Barrettův jícen (GERD)
- Chronická hepatitida B, C
- Chronická pankreatitida
- Ulcerativní kolitida
- Celiakální sprue

Vztah chronického zánětu a karcinogeneze

zvýšená produkce reaktivních oxidativních substancí, cytokinů, prozánětlivých transkripčních faktorů

mediátory zánětu:

- indukce genetického poškození
- indukce buněčné proliferace
- inhibice apoptózy
- regulace nádorové angiogeneze

Příklad onkogeneze: pankreatický duktální adenokarcinom: akceptovaný lineární model progrese

Aktivace onkogenů

K-ras, MYB, AKT2, AIB1


Inaktivace tumor supresorových genů

p16, p53, DPC4, BRCA2, LKB1/STK11

Inaktivace DNA Mismatch Repair genů

MSH2, MLH1,....


Epigenetické změny, dysregulace onkoproteinů, aktivace Notch a Hedgehog signálních drah



Pankreatická intraepiteliální neoplazie (PanIN): low grade (1A, 1B, 2) vs high grade (3)


PanIN-1A

PanIN-1A




PanIN-1B

PanIN-1B




PanIN-2

PanIN-2



PanIN-3 (*in situ* karcinom)





PanIN-3



High grade dysplazie/*in situ* karcinom: preinvazivní stádium karcinomu

Invazivní karcinom: invaze přes bazální membránu

Pankreatická intraepiteliální neoplazie: low grade (1A, 1B) vs high grade (2,3)



Invazivní karcinom

Stavba nádoru a typing

- **Typing:** začlenění nádoru do histogeneticky charakterizované diagnostické skupiny a jednotky
- **Nádorový parenchym** (vlastní proliferující nádorové buňky)
- **Nádorové stroma** (podpůrná tkáň nádoru, její nedílná součást)

Nádorové stroma

- integrální součást komplexního nádorového procesu
- komunikace mezi nádorovými buňkami a extracelulární matrix („vzájemně si prospívají“)
- médium pro přenos humorálních mezibuněčných signálů
- podíl na regulaci proliferace nádorového parenchymu – rezervoár pro růstové faktory
- stromální cévy – význam pro metastazování

Stavba nádoru

Nádory s abundantním parenchymem: měkké, medulární

Nádory s abundantním kolagenním stromatem – s tzv. desmoplastickým stromatem: tuhé, skirhotické

Nádory organoidní (rozdíl mezi stromatem a parenchymem)


Nádory histoidní (setření cytomorfologických rozdílů mezi parenchymem a stromatem).

- Nádory homologní (podoba s místními tkáněmi)
- Nádory heterologní (schází podoba s místní tkání: maligní tumory; dysontogenetické tumory, metaplastické nádory)

Nádorové kmenové buňky/cancer stem cells; CSC (tumor initiating stem cells; T-IS)

- tumorigenní subpopulace nádorových buněk se schopností samoobnovy a diferenciace
- CSC: buňky schopné iniciovat a udržovat nádor; v.s. iniciální cíle transformace
- nádor: klonální proliferace transformované buňky (v.s. potomstvo T-IS)
- CSC: identifikovány v celé řadě nádorů
- CSC: nízká proliferační aktivita
- CSC: odolné vůči konvenční terapii – příčina rekurence nádorových onemocnění
- konvenční terapie malignit zaměřená na proliferující nádorové buňky

Teorie nádorových kmenových buněk



Nádorová multiplicita

Nález více nádorových ložisek

Metastázy – sekundární multiplicita

Primární multiplicita

- primární simultánní multiplicita (výskyt několika nádorů současně; geneticky podmíněná náchylnost k nádorům určitého typu)
- primární simultánní multiplicita lokální (kožní nádory po expozici 1 zevní karcinogenní noxe)
- primární sukcesivní multiplicity

Klasifikace a systematika nádorů

Dělení podle biologického chování:


- benigní
- potencionálně maligní a semimaligní
- maligní

Histogenetická klasifikace (morfologická klasifikace dle tkáňového původu)

- epitelové
- mesenchymové
- neuroektodermové
- embryonální (germinální + orgánově specifické (hepatoblastom, pankreatoblastom, nefroblastom,))
- smíšené

| | | |
|--|---|--|
| Charakteristika nádoru | benigní | maligní |
| rychlosť rústu | pomalá | relativně rychlá |
| mitotická aktivity | nízká; ojedinělé typické mitózy | vysoká; četné i atypické mitózy |
| diferenciace | diferencované | různý stupeň diferenciace |
| jaderná morfologie | často normální | hyperchromazie, ↑N/C, jadérka, ↑bazofilie cytoplazmy, pleomorfie jaderná i buněčná |
| invazivní rúst | ne | ano |
| metastazování | nikdy | často |
| ohraničení | ohraničené, opouzdrené, expanzívne rostoucí | špatně ohraničené, infiltrativní rúst |
| nekrózy | vzácně | často |
| ulcerace pri rústu na kůži a sliznicích | vzácně | často na površích |
| charakter rústu | často exofytický | často endofytický |

Benigní leiomyom vs maligní leiomyosarkom



Semimaligní tumory vs potenciálně maligní tumory

Různá ztráta diferenciace

Často vyšší proliferační aktivita, atypické mitózy

Invazivní růst, špatné ohraňičení, invazivita, někdy částečně expanzivní

Nemetastazují

Basaliom kůže

Diferencované

Bez tkáňové a buněčné atypie

Bez atypických mitóz

Expanzivně rostoucí, častou opouzdřené

Vzácně metastazující

Karcinom ex pleomorfní adenom slinné žlázy

Diferenciace a grading tumorů

Grade 1: dobře diferencovaný nádor



Grade 2: středně diferencovaný nádor

Grade 3: málo diferencovaný nádor

Grade 4: nediferencovaný nádor

Nádory vyššího gradu agresivnější, s horší prognózou.

Dobře diferencovaný adenokarcinom vs nízce diferencovaný adenokarcinom



Duktální adenokarcinom pankreatu

Metastazování

vytváření nových dceřinných (sekundárních) nádorových ložisek bez morfologické souvislosti s primárním tumorem

- Benigní nádory nemetastazují
- Invazivnost maligním nádorů umožňuje metastatické šíření
- 3 cesty metastatického šíření:
 1. Hematogenní (do plic, jater, kostí, mozku,.....)
 2. Lymfogenní (do regionálních lymfatických uzlin)
 3. Porogenní (šíření preformovanými dutinami)

Metastázy

Implatační metastázy:

- v serózních preformovaných dutinách (peritoneální (ca ovaria), perikardiální, pleurální)
- v likvorových a kloubních prostorách
- v prostředí epitelu dutých orgánů např. bronších, vývodných cestách močových, děloze (**porogenní šíření**)

Lymfogenní metastázy

- Regionální lymfatické uzliny; typický pro karcinomy
- Skip metastáza přímo do uzliny vyšší etáže (při obliteraci lymfatik (radiace, zánět); při anastomózách mezi lymfatickým a venózním řečištěm)
- **Sentinelová uzlina** (1. uzlina lymfatického řečiště, do které se dostane lymfa z primárního tumoru; značení, histopatologické vyšetření – maligní melanomy, koloorektální karcinomy,...)
- Zvětšení lymfatické uzliny (1. metastáza; 2. reaktivní změny v LU drénující tumor)
- Retrográdní metastazování (při ucpání lymfatik a obrácení toku lymfy)

Metastázy

Hematogenní metastazování

- do stromálních cév nádoru nebo do cév v okolí nádoru
- typický pro sarkomy, ale i u karcinomů
- venózní metastazování (typ vena cava do plic; typ vena portae do jater)
- arteriální metastazování (při průchodu nádorových buněk plicními kapilárami, při plicních A-V zkratech, otevřeném foramen ovale, vytvořením nádorových embolů ve větvích plicních žil u již vytvořených plicních metastáz)

Metastazování

Selektivní (nejčastější metastazování tumoru do určité vhodné tkáně či místa)

- arcinom prostaty do kostí
- bronchogenní karcinom do nadledvin
- neuroblastom do jater a kostí

Systémové (výhradní metastazování do jednoho systému)

- četné kostní nádory (Ewingův sarkom), gliové nádory

Histohomologní

- do struktur jako byla výchozí tkáň (maligní lymfomy do lymfatických uzlin)

Solitární metastáza (chirurgicky odstranitelná)

Pozdní metastáza (maligní melanom, karcinom z renálních buněk)

Paraneoplastické projevy

Lokální projevy nádorového růstu

+paraneoplastické projevy nádorů

(=znaky a symptomy projevující se ve vztahu k primárnímu nádoru či jeho metastazám)

Příčiny paraneoplastických syndromů

Vasoaktivní látky produkované nádorovými buňkami (např. serotonin, histamin, katecholaminy, prostaglandiny,...)

Ektopická hormonální produkce nádorovými buňkami (ACTH v malobuněčném karcinomu plic – paraneoplastický Cushingův syndrom)

Osteolytické kostní metastázy způsobující hyperkalcémii

Neidentifikované biologicky aktivní působky nádorových buněk nebo cirkulující imunokomplexy (vaskulitidy, nefritidy,...)

Produkce autoprotilátek nádorovými buňkami (paraneoplastická polymyositida, myastenické syndromy, sclerodermie,...)

* muskuloskeletální, neurologické a kožní projevy časté v rámci paraneoplastických syndromů

Histogenetická klasifikace nádorů

MARKÉTA HERMANOVÁ

Klasifikace a systematika nádorů

Dělení podle biologického chování:

- benigní
- potencionálně maligní a semimaligní
- maligní

Histogenetická klasifikace (morfologická klasifikace dle tkáňového původu)

- epitelové
- mesenchymové
- neuroektodermové
- embryonální (germinální + orgánově specifické (hepatoblastom, pankreatoblastom, nefroblastom,))
- smíšené

| | karcinomy | sarkomy |
|------------------------------------|---|---|
| biologické chování | maligní | maligní |
| histogeneze | epitelová tkáň | mesenchymová tkáň |
| predilekční metastázy | lymfogenní (do lymfatických uzlin) | hematogenní (do jater, plic, mozku, kostí,...) |
| věk postižených | obvykle nad 50 let | obvykle pod 50 let |
| frekvence | velmi časté | relativně vzácné |
| <i>in situ</i> forma tumoru | ano (intraepiteliální neoplazie/dysplazie) | ne |

Epitelové nádory

- Z povrchového epitelu (papilom/karcinom)
- Ze žlázového epitelu (adenom/adenokarcinom)
- Specializovaných orgánů (adenom/karcinom)..ledviny, játra,....

Nomenklatura epitelových nádorů

| typ epithelu | benigní | maligní |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| dlaždicový (spinocelulární, skvamózní) | dlaždicobuněčný papilom | dlaždicobuněčný karcinom |
| přechodný (transicionální, uroteliální) | papilom | papilokarcinom |
| basocelulární | (basocelulární papilom) | basocelulární karcinom (basaliom) |
| žlázový (adenomatózní) | adenom | adenokarcinom |
| specializovaných orgánů | hepatocelulární adenom | hepatocelulární karcinom |

Adenomy – benigní nádory ze žlázového epitelu

Adenomy tlustého střeva – adenomatózní polypy:

- tubulární
 - vilózní
 - tubulovilózní
-
- acinární (slinné žlázy)
 - folikulární (štítová žláza)
 - solidní (játra, kůra nadledvin)
 - cystadenom (ovarium): uniloculare, multiloculare; papilliferum, evertens)
 - onkocytární adenom, onkocytom

Adenomatózní polyp tlustého střeva -tubulární adenom




Adenomový polyp




Tubulární adenom, low grade dysplazie

Mnohočetné polypy u familiární adenomatózní polypózy (AD; APC gen)


Folikulární adenom štítné žlázy





Mucinózní vs serózní cystadenom ovaria



17




Onkocytom





Pozitivní průkaz exprese mitochondriálního antigenu

Dlaždicobuněčný karcinom

(kůže, DÚ, hrtan,...; plíce (v terénu dlaždicové metaplazie))




Keratinizace




Intercelulární můstky

Papilokarcinom močového měchýře



Nízce diferencovaný karcinom



V diagnostice nízce diferencovaných nádorů
využití imunohistochemie

Markery epitelové tkáně: cytokeratiny, EMA,
CEA,....

Adenokarcinomy

(maligní, ze žlázového epitelu)

- **Medulární** (převaha nádorových buněk nad stromatem)
- **Skirhotický** (převaha desmoplastického stromatu)


Adenokarcinomy GIT (kolorektální, žaludku):

- Intestinální typ
- Difúzní (skirhotický)
- Mucinózní, gelatinózní


Hepatocelulární karcinom (trabekulární)

Adenoidně cystický karcinom – maligní cylindrom (slinné žlázy, prsní žláza, respirační trakt)


Karcinom žláz mezodermového původu (karcinom ledviny)




Adenokarcinom, intestinální typ



Adenokarcinom – gelatinózní, mucinózní



HE



PAS

Adenokarcinom difúzního typu; z buněk pečetního prstenu

Karcinomy z přechodových epitelálních zón

(přechody slizničních typů, agresivní)

- **kloakogenní karcinom/bazaloidní karcinom**, anorektální oblast)
 - **nasopharyngeální karcinom**
(lymfoepiteliom, Schminkeho typu, EBV+, Čína, Thajsko)
- Metatypický karcinom** (ca baso et spinocellulare mixtum)

Neuroendokrinní neoplazie (NEN)

Definice

NEN jsou epitelové nebo neuroektodermální neoplazie definované přítomností malých nebo velkých vezikulárních granul obsahujících proteiny s hormonálními či neurálními efekty, exprimující markery rozpoznávající membránové proteiny lokalizované buď na malých „synaptických“ granulech (synaptophysin) nebo velkých „hormonálních“ granulech (chromogranin A)

Neuroendokrinní neoplazie (karcinoidní tumory)

Spektrum tumorů od dobře diferencovaných neuroendokrinních neoplazií (dříve karcinoidů) po nízce diferencované malignity s neuroendokrinními rysy (malobuněčný karcinom)

Lokalizace: GIT, respirační trakt,... (z neuroendokrinně diferencovaných buněk v těchto orgánech)

Neuroendokrinní diferenciace (neurosekreční granula v cytoplazmě: chromogranin+, synaptophysin+ ...průkazné imunohistochemicky)

Paraneoplastické syndromy

- karcinoidový syndrom- serotonin (záхватovité zarudnutí kůže obličeje (flush), tachykardie; astmoidní potíže, průjmy, kolikovité bolesti břicha, cyanóza tváří a kůže hrudníku, fibróza trikuspidální a pulmonální chlopně)
- Cushingův syndrom – ACTH
- syndrom z nadprodukce ADH
- Eaton-Lambertův syndrom (autoimunnitní myastenický syndrom (svalová slabost postihující proximální části končetin-protilátky proti presynaptickým kanálům, nedojde k uvolnění acetylcholinu))

Neuroendokrinní tumory (NET) Neuroendokrinní karcinomy (NEC)

Neuroendokrinní tumor - NET G1/G2/G3

dobře diferencované neuroendokrinní neoplazie; low grade (G1/G2) a high grade (G3) malignity
(dříve karcinoidy a atypické, maligní karcinoidy)

Neuroendokrinní karcinom - NEC G3


nízce diferencované neuroendokrinní neoplazie
(neuroendokrinní karcinomy, high grade malignity)

- malobuněčný (ovískový) neuroendokrinní karcinom
- velkobuněčný neuroendokrinní karcinom



Smíšené neuroendokrinní a nonneuroendokrinní neoplazie (MiNEN) (dříve MANEC)

WHO 2010: NET G1/G2; NEC; MANEC)
WHO 2019: NET G1/G2/G3; NEC; MiNEN)

Dobře diferencovaná neuroendokrinní neoplazie – NET (dříve karcinoid)



NEC – malobuněčný typ (malobuněčný karcinom)



Mezoteliom

- Nádory serózních blan: pelury, peritonea, perikardu
- Rizikový faktor: expozice azbestu
- Maligní mezoteliom vysoce agresivní
- Benigní mezoteliomy vzácně se vyskytující:
 - Dobře diferencovaný papilární mezoteliom
 - Tunica vaginalis, oblast genitálu: adenomatoidní tumory = benigní mezoteliomy

Neuroektodermální nádory

- Nádory centrálního nervového systému (CNS)
- Nádory periferního nervového systému (PNS)
- Nádory autonomního nervového systému (ANS)
- Melanocytické nádory

| Tkáň původu | Nádor |
|--|---|
| Gliální buňky | Astrocytom (low grade a high grade) Oligodendrogiom (low grade a high grade) Glioblastom (high grade) (Ependymom) |
| Primitivní buňky neuroektodermálního původu | Medulloblastom (CNS; centrální nervový systém, mozeček) Neuroblastom (PNS; periferní nervový systém, nadledviny, sympatikus) Retinoblastom <i>.....embryonální nádory dětského věku, agresivní</i> |
| Mozkové a míšní obaly | Meningiom (většina grade I (benigní), vzácněji maligní formy) |
| Chorioidální plexus | Papilom a karcinom |
| Obaly periferních nervů | Schwanoma (neurinom), neurofibrom Maligní schwanom, neurofibrosarkom |
| ANS; autonomní nervový systém (sympatikus, parasympatikus) | Paragangliom, chemodectom, pheochromocytom |

+ smíšené glioneuronální nádory (často asociované s epilepsií)
+ pineální nádory

Nádory CNS I.

Astrocytické nádory

- difúzní astrocytom (Grade II)
- anaplastický astrocytom (Grade III)
- glioblastoma multiforme (Grade IV)
- pleomorfní xantoastrocytom (Grade II)
- pilocytární astrocytom (Grade I)
- subependymální obrovskobuněčný astrocytom (Grade I) + tuberózní skleróza

Oligodendroglióní nádory

- oligodendrogliom (Grade II)
- anaplastický oligodendrogliom (Grade III)

Benigní biologické chování pouze WHO GI !!!
Grade II: low grade malignity
Grade III a IV: high grade malignity

Ependymální nádory

- ependymom (grade II)
- anaplastický ependymom (grade III)
- myxopapilárni ependymom (grade I)
- subependymom (grade I)

Nádory z buněk chorioidálního plexu

- Papilom chorioidálního plexu (grade I)
- Atypický papilom chorioidálního plexu (grade II)
- Karcinom chorioidálního plexu (grade III)

Nádory CNS II.

Neuronální tumory a smíšené glioneuronální tumory

- dysplastický gangliocytom mozečku (grade I, germinální mutace v *PTEN* genu)
- gangliocytom (grade I) + gangliogliom (grade I; velmi vzácně grade II-III)
- dysembryoplastický neuroepiteliální nádor (I)
- centrální neurocytom (grade II)




.....

Pineální tumory



Embryonální tumory

- primitivní agresivní maligní nádory dětského věku
- grade IV, nádory „z malých modrých buněk“
- medulloblastom,.....


Glioblastoma multiforme





Glioblastoma multiforme



Oligodendrogiom



Ependymom



Nádory asociované s epilepsií


Obvykle low grade, dobře diferencované, s nízkou proliferační aktivitou a nízkým maligním potenciálem, povrchově lokalizované (korová nebo kortiko-subkortikální lokalizace), **glioneuronální**

Smíšené glioneuronální nádory:


- Gangliogliom (GI, vyjímečně GII-GIII)
- Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor (DNET, GI)

Ostatní vzácněji:


- Pilocytární astrocytom (GI)
- Difúzní astrocytom (GII)
- Oligodendrogiom (GII)
- Pleomorfní xantoastrocytom (GII)
- Subependymální obrovskobuněčný astrocytom (GI ; asociovaný s tuberózní sklerózou)
- Angiocentrický gliom (GI)




Oligodendrogiom




Subependymální obrovskobuněčný
xanthoastrocytom




Pleomorfní xanthoastrocytom



Pilocytární astrocytom




gangliogliom




CD34

- solidní či cystický glioneuronální nádor; iregulární skupiny atypických gangliových buněk a gliální komponenta
- gangliogliomy; vzácně gangliocytomy (pouze neoplastické gangliové buňky)
- WHO GI; vzácně GII a GIII; superficiálně, kortikálně; >70 % v temporálním laloku




- WHO GI, glioneuronální tumor, děti a mladí dospělí
- supratentoriální kortex, predilekčně temporální lalok
- „long-term epilepsy-associated tumor“; LEAT
- komplexní multinodulární a kolumnární architektonika, specifické glioneuronální elementy, (svazky axonů lemované oligodendroglia-like buňkami + „floating“ neurony)


DNET




Nodulární architektonika



Komplexní „pattern“





Kalcifikace v DNETu




NeuN IHC; „floating“ neurony

Pilocytární astrocytom



- WHO GI, relativně dobře ohraničený, pomalu rostoucí, často cystický
- lokalizace: predilekčně podél neuroaxis
- bifazický pattern (kompaktně uložené bipolární bb + mikrocysticky uspořádané řídce celulární oblasti multipolárních bb + Rosenthalova vlákna a eozinofilní granulární tělíska)

Subependymální obrovskobuněčný astrocytom



- WHO GI; tuberózní skleróza
- mutace *TSC1* (9q34) nebo *TSC2* (16p13.3)
- statické: kortikální tubery (hamartomy), subkortikální glioneuronální hamartomy
- subependymální gliální noduly → subependymální obrovskobuněčný astrocytom (SEGA)
- SEGA: benigní, ve stěně postraních komor

Mechanizmy epileptogeneze u LEATs ("long-term epilepsy-associated tumors")?

Low grade tumory, glioneuronální

Temporálně a frontálně, superficiálně lokalizované

Pomalý růst, často FCD perifokálně

Podíl okolní mozkové tkáně, kortextu

(cytoarchitektonické a neurochemické změny v peritumorózním kortextu, fokální kortikální dysplazie)

Podíl neuronální komponenty vlastního tumoru

(neurochemický profil tumoru, přítomnost hyperexcitabilní neuronální komponenty)

Změny cévního zásobení, hypoxie (pH, metabolické změny)

Alterace lokální neuronální sítě (nerovnováha mezi inhibicí a excitací na úrovni receptorů, neuronální i astrocytární)

Nádory mening

Meningiom (Grade I)

- Meningoteliální
- Fibrózní
- Transicionální (smíšený)
- Psamomatózní
- Angiomatózní
- Mikrocystický
- Sekreční

Atypický meningiom + chordoidní a světlobuněčný (Grade II)

Rabdoidní, papilární, anaplastický (Grade III)

+ solitární fibrózní tumor mening, (hemangiopericytom), vzácně sarkomy,....

Nádory PNS



Benigní:

- neurinom (Schwannom, neurilemmom)
- neurofibrom (solitární; mnohočetný (neurofibromatóza))
+ perineuriom, neurotékom, nádor z granulárních buněk

Maligní:

- maligní nádor pochev periferních nervů (maligní Schwannom)
- primitivní neuroektodermální tumor

Neurinom (Schwannom, neurilemmoma)



Nádory autonomního nervového systému


Extraadrenální paranglia (jugulotympická, vagální tělíska, karotická tělisek, laryngeální, aorticopulmonální) – **parasympatikus**

- parangliomy; chemodektomy (karotických tělisek)

Sympatikoadrenální systém


- parangliomy
- feochromocytom (adrenální medulární parangliom s produkcí katecholaminů → záchvatovitá hypertenze)
- neuroblastom → ganglioneuroblastom → ganglioneurom

Neuroblastom



Nádor dětského věku (nadledviny, sympatikus), maligní

Feochromocytom



- Lokalizace v nadledvinách, většinou benigní biologické chování
- Produkce katecholaminů – záхватovitá hypertenze – krvácení do mozku

Melanocytické léze


Benigní:

- piha (ephelides)
- benigní lentigo
- pigmentové névy (junkční, smíšený, intradermální, modrý)
- Spitzové névus
- dysplastický névus

Maligní melanom:

- Nodulární
- Povrchově se šířící
- Lentigo maligna
- Akrolentiginózní melanom

Maligní melanom



Nádory germinální a teratomy


Heterogenní skupina nádorů vycházející z totipotentních buněk na úrovni buněk pohlavních nebo z multipotentních kmenových buněk tkání v na úrovni časných stádií embryonálního vývoje

Diferenciace somatická (teratomy – zralé, nezralé)

Diferenciace extrasomatická (chorionkarcinom, nádor ze žloutkového váčku)

Varlata, vaječníky, mediastinum, retroperitoneum, oblast epifýzy, sakrokokcygeální lokalizace,...

Histogeneze germinálních tumorů



Nádory z germinálních buněk: tumory jednoho histologického typu

Seminom

Klasický (95 %), anaplastický, trofoblastický

Radiosenzitivita

Non-seminomové germinální nádory

Embryonální karcinom

Nádor ze žloutkového váčku

Chorionkarcinom

Teratomy

- Zralé

- Nezralé

- S maligní transformací somatických elementů

Smíšené nádory z germinálních buněk: tumory více než jednoho histologického typu



+ **spermatocytární seminom** (starší muži, lokálně agresivní, nemetastazující, hlenovitého vzhledu, napodobuje časná stádia spermiogeneze)

Charakteristika germinálních tumorů




| tumor | věk | stavba | onkomarker |
|-----------------------------------|-------|--|---------------------|
| Seminom | 40-50 | Solidní, z polygonálních světlých buněk, lymfocytární infiltrace stromatu. | 10 % hCG |
| Embryonální karcinom | 20-30 | Nediferencovaný, pleomorfní bb v pruzích, solidně, tubulárně i papilárně; nekrózy | 90 % hCG a/nebo aFP |
| Nádor ze žloutkového váčku | 3 | Špatně diferencované bb, široké spektrum uspořádání kuboidálních a kolumnárních buněk, glomeruloidní formace | 90 % aFP |
| Choriokarcinom | 20-30 | Cytotroblast a syncytiotroblast bez vilózních formací, hemoragie, nekrózy | 100 % hCG |
| Teratom | * | Tkáně 3 zárodečných listů v různém stupni diferenciace | 50 % hCG a/nebo aFP |
| Smíšené nádory | 15-30 | Variabilní zastoupení komponent; např. teratom+embryonální karcinom | 90 % hCG a/nebo aFP |

* Bez věkové predilekce


Seminom




Germinální tumory – nediferencované: embryonální karcinom




Germinální tumory: extraembryonální diferenciace




Choriokarcinom




Yolk sack tumor



Germinální tumory: intraembryonální diferenciace



Zralý teratom



Nezralý teratom

Extragonadální germinální tumory (EGT)

Nádory z germinálních buněk vznikající primárně v mimogonadální lokalizaci, zejména u mužů

z primordiální germinálních buněk? Chybná migrace? Chybné uložení totipotentních buněk? Germinání buňky v ektopických lokalizacích u zdravých jedinců?

Ve středočarových strukturách (dráhy sestupu germinálních buněk do gonadálního blastému)

Oblast diencefalopineální, sakrococcygeální, v předním mediastinu, retroperitoneu,..., thymus, prostata, žaludek,.....

Seminomové i neseminomové, čisté i smíšené

Prognosticky obecně horší, vyjímkou jsou seminomové EGT

Děkuji za pozornost....