


# GIT II

Obecná stavba dutých orgánů



Mikroskopická stavba trávicí trubice

- jícen
- žaludek
- tenké a tlusté střevo
- rektum



Úvod do embryologie GIT

# DUTÉ ORGÁNY





## Čtyři základní vrstvy

**1. Mukóza** (Tunica mucosa)

**2. Submukóza** (Tela submucosa)


**3. Tunica muscularis externa**

**4. Seróza/adventicie**



Donna Myers © 2007



# OBECNÁ STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE



## Sliznice - mukóza (Tunica mucosa)

- vnitřní vrstva trávicí trubice vystýlající lumen
- protektivní, absorpční a resorpční funkce
- mikroskopická stavba závisí na lokalizaci



- Lamina **epithelialis** mucosae
- Lamina **propria** mucosae
- Lamina **muscularis** mucosae



## Sliznice - mukóza (Tunica mucosa)

### - **Lamina epithelialis** mucosae

- charakter epitelu určený funkcí daného oddílu trávicí trubice
- ústní dutina, farynx, jícen, anus – **vrstevnatý dlaždicový** (nerofovějící)
- žaludek, tenké a tlusté střevo – **jednovrstevný cylindrický**
- **hlen** – produkovaný slizničními nebo podslizničními žlázkami (ústní dutina, jícen), sekrečním epitelem (žaludek) nebo pohárkovými buňkami (střevo)




### - **Lamina propria** mucosae

- vrstva **slizničního** vaziva – řídké kolagenní vazivo
- fenestrované krevní kapiláry – odvod metabolitů (střevo)
- v některých oddílech slizniční žlázky (jícen)
- inervace, komponenty imunitního systému



### - **Lamina muscularis** mucosae

- tenká vrstva hladkých svalových buněk
- drobné mechanické pohyby mukózy usnadňující sekreci a absorpci (nezávisle na peristaltice)




## Submukóza (Tela submucosa)

### Podslizniční vazivo



- výrazná vrstva řídkého kolagenního vaziva
- určuje celkový tvar sliznice (slizniční řasy)
- větší krevní a lymfatické cévy, které zásobují t. mucosa, muscularis externa a serózu

### Inervace

- nervová pleteň **plexus submucosus Meissneri**
  - = skupinky multipolárních neuronů a malých ganglií), viscerální senzorická vlákna (sympatikus) i vlákna a terminální ganglia parasympatiku = enterický nervový systém
- sekreční aktivita




- Žlázy** – v závislosti na oddílu trávicí trubice
  - protektivní funkce (mucinózní)




## Zevní svalová vrstva (Tunica muscularis externa)


- dvě koncentrické, relativně silné vrstvy hladké svaloviny, oddělené tenkou vrstvou vaziva
- vnitřní – **cirkulární**, vnější – **longitudinální** (spirála)
- myenterický (Auerbachův) plexus
- peristaltika – pasáž obsahu trávicí trubice
- lokální modifikace m.e.
  - faryngoesofagální sfinkter + externí anální sfinkter – kosterní svalovina
  - žaludek – třetí - šikmá - vrstva svaloviny
  - taenie coli – zesílená část longitudinální vrstvy v tlustém střevě



Cirkulární



Longitudinální



## Seróza/Adventicie (Tunica serosa/adventitia)


- vnější vrstva trávicí trubice

### - Seróza




- serózní membrána tvořená řídkým kolagenním vazivem (*Lamina propria serosae*) a jednovrstevným dlaždicovým epitelem (*L. epithelialis serosae*)
- syn. mesothelium, viscerální peritoneum
- přechází v mezenterium
- serázou – z mezenteria do stěny trávicí trubice prochází velké krevní a lymfatické cévy a nervy
- bariéra vůči patogenům, antiadhezivní vlastnosti – intracoelomový pohyb, imunitní funkce (Ag prezentace), produkce ECM, atd.

### - Adventicie

- některé části trávicí trubice nejsou kryté serázou
- hrudní část jícnu, části trávicího traktu v břišní a pánevní dutině v místě fixace (duodenum, část tlustého střeva, rektum a anální kanál)
- pouze konektivní tkáň přecházející do konektivní tkáně stěny



## Seróza/Adventicie (Tunica serosa/adventitia)



## Enterický nervový systém

- intramurální, autonomní NS
- $100 \times 10^6$  neuronů
- nervové pleteně:
- sympatikus – větve splanchnických nervů, parasympatikus – X. hlavový nerv

### Plexus submucosus


- vnitřní (Meissnerova) a vnější podslizniční pleteň, inervují muscularis mucosa a cirkulární vrstvu muscularis externa
- sekrece

### Plexus myentericus (Auerbachii)

- tunica muscularis, inervuje obě svalové vrstvy
- peristaltika

### Intersticiální (Cajalovy) bunky




- pacemaker ENS
- spojují ENS a svalové buňky
- koordinují a vyvolávají peristaltiku



## Enteroodokrinní systém

- produkují střevní hormony – endokrinní nebo parakrinní sekrece
- peptidy nebo biogenní aminy (histamin, serotonin)
- minoritní, obsahují sekreční granula klasické histologické metody  
rozlišují různé typy buněk na základě rozdílné affinity k různým barvivům
- DNES/APUD
- GIT chemosensing

Typ	Hormon	Lokalizace/funkce
D buňky	Somatostatin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žaludek, střevo, jaterní a pankreatické vývody</li> <li>- Jako D buňky Langerhansových ostrůvků v pankreatu</li> </ul>
EC buňky	Serotonin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žaludek, střevo, žlučník</li> <li>- Peristaltika</li> </ul>
ECL buňky	Histamin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žaludek</li> <li>- Sekrece HCl</li> </ul>
G buňky	Gastrin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pars pylorica, duodenum</li> <li>- Sekrece HCl, pepsinu</li> </ul>
L (EG) buňky	Enteroglukagon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Žaludek, střevo</li> <li>- Tlumí sekreci pankreatických enzymů a peristaltiku</li> </ul>



# **Mikroskopická anatomie trávicí trubice**

# HLTAN - PHARYNX

## - pars nasalis





- víceřadý cylindický epitel s řasinkami
- seromucinózní žlázy

## - pars oralis et laryngea

- nekeratinizující vrstevnatý dlaždicový epitel
- mucinózní žlázy

- kolagenní vazivo (lamina propria), podslizniční vazivo chybí

- kosterní svalovina





# JÍCEN - OESOPHAGUS

## - Mukóza

- nekeratinizovaný vrstevnatý dlaždicový epitel → protektivní funkce (mechanická odolnost)
- I. propria a I.muscularis mucosae silnější než jinde v GIT
- distálně mucinózní gll. esophageae cardiacae

## - Submukóza


- řídké kolagenní vazivo, určuje tvar lumen (slizniční řasy)
- krevní a lymfatické cévy, plexus submucosus Meissneri
- submukózní žlázy (tubulózní mucinózní)
- difúzní lymfatická tkáň



# JÍCEN - OESOPHAGUS

## - Muscularis externa

- vnitřní cirkulární a vnější longitudinální vrstva
- inervace – plexus myentericus Auerbachi
- horní třetina – kosterní svalovina, střední třetina – smíšená – kosterní + hladká, dolní třetina – pouze hladká svalovina




# JÍCEN - OESOPHAGUS

## Adventicie

- krční a hrudní úsek – spojuje jícen s okolím
- řídké kolagenní vazivo


## Séróza

- po průchodu bránicí




# JÍCEN – KARDIO-ESOFAGÁLNÍ JUNKCE

Nekeratinizovaný vrstevnatý dlaždicový epitel → jednovrstevný cylindrický epitel



# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER

- obecná stavba dutého orgánu
- anatomické oddíly se liší i histologickou stavbou
- slizniční řasy – rugae gastricae (submukóza)
- objemová flexibilita
- ghrelin
- GALT




▲ Light micrograph (LM) of the stomach wall showing four concentric layers at low magnification. A thick mucosa (formed mostly of tightly packed gastric glands) lines the lumen (\*). The rectangle indicates a ruga consisting of a submucosal connective tissue core covered by mucosa. A thick layer of mucus secreted by surface cells forms a barrier over the mucosa for protection of tissues from acid and proteolytic enzymes in the lumen. The submucosa (SM) has prominent blood vessels (BV). Serosa covers the muscularis externa (ME) externally. 10x. H&E.

# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER

## Sliznice žaludku

- jednovrstevný cylindrický epitel
- povrchový epitel produkuje souvislou vrstvu hlenu (mucinogenní granula, vysoký obsah  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{K}^+$ )  
= protektivní funkce
- areae gastricae (1-6 mm), foveolae gastricae





# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER

## Sliznice žaludku

- L. **propria** obsahuje velké množství žláz:




- Gl. cardiacae
- Gl. pyloricae
- Gl. gastricae propriae





# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER

## Gl. gastricae propriae

- žlázky fundu a těla žaludku
- tubulózní, jednoduché nebo ke konci rozvětvené,  
ústí po 2-7 na dno žaludečních jamek
- $15 \times 10^6$
- **více funkčních typů buněk**





# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER



# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER

## Fundus




# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER

## Gl. gastricae propriae

### Hlavní buňky (pepsinogenní, zymogenní)

- nejpočetnější, dolní úsek těla žláze a fundus
- pyramidový tvar, bazofilní cytoplasma, RER, pepsinogenní granula
- pepsin, lipáza



### Krycí buňky (parietální, oxyntické)

- přechod krčku a těla
- eosinofilní, velké množství mtch. a SER
- složitá dynamická ultrastruktura
- intracelulární kanálky v apikální části s mikrovlákny – membránově vázané enzymové komplexy produkující  $H^+$  a  $Cl^-$

### Enteroendokrinní buňky

- serotonin, gastrin, histamin



### Mucinózní buňky krčků


- kubické, mukus

### Kmenové buňky žaludeční sliznice



- málo početné, nízce cylindrické
- schopnost regenerace žaludeční sliznice



Krycí buňka  
x10200





Krycí buňka  
x100 000





# ŽALUDEK – VENTRICULUS, GASTER


## Jak to v žaludeční sliznici funguje?



## A proč je to důležité?

H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> ATPase inhibitory (Omeprazol)







<https://www.youtube.com/watch?v=XhB7WNJVg3U>




# OBECNÁ STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE - STŘEVO



# OBECNÁ STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE - STŘEVO



# TENKÉ STŘEVO – GASTRO-DUODENÁLNÍ SPOJENÍ




# TENKÉ STŘEVO – ADAPTACE K RESORPCI

Čtyři základní vrstvy: **sliznice, podslizniční vazivo, zevní svalovina, seróza**

sliznice a podslizniční vazivo vytvářejí útvary sloužící k maximálnímu zvětšení resorpční plochy:

- **plicae circulares** (Kerckringi) – **podslizniční vazivo + sliznice**, celkem asi 800, zvětšení plochy **2-3x**, distální část duodena



- **klky** (villi intestinales) – **sliznice** (l. propria + epitel) 0,5-1,5 mm dlouhé,  $10-40/\text{mm}^2$ , celkem asi 4 mil., zvětšení plochy **5-10x**
- **mikroklky** (žíhaná kutikula/žíhaný lem) – **apikální povrch enterocytů** – mikroklky jsou 1- 2  $\mu\text{m}$  dlouhé a 0,1  $\mu\text{m}$  široké,  $100 \text{ mil.}/\text{mm}^2$ , zvětšení plochy **20x**

# TENKÉ STŘEVO – ADAPTACE K RESORPCI



plicae circulares (Kerckringova)  
– 2-3x

klky (villi intestinales)  
– 5-10x

mikroklky (žíhaná kutikula)  
– 20x





Lieberkühnovy krypty




200-600x

## Lieberkühnovy krypty (gl. intestinales)

- jednoduché slizniční tubulární struktury, hluboké 0,3-0,5 mm
- procházejí I. propria a otevírají se do lumen střeva
- obsahují různé buněčné typy
  - sekrece trávicích enzymů
  - obnova epitelu
  - enteroendokrinní buňky
  - imunitní odpověď




# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE


## Enterocyty

- vysoké, cylindrické buňky
- bazálně uložené jádro
- modifikace apikálního povrchu – mikroklky (3000) + glykocalyx ( $0,5\mu\text{m}$ ) = žíhaný lem (kutikula)
- těsná vzájemná spojení, interdigitace




## Funkce:



- trávení – enzymatické komplexy na membráně mikroklků
- absorpce a transport – pasivní, facilitovaný i aktivní
- zpracování lipidů- chylomikry




▲ EMs of enterocytes at low (Left) and high (Right) magnification. Apical microvilli (MV) make up a striated border and extend from free surfaces of the cells. A fuzzy glycocalyx (GI) covers them. A terminal web (TW) of actin filaments in the apical cytoplasm reaches into microvilli. Intercellular junctions (circles) are between adjacent cells. The cytoplasm contains mitochondria (Mi), lysosomes (Ly), and smooth (SER) and rough (RER) endoplasmic reticulum. **Left:** 10,000×; **Right:** 50,000×.





	Day 1	Day 5
Apical	79 %	18 %
Lateral	15 %	1 %



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE



## Transport a resorpce – koncentrační gradienty



Transport of glucose from intestinal lumen to blood stream

**Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> ATPase** - basolateral surface - concentration gradient Na<sup>+</sup> and K<sup>+</sup>

K<sup>+</sup> gradient generates negative membrane potential

Na<sup>+</sup>/glucose symport on apical surface

Facilitated diffusion by glucose uniporter (GLUT2) in basolateral membrane


Acidification of stomach fluid by parietal cells

Apical membrane - H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> ATPase + Cl<sup>-</sup> a K<sup>+</sup> canals



Basolateral membrane – anion antiporter HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> and Cl<sup>-</sup> ions

Combined activity of ion channels a cells keeps the electroneutrality and neutral cytoplasmic pH while reaching high extracellular concentration of H<sup>+</sup> and Cl<sup>-</sup> in lumen of stomach


## Transport a resorpce - tuky



© 2011 Pearson Education, Inc.







## Transport a resorpce - tuky



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE


## Pohárkové buňky

- cylindrické žlázové epiteliální buňky
- apikální povrch - apokrinní/merokrinní sekrece mucinu
- bazální část – RER, GA, jádro, mitochondrie
- mucinogenní zrna
- viz přednáška Epitely




# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE

## Pohárkové buňky





▲ LM of the colonic mucosa. Surface epithelium containing goblet cells (G) and enterocytes (En) invaginates to form an intestinal crypt. The lamina propria (LP), with capillaries (arrows) and larger blood vessels (BV), is richly cellular. 600 $\times$ , Toluidine blue.



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE

## Panethovy buňky



- bazální část Lieberkühnových krypt
- bazofilní cytoplasma
- GA uložené nad jádrem
- intenzivně acidofilní (červená) granula
- role v imunitním systému
- sekreční granula obsahují biologicky účinné látky (lysozym)
- ovlivňují střevní mikroflóru
- podílejí se na definici SC niche



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE



## Enteroodokrinní buňky

- podobné žaludečním enteroendokrinním buňkám
- regulace pankreatické sekrece
- udržení homeostázy (osa mozek-střevo-tuková tkáň)
- cholecystokinin, sekretin, GIP, motilin, neurokrinní peptidy atd.



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNICE



## Enteroodokrinní buňky



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNIČNÍ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ

## Slizniční vazivo – L. propria



- retikulární vazivo
- složky imunitního systému – GALT
- imunologická bariéra
- Peyerovy plaky
- 70-100 (až 200) – duodenum < jejunum < ileum
- lymfatické uzlíky s B-lymfocyty, makrofágy a dendritickými buňkami
- interfolikulárně navíc T-lymfocyty
- epitel nad Peyerovými plaky obsahuje velké množství M-buněk





# TENKÉ STŘEVO – SLIZNIČNÍ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ

## M buňky (microfold)


- epiteliální buňky nad Peyerovými plaky a lymfatickými uzlinami
- nemají mikroklky
- indukují imunitní odpověď
- MHCII
- zprostředkovávají antigenní prezentaci dendritickým buňkám a lymfocytům



# TENKÉ STŘEVO – SLIZNIČNÍ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ




Pohárková buňka      Mukus      ZO      Intraepiteliální lymfocyt      M-buňka



Makrofágy a plazmatické buňky (IgA)

Jejunum




Souvislá bazální lamina

Ileum

Lymfocyty


Nesouvislá bazální lamina




# TENKÉ STŘEVO – REGENERACE SLIZNICE

## Kmenové buňky


- Lieberkühnovy krypty
- zajišťují obnovu střevního epitelu (4-5 dní)
- morfologicky neodlišitelné, definované na základě „kmenového“ charakteru = schopnost diferenciace a zároveň sebeobnovy
- stem cell niche



Nature Reviews | Molecular Cell Biology




# TENKÉ STŘEVO – REGENERACE SLIZNICE



# TENKÉ STŘEVO – REGENERACE SLIZNICE

## Cellular alterations



Relationship between intestinal stem cell genetic alterations and colorectal cancer development. Step1: Sequential mutations of *APC*, *p53*, *Smad4* and *Kras* in ISCs; Step2: Normal ISCs are converted into CSCs; Step 3: By using the feeding from niche cells, CSCs expand their numbers along with producing daughter cells to form a solid tumor; Step 4: Upon escaping from their primary sites, some CSCs will systematically migrate into other organs to form metastatic lesions. ISCs: Intestinal stem cells.

# TENKÉ STŘEVO – PODSLIZNIČNÍ VAZIVO

## Brunnerovy žlázy - gl. duodenale Brunneri

### duodenum

- drobné rozvětvené tuboalveolární žlázy, tvořené cylindrickými mucinózními buňkami
- vazivo redukováno na tenká septa mezi žlázovými lalůčky
- vývody ústí do Lieberkühnových krypt
- zásaditý sekret pH 8.1-9.3
- neutralizace žaludeční šťávy
- ochrana střevní sliznice, aktivace trávicích enzymů, baktericidní účinky




## Muscularis externa

- dvě vrstvy hladkého svalstva (vnitřní cirkulární, vnější longitudinální)
- plexus myentericus Auerbachi


## Seróza

- řídké kolagenní vazivo + jednovrstevný dlaždicový epitel (mezotel)




# TLUSTÉ STŘEVO

- absence Kerckringových řas, klků
- muscularis externa – longitudinální vrstva tvoří taenie coli
- seróza na povrchu vybíhá v appendices epiploicae (tukové vazivo)





Tenké střevo



Tlusté střevo


# TLUSTÉ STŘEVO – SLIZNICE

- absorpce vody a elektrolytů
- výrazně hlubší Lieberkühnovy krypty bez Panethových buněk
- četné pohárkové buňky
- četné lymfatické folikuly v I. propria (GALT)




# TLUSTÉ STŘEVO - APPENDIX

- červovitý výběžek slepého střeva 8-10 cm (0,5-1cm)
- souvislá longitudinální vrstva m. externa
- velký počet lymfatických uzlíků které zasahují do submukózy
- Lieberkühnovy krypty nepravidelného tvaru, obsahují Panethovy buňky





# TLUSTÉ STŘEVO - REKTUM

- Poslední úsek tlustého střeva → shodná histologická stavba
- **Pars pelvina** (ampulla recti)
  - histologická stavba shodná se stavbou tlustého střeva
  - (3) plicae transversae recti (sup., med., inf.), základem je cirkulární vrstva t. muscularis ext.
- **Anorektální junkce**
- **Canalis analis**
  - anulus hemoroidalis – mizí L. krypty a jednovrstevný cylindrický epitel je postupně nahrazený vrstevnatým dlaždicovým epitelem a epidermis (linea dentata)
  - podélné slizniční řasy - columnae anales, mezi nimi sinus anales
  - valvuale anales na zakončení sinus anales  
→ linea dentata
  - bohaté žilní pleteně, proktodeální žlázky
  - cirkumanální apokrinní žlázy
  - m. sphincter ani internus (t. muscularis ext.)
  - m. sphincter ani externus (příčně pruhovaná svalovina)
  - vysoká submukóza → prolaps
  - různá terminologie zón canalis analis



# TLUSTÉ STŘEVO – ANOREKTÁLNÍ SPOJENÍ




Orgán	Oblast	Mukóza			Submukóza	Muscularis externa	Seróza/ Adventicie	
		LEM	LPM	LMM				
Jícen	1/3	vrstevnatý dlaždicový e.		úplná	gll. oesophageales	kosterní	A	
	2/3		glandulae oesophageae cardiacae			obě		
	3/3					hladká	S	
Žaludek	kardie	jednovrstevný cylindrický e.	gll. cardiacae	úplná		tři vrstvy šikmá, cirkulární, longitud.	S	
	fundus/ corpus		gll. gastricae propriae					
	pylorus		gll. pyloricae					
Tenké střevo	duoenum	jednovrstevný cylindrický e. kartáčový lem pohárkové buňky	L. krypty klky	úplná	gll. duodenales (Brunneri)		A+S	
	jejunum		Peyerovy plaky		plicae circulares		S	
	ileum							
Colon a rectum	appendix	jednovrstevný cylindrický e. kartáčový lem pohárkové b.	lymf. uzlíky	neúplná	lymf. uzlíky	souvislá	S	
	caecum		chybí klky	úplná		taenie coli	A+S	
	colon						A+S	
	rectum	columnae rectales					A	
Canalis analis	anorektální/ anokutánní	vrstevnatý nerohovějící dlaždicový e.	žilní pleteň	neúplná - chybí	podélné slizniční řasy žilní pleteň	vnitřní sfinkter	A	
	zona cutanea	vrstevnatý rohovějící dlaždicový e.	vlasové folikuly, potní žlázy					

# **Vývoj trávící trubice**

# VÝVOJ TRÁVICÍ TRUBICE

- trávicí trubice vzniká v důsledku cefalokaudální a laterální flexe embrya
- ústní dutina a proktodeum – ektoderm
- **primitivní střevo** – entoderm
- žlázový parenchym (pankreas, játra) vzniká z entodermu trávicí trubice



# VÝVOJ TRÁVICÍ TRUBICE

3 základní oddíly primitivního střeva:



## přední střivo

– od bukofaryngeální membrány kaudálně po jaterní divertikulum

## střední střivo

## zadní střivo

– od levé třetiny transversálního tlustého střeva po kloakovou membránu



# VÝVOJ TRÁVICÍ TRUBICE

## Pharynx


- faryngový aparát

## Jícen

- z úseku předního střeva kaudálně od laryngotracheální výchlipky
- entoderm (epitel a žlázy), vazivová složka mesenchym

## Žaludek




- vzniká koncem 4. týdne jako rozšíření předního střeva
- původně symetrický,
- různá rychlosť růstu dorsální a ventrální strany → změna tvaru (velká a malá kurvatura)
- během vývoje rotace podél podélné
- definitivní poloha i tvar koncem 2. měsíce i.u.




# VÝVOJ TRÁVICÍ TRUBICE

## Střevo

- střední střevo – duodenální a pupeční klička
- rotace během vývoje
- fyziologická pupeční hernie





A grayscale image of a developing embryo, likely a chick embryo, viewed from above. The embryo is oriented vertically. A prominent, light-colored, C-shaped structure, representing the midgut, is visible at the top. Below it, a long, thin, dark tube represents the foregut. The midgut is shown in the process of rotating counter-clockwise, which is a key developmental event.

# Embryological Rotation of the Midgut

<https://www.youtube.com/watch?v=cBSyOgjTGVU>

# MIKROSKOPICKÁ STAVBA A VÝVOJ TRÁVICÍ TRUBICE - SHRNUTÍ

## Mikroskopická stavba trávicí trubice

- **Obecná stavba dutých orgánů vč. trávicí trubice:** mukóza (l. epithelialis m., l. propria, l. muscularis m.), submukóza, t. muscularis externa, serosa (l. propria s., l. epith. s.), adventicia
- **Jícen** - stavba, epitel, mukózní a submukózní žlázy, rozdíly v t. muscularis ext., změny v typu epitelu v oblasti kardie
- **Žaludek** – anatomické a histologické členění, stavba sliznice - areae gastricae, foveolae gastricae, žaludeční žlázy (pyloricae vs. propriae), lokalizace, ultrastruktura a funkce buněk gl. propriae (hlavní, krycí, bb. krčků, enteroendokrinní)
- **Tenké a tlusté střevo, appendix** - anatomické a histologické členění, stavba sliznice, žlázy (Lieberkühnovy krypty, Brunnerovy žlázy), buněčné typy ve střevní sliznici, lymfatický systém, modifikace střevní stěny
- **Rektum a anální kanál** - anatomické a histologické členění, stavba sliznice, změny v typu epitelu
- Vaskularizace a inervace GIT

## Embryonální vývoj

- Vznik **primitivního střeva** a jeho deriváty, diferenciace a charakteristika jednotlivých oddílů, základy přidružených orgánů

# Děkuji za pozornost

Petr Vaňhara, PhD  
Ústav histologie a embryologie  
LF MU

[pvanhara@med.muni.cz](mailto:pvanhara@med.muni.cz)  
<http://www.med.muni.cz/histology>



*With the chest cavity open and the heart fully exposed,  
Dr. Robbyn suddenly regretted cutting class to go pub crawling  
that crisp fall day four years ago.*