

SENIOR – CESTOVATEL, ZDRAVOTNÍ RIZIKA



PROČ SENIOŘI CESTUJÍ?

- SPLNĚNÍ SNU
- POZITIVNÍ NÁBOJ
- ZMĚNA PROSTŘEDÍ
- EKONOMICKÁ SITUACE
- SPOLEČNOST STEJNĚ ZALOŽENÝCH LIDÍ

***DOBŘE NAPLÁNOVANÁ A ADEKVÁTNĚ
ZAJIŠTĚNÁ CESTA OBVYKLE
PŘEDSTAVUJE PRO SENIORA
MINIMÁLNÍ RIZIKO***



KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO I

- PŘEVAHA SYMPATIKU
- SNÍŽENÍ TLAKU V KABINĚ (2440M.N.M.)
- SNÍŽENÍ SATURACE O 3-4%
- STEJNĚ REAGUJÍ I MLADŠÍ JEDINCI

***V DEN PŘÍLETU DOPORUČOVÁNA JIŽ JEN
MINIMÁLNÍ ZÁTĚŽ***

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO II

- ECONOMY-CLASS SYNDROM – RIZIKO
TEN
- VÁŽE SE I K DLOUHÝM CESTÁM
AUTOBUSEM!!
- ZAHRNUJE I ISCHEMICKÉ MOZKOVÉ
PŘÍHODY
- LÉPE BUSINESS CLASS, VLAKOVÁ
DOPRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO III

➤ RIZIKA TEN

- ✓ SNÍŽENÍ TLAKU V KABINĚ
- ✓ POTENCIACE DEHYDRATACE KLIMATIZACÍ
- ✓ OMEZENÍ POHYBU
- ✓ DŘÍVĚJŠÍ TEN, TROMBOFILNÍ STAVY
- ✓ DIABETES MELLITUS
- ✓ OBEZITA
- ✓ KOUŘENÍ
- ✓ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN



PREVENCE TEN NA CESTÁCH

- ✓ DOSTATEČNÝ PŘÍVOD TEKUTIN
- ✓ PODPORA SVALOVÉ PUMPY – VSTÁVÁNÍ, PROCHÁZENÍ SE, DORSÁLNÍ FLEXE PLOSEK DOLNÍCH KONČETIN
- ✓ BANDÁŽE, KOMPRESIVNÍ PUNČOCHY PŘI CHVI
- ✓ NÍZKOMOLEKULÁRNÍ HEPARIN UČINĚJŠÍ NEŽ ASA

**„DLOUHÁ CESTA“ – SENIOR BEZ RIZIKA –
DÉLE NEŽ 5 HOD, S RIZIKEM – DÉLE NEŽ 2
HOD**

KOMPLIKACE HYPERTENZE

- PERIFERNÍ VAZODILATACE – SNÍŽENÍ TK
- ROZRUŠENÍ – ZVÝŠENÍ TK
- PŘI LÉČBĚ BETABLOKÁTORY – V HORKU SE SNÍŽÍ TK, ALE REAKCE TF JE POMALÁ A NÍZKÁ – SYNKOPA
- ZMĚNA TEPLoty OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ – V TEPLE POKLES TK – NUTNOST REDUKCE ANTIHYPERTENZIV, EVENT. I DIURETIK

***HYPERTONIK BY MĚL NA CESTY VYJÍŽDĚT
S PŘEZKOUŠENÝM MANŽETOVÝM
TONOMETREM***

RIZIKO IM V PRŮBĚHU CESTY

- KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ CESTY BEZ PŘÍPRAVY
- NEOBVYKLÁ DESTINACE
- NIŽŠÍ VZDĚLÁNÍ
- ŽIVOT V PARTNERSKÉM SVAZKU
- BYDLENÍ V PŘÍVĚSU NEBO VE STANU
- VZNIK ČASTĚJŠÍ V PRVNÍCH DVOU DNECH

ARYTMIE NA CESTÁCH

- CHRONICKÁ SUBKLINICKÁ DEHYDRATACE (CAVE DIURETIKA)
- POHOTOVOST K IONTOVÉ DYSBALANCI
- PRŮJMY, ZVRACENÍ
- VYNECHÁNÍ DIURETIK PŘED DELŠÍ CESTOU
- ZMĚNA ÚČINNOSTI ANTIARYTMIK VLIVEM JINÉHO SLOŽENÍ STRAVY
- PŘEVAHA SYMPATIKU

OBĚHOVÉ SELHÁNÍ

- VYNECHÁNÍ DIURETIK (OBAVA Z MIKCE PŘI CESTOVÁNÍ)
- ZVÝŠENÁ FYZICKÁ ZÁTĚŽ
- DEKOMPENZACE HYPERTENZE
- ZMĚNA TELOTY OKOLÍ - HORKÉ PROSTŘEDÍ
- INTERKURENTNÍ INFEKCE



PRŮJMOVITÁ ONEMOCNĚNÍ SENIORŮ NA CESTÁCH

- 6,5X VYŠŠÍ PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU NEŽ DOMA
- FURIANTSTVÍ – HYGIENA RUKOU, NEDODRŽOVÁNÍ DOPORUČENÍ, UŽÍVÁNÍ VODY Z KOHOUTKU
- ✓ DEHYDRATACE, IONTOVÁ DYSBALANCE
- ✓ ARYTMIE, KARDIÁLNÍ DEKOMPENZACE
- ✓ ZMĚNA EFEKTIVITY ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY

***DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH DOPORUČENÍ
VÝZNAMNĚ SNIŽUJE POČET NÁVŠTĚV PL***

VAKCINACE

- ❖ PRAVIDELNÁ OČKOVÁNÍ PROBĚHLA U SOUČASNÉ GENERACE CESTUJÍCÍCH SENIORŮ PŘED 50 LETY
- ❖ SEROLOGICKÁ KONTROLA ?
- ❖ DOPORUČENÍ
 - ✓ VIROVÉ HEPATITIDY
 - ✓ TYFUS
 - ✓ ŽLUTÁ ZIMNICE
 - ✓ TETANUS
 - ✓ INFLUENZA
 - ✓ PNEUMONIE
 - ✓ PROFYLAXE ANTIMALARIKY



DOPORUČENÍ PRO MINIMALIZACI RIZIK I – PŘED CESTOU

- PLÁNOVANÁ DESTINACE
- PLÁNOVANÁ DÉLKA POBYTU
- ROČNÍ DOBA POBYTU, PODNEBÍ (ČR VERSUS CÍLOVÁ DESTINACE)
- TYP UBYTOVÁNÍ (HOTEL, REZORT, CAMPING, MĚSTSKÁ OBLAST, VENKOVSKÁ OBLAST, DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE)
- DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY (VOLNÁ PŘÍRODA, PRALES, PUTOVÁNÍ)

DOPORUČENÍ PRO MINIMALIZACI RIZIK II

- VYŠETŘENÍ CELKOVÉ KONDICE S OHLEDEM NA PLÁNOVANOU CESTU, VYTYPOVÁNÍ RIZIK VČETNĚ CHRONICKÝCH FOKÁLNÍCH INFEKČÍ
- ADAPTACE LÉČEBNÉHO SCHÉMATU DANÉ DESTINACI
- VAKCINACE (TETANUS, PNEUMONIE, INFLUENZA, HEPATITIDY, TYFUS, ŽLUTÁ ZIMNICE)
- DLE PLÁNOVANÉHO MÍSTA POBYTU ZVÁŽIT DALŠÍ VAKCINACE (RUBEOLA, SPALNIČKY, CHOLERA, POLIO, MENINGOKOK)

DOPORUČENÍ PRO MINIMALIZACI RIZIK III

- LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY V ANGLIČTINĚ
- AKTUÁLNÍ EKG ZÁZNAM NEBO POPIS VE ZPRÁVĚ
- SEZNAM LÉKŮ V GENERICKÝCH NÁZVECH
- VYTYPOVÁNÍ INSTITUCÍ V MÍSTĚ POBYTU PRO OŠETŘENÍ DIABETIKŮ, HEMODIALYZOVANÝCH NEMOCNÝCH, ASTMATIKŮ
- SOUPRAVA PRO PRVNÍ POMOC INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÁ, ZÁSoba LÉKŮ NA CELOU CESTU
- REPELENTY
- VHODNÝ TYP POJIŠTĚNÍ

DOPORUČENÍ PRO MINIMALIZACI RIZIK IV

- POUČENÍ O BILANCI TEKUTIN, VÝZNAMU IONTOVÝCH NÁPOJŮ
- POUČENÍ O OCHRANĚ PŘED PŘEHŘÁTÍM
- POUČENÍ O PREVENCI TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI
- NÁVOD NA PÉČI O KŮŽI
- DIETNÍ DOPORUČENÍ S OHLEDEM NA LOKÁLNÍ CHARAKTER STRAVY
- POUČENÍ O NUTNOSTI VYVÁŽENÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE S ODPOČINKEM
- DOPORUČENÍ PRO PREVENCI FEKÁLNĚ-ORÁLNÍCH NÁKAZ
- DOPORUČENÍ PRO PROMPTNÍ ZVLÁDNUTÍ ZVRACENÍ (LEDOVÁ COCA-COLA PO LŽIČKÁCH), PRŮJMŮ (EMPIRICKY V SOUČASNÉ DOBĚ OPTIMÁLNÍ NIFUROXAZID – ERCEFURYL, PŘÍPADNĚ CIRROFLOXACIN)

NE VŠE LZE PŘEDVÍDAT...



STROMBOLI

DĚKUJI ZA POZORNOST

