


N. ISCHIADICUS L₄ - S₃

- v polovině stehna se rozděluje na: a) n. peroneus communis
b) n. tibialis

Plexus ischiadicus, kořenová inervace L ₄ - S ₃ .	
Sval	Výška odstupu
Adductor magnus	v horní třetině stehna
Semimembranosus	v horní třetině stehna
Semitendinosus	v horní polovině stehna
Biceps femoris	v horní polovině stehna
v dolní polovině stehna se dělí na n. tibialis a n. peroneus communis.	
N. tibialis	
Triceps surae — gastrocnemius — soleus	nad jamkou podkolenní
Popliteus	v jamce podkolenní
Plantaris	v jamce podkolenní u hlavičky fibuly
Tibialis posterior	v jamce podkolenní
Flexor digitorum longus	v horní třetině bérce
Flexor hallucis longus	v horní třetině bérce
na chodidle se dělí ve dvě větve n. plantaris medialis	
Abductor hallucis	na chodidle
Flexor digitorum brevis	na chodidle
Flexor hallucis brevis	na chodidle
Lumbrales 1. a 2.	na chodidle
n. plantaris lateralis	
Lumbrales 3. a 4.	na chodidle
Flexor hallucis brevis (caput laterale)	na chodidle
Interossei plantares	na chodidle
Adductor hallucis	na chodidle
N. peroneus communis	
Sval	Místo odstupu
Biceps femoris (caput breve)	v polovině stehna
se za hlavičkou fibuly dělí na n. peroneus profundus	
Tibialis anterior	v horní třetině bérce
Extensor digitorum longus	v horní polovině bérce
Extensor hallucis longus	v polovině bérce
Peroneus tertius	v dolní polovině bérce
Extensor digitorum brevis	na nártu nohy
n. peroneus superficialis	
Peroneus longus	v horní polovině bérce
Peroneus brevis	v polovině bérce



Schema průběhu n. ischiadici.
 1 — k flexorům kolena,
 2 — n. tibialis,
 3 — n. tibialis posterior,
 4 — n. suralis,
 5 — n. peroneus communis,
 6 — n. peroneus superficialis,
 7 — n. peroneus profundus.