


GUIDELINES 2015

Základní neodkladná resuscitace dětí pro zdravotníky a školené záchránce

Podle doporučení Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti 2015

Grafika © Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz



Pro úspěch je klíčové VČAS začít. U většiny kritických stavů u dětí má kombinace kompresí a dýchání zásadní význam. Jeden vdech = 1 sekunda, objem takový, aby se viditelně zvedal hrudník. Pokud jste na místě sami a nejde o náhlý kolaps, nejprve minutu resuscitujte, pak až volejte 155. Pokud postižený začne reagovat a/nebo normálně dýchat, přerušete resuscitaci a trvale jej kontrolujte až do příjezdu záchranné služby.

Poznámka: Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti se v detailech liší. Toto schéma představuje „průnik“ obou postupů spolu se zkušenostmi, nejlepším vědomím a svědomím autora.

Zdroje: ERC Guidelines 2015 – Summary of the changes since the 2010 Guidelines. European Resuscitation Council 2015, online na www.erc.edu a 2015 AHA Guidelines update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Part 1 – Executive Summary. Circulation. 2015;132;S315-S367