



Supranukleární okohybné poruchy

Klasifikace očních pohybů

- **Sakády** – rychlé verzní pohyby obou očí, jejich účelem je zobrazit předmět zájmu co nejrychleji na střed sítnice, lze provést vědomě
- **Sledovací pohyby** – pomalé verzní pohyby obou očí, jejich cílem je, aby pohybující se objekty byly na sítnici zobrazeny ostře. Nelze je kontrolovat vůlí.

Klasifikace očních pohybů

- **Vergenční pohyby** (akomodace, fúze) – zajišťují, že se objekty v různé vzdálenosti zobrazí na korespondující místa sítnic obou očí
- **Reflexní pohyby**
 - optokinetický nystagmus
 - vestibulookulární reflex

Okohybný aparát

- Motorická centra mozkové kůry, mozkový kmen, mozeček
- Okohybné nervy a jejich jádra
- Okohybné svaly

Poruchy okulomotoriky

- **Infranukleární**

poruchy motility způsobené postižením hlavových nervů, extraokulárních svalů nebo onemocněním orbity

- **Supranukleární**

mozkový kmen nebo „výše“

Supranukleární poruchy okulomotoriky

- Postihují obě oči
- Některé druhy pohybů jsou postiženy více, jiné méně
- Příčina leží v mozkovém kmeni nebo „výše“

Vyšetření

- Rychlé pohyby očí (sakády)
- Sledovací pohyby, resp. optokinetický nystagmus
- Vestibulookulární reflex
- Konvergence při pohledu do blízka


Vyšetření sakád



Vyšetření sledovacích pohybů





Vyšetření optokinetického nystagmu



Vestibulookulární reflex

NORMAL VOR




Patient focused on
examiners nose



After sharp turn to
patient's right, patient
remains focused on
examiners nose

ABNORMAL VOR

Patient focused on
examiners nose



Corrective saccades

Vyšetření konvergence



Motorická centra mozkové kůry

- Korové motorické centrum v čelním laloku řídí volní pohyby očí
- Korové motorické centrum v týlním laloku řídí reflexní (zrakově podmíněné) pohyby, tzv. okulomotorické: konvergence, fúze, fixace, atd.
- Vestibulární aparát představuje centrum pro reflexy statokinetické: oči jimi vyrovnávají změny polohy hlavy a těla


Motorická centra mozkové kůry

- Vysílají nervové impulzy k pohybům očí
- Centra jsou párová a popudy z těchto center jsou impulzem pro binokulární párové pohyby
- Z center jsou impulzy přenášeny k jádrům okohybných nervů
- Poruchy center způsobují pohledové obrny, nikdy strabismus


Hemisferální léze

- způsobí **konjugovanou deviaci očí jedním směrem**
- Iritační léze (např. epileptický záchvat)
- Nebo zánikové léze (např. CMP)

Pacient po CMP ve frontoparietální oblasti vpravo,
konjugovaná deviace očí doprava




Okulomotorická centra mozkového kmene



Horizontální pohyby


- M. rectus lateralis + m. rectus medialis
- N. VI + N. III
- Paramediánní pontinní retikulární formace → jádro n. VI a přes fasciculus longitudinalis medialis také jádro n. III



Internukleární oftalmoplegie (INO)


- Důsledek postižení fasciculus longitudinalis medialis (vychází z jádra n. VI, přechází na druhou stranu a postupuje do části jádra n. III, která inervuje m. rectus medialis)
- Oko na straně léze při horizontálním pohledu neaddukuje
- Addukce není postižena při konvergenci
- Současně nystagmus druhého (abdukujícího) oka
- Příčina: RS, infarkt kmene, tumory v oblasti FLM

Internukleární oftalmoplegie vlevo



Vertikální oční pohyby

- Jádra v rostrální části středního mozku a pretektální oblasti



Parinaudův syndrom


- „syndrom dorzálního středního mozku“
- Léze stlačující dorzální mezencefalon a pretektální oblast
 - Porucha vertikálního pohledu (nahoru)
 - Široké zornice nereagující na osvit, zúží se však při konvergenci (light-near-dissociation)
 - Konvergenční a retrakční nystagmus
- Příčiny: tumory pineální oblasti, vnitřní hydrocefalus

Optokinetic nystagmus

- fyziologický nystagmus
- Je OKN přítomný? Je normální? Stranová asymetrie?
- Výhodný u dětí nebo u neurologických pacientů (po CMP)

Vestibulookulární reflex

- Stabilizuje oči na zrakový podnět při pohybech hlavy a těla
- Vestibulární aparát → vestibulární jádra v mozkovém kmeni → jádra okohybných nervů → okohybné svaly



Vestibulookulární reflex

- Postižení dráhy vestibulookulárního reflexu se může projevit nystagmem
- Rozlišujeme nystagmus periferní (lze potlačit fixací) a centrální (nelze potlačit fixací)

Nystagmus

- Rytmický, mimovolný, kmitavý pohyb očí
- Pohyby jsou složené z pomalých očních pohybů v jednom směru, které jsou opakovaně přerušovány rychlými očními pohyby typu sakád v opačném směru

Nystagmus - rozdělení

- *Podle směru* (horizontální, vertikální, rotační,...)
- *Podle kmitů* (pendulující, záškubový)
 - *Frekvence* (rychlá, pomalá)
 - *Amplituda* (jemná, hrubá)

Nystagmus fyziologický

- Optokinetický nystagmus
- Fixační (při fixaci objektu v extrémní poloze)

Patologický nystagmus

- **Senzorický (očního původu)**
 - u vrozených očních vad nebo u onemocnění, která se začnou projevovat v prvních týdnech života do 2 let (achromatopsie, hypoplázie makuly - albinismus, ROP), vrozený nystagmus - většinou není spojen s poškozením mozku ani očí)
- **Otogenní (vestibulární)**
 - vestibulární nystagmus při poruchách labyrintu, bývá spojen se závratěmi
- **Centrální (neurogenní):** RS, CMP, tumory, intoxikace, ...

Kongenitální nystagmus

- Motorická porucha s / bez senzorického defektu
- Může být dědičný
- Diskrepance vývoje senzorického a motorického aparátu
- Lze posoudit až od 4. měsíce dítěte (po dozrání makuly)
- v dospívání se jeho intenzita snižuje

Kongenitální nystagmus

- Bilaterální, symetrický, horizontální
- Často klidová (nulová) zóna – komp. postavení hlavy
- Zraková ostrost ↓
- Tlumí se konvergencí (děti si dávají věci blízko k očím)
- Akcentuje se usilovnou fixací a stresem

Latentní nystagmus

- Kongenitální
- Objevuje se po zakrytí jednoho oka
- Symetrický, horizontální, záškubový
- Rychlá složka k fixujícímu oku
- Monokulární ZO horší než binokulární
- Bývá hypermetropie + esotropie

Senzorické poruchy s nystagmem

- Vliv senzorické poruchy do 2 let života
- Někdy ne nystagmus, ale bloudivé pohyby s nystagmoidní složkou
- Může být i monokulární

Oční anamnéza u nystagmu

- Začátek nystagmu?
- Zrakové funkce?
- Oscilopsie?
 - Okolní svět v neklidu

Otogenní (vestibulární) nystagmus

- Fyziologický experimentální
- Periferní labyrinthový
- Centrální vestibulární (léze jader a kmene)
- Spojen se závratěmi

Centrální (neurogenní) nystagmus

- Léze vestibulárních jader a drah do mozečku a k jádrům okohybných svalů
- Subjektivně oscilosie (iluze nestability viděného)
- Všechny nehorizontální, nekonjugované, stranově asymetrické a v dospělosti vzniklé nystagmy je potřeba vyšetřit neurologicky a provést CT/MR hlavy