

Senzorické deficity ve stáří




Stárnutí oka I

- ❖ orbita – redukce měkkých tkání – zapadlé oko , snížená hydratace okohybných svalů
- ❖ víčka – relaxace kůže, hypotonie levátoru a orbicularis oculi – zúžení oční štěrbiny, snížení počtu řas
- ❖ slzná žláza – atrofie, tuková infiltrace – snížení produkce slz, syndrom suchého oka
- ❖ spojivka – tenčí, fragilnější, časté spojivkové hemoragie



Stárnutí oka II



- ❖ **rohovka** – zvětšení zakřivení v horizontále – astigmatismus, klesá citlivost, stroma je opákní, arcus senilis cornea
- ❖ **skléra** – tenčí, průhlednější, vzestup rigidity z dehydratace
- ❖ **duhovka** – okraj zornice depigmentovaný, mióza ze stromální rigidity a hypofunkce sympatiku – obtížnější vyšetření refrakce
- ❖ **sítnice** – snížený lesk a průhlednost, pigmentový epitel se ztenčuje, cévy aterosklerotické


Stárnutí oka III

- ❖ optický nerv – atrofie gliální tkáně, degenerace axonů, skleróza vasa nervorum
- ❖ čočka – zvětšuje se objem čočky a předozadní rozměr, snížená propustnost pro modrou, lamelární disociace
- ❖ sklavec – destrukce fibrilárních struktur, tvorba kavit, kapalnění



Funkční změny


- ❖ klesá schopnost akomodace
- ❖ snižuje se zraková ostrost
- ❖ klesá adaptace na světlo a tmu
- ❖ snižuje se barvocit
- ❖ zorné pole se zmenšuje o 1-3° za dekádu



- ❖ stařecká dalekozrakost - presbyopie


Katarakta

- ❖ u 40% 60letých a 90% 90 letých
- ❖ operace katarakty je nejčastěji prováděnou operací nad 65 let
- ❖ senilní katrakta – není známá příčina, pomalý pokles zrakové ostrosti
- ❖ vidění jako „za hustou záclonou“
- ❖ řidčeji dvojité vidění – při ložiskové kataraktě



Degenerace makuly I

- ❖ ARMD – age related macular degeneration, VPMD – věkem podmíněná makulární degenerace
- ❖ postihuje centrální vidění, znemožňuje čtení
- ❖ deformace obrazu – metamorfopsie
- ❖ mlhavé centrum obrazu
- ❖ v 75 letech až 30% populace
- ❖ rizikový faktor – kouření, UV záření



Diabetická retinopatie

- ❖ při diabetu II. typu 20-45% po 5 letech,
60-85% po 15 letech
- ❖ narušení hematookulární bariéry a
obliterace kapilár
- ❖ příčiny poklesu zrakové ostrosti –
ischemické změny, edém, sítnicové a
sklívkové hemoragie, trakční odchlípení
sítnice, sekundární hemoragický
glaukom

Glaukom

- ❖ zvýšení nitroočního tlaku (NOT nad 16 Torr) s následným poškozením zrakového nervu
- ❖ následky – exkavace zrakového nervu, změny zorného pole, snížení zrakové ostrosti
- ❖ přispívá mydriáza, pobyt ve tmě, psychické vlivy – pupilární blok, uzávěr úhlu, vzestup NOT
- ❖ CAVE mydriatika!!

Glaukomový záchvat

- ❖ bolest hlavy, bolest okolí oka, nevolnost, zvracení, duhové kruhy okolo světel
- ❖ pohmat oka – oko tvrdé jako kámen
- ❖ NOT nad 40 Torr
- ❖ léčba – miotika, betablokátory, steroidy, manitol, blokátory karboanhydrázy – Diluran, laserová neb chirurgická iridotomie – vytvoření otvoru v duhovce

Stárnutí sluchového aparátu

- **presbyakuze - stárnutí vnitřního ucha a sluchové dráhy**
- **symetrická senzorineurální porucha v oblasti vyšších tónů**
- **významné je postižení frekvencí řečového pásma – snížení schopnosti sluchové analýzy, váznoucí skládání zvukového obrazu z binaurálního poslechu**

Důsledky

- zvýšení nároků na sluchové rozlišování při rušivém hluku -“slyším, ale nerozumím“
- CAVE – počínající kognitivní porucha!!
- během rozhovoru pacient sice přikyvuje, ale v podstatě nerozumí – pozor při sdělování doporučení léčby atd.
- řešení – nechat si zopakovat sdělené, dát psanou informaci, doprovod

Nejčastější onemocnění sluchového aparátu

- **zevní ucho – cerumen**
- **střední ucho – chronické záněty středouší,
otoskleróza – typická převodní porucha
způsobená fixací třmínku, manifestace
dlouhodobé expozice hluku**
- **vnitřní ucho – idiopatická náhlá
senzorineurální nedoslýchavost – náhlý
vznik, nedostatečně objasněná patogeneze,
vysoké procento spontánní úpravy**
- **ototoxická medikace**