

SYNDROM „ROZHNĚVANÝCH ZAD“



SYNDROM ROZHŇEVANÝCH ZAD



AYDLOW EFKT



EVROPSKÁ STANDARDNÍ SADA

Poř.	Testovaná látka		24 hod.	48 hod.	72 hod.	96 hod.	Poznámka
1.	Kaliumdichromát	0,5 % vaz.					
2.	Neomycinsulfát	20,0 % vaz.					
3.	Thiuram-mix	1,0 % vaz.					
4.	Parafenylendiamin	1,0 % vaz.					
5.	Kobaltchlorid	1,0 % vaz.					
6.	Benzocain	5,0 % vaz.					
7.	Formaldehyd	1,0 % aqua					
8.	Kalafuna	20,0 % vaz.					
9.	Clioquinol	5,0 % vaz.					
10.	Peru balzám	25,0 % vaz.					
11.	IPPD	0,1 % vaz.					
12.	Alkoholes adipis lanæ	30,0 % vaz.					
13.	Mercapto-mix	2,0 % vaz.					
14.	Epoxidová pryskyřice	1,0 % vaz.					
15.	Parabeny-mix	16,0 % vaz.					
16.	Paratertiarybutyl-fenolformaldehydová pr.	1,0 % vaz.					
17.	Fragrance-mix	8,0 % vaz.					
18.	Quaternium-15	1,0 % vaz.					
19.	Niklsulfát	5,0 % vaz.					
20.	Kathon CG	0,01 % aqua					
21.	Merkaptobenzothiazol	2,0 % vaz.					
22.	Sesquiterpenolaktony-mix	0,1 % vaz.					
23.	Primin	0,01 % vaz.					
24.	Budesonid	0,01 % vaz.					
25.	Tixocortol-21-pivalat	0,1 % vaz.					
26.	1,2-dibromo-2,4-dicyanobutan	0,5 % vaz.					
27.	Lylal	5,0 % vaz.					
28.	Fragrance-mix II	14,0 % vaz.					



obruba brýlí



prsten

Eczema contactum – nikel



hodinky – přezka



knoflík riflí



Eczema contactum – nikel

mince (pokladní)



Stopy niklu obráběcí kapaliny
(obráběč kovů) – atopická baze





Eczema contactum – chrom
(cement) – zedník



Eczema contactum – chrom
– pracovní obuv





Eczema contactum – kobalt + niki



Eczema contactum
– formaldehyd
a Quaternium-15
(kosmetické přípravky)
impetiginizace






Eczema contactum – guma hadice
(antioxidant IPPD) – obráběč kovů
– atopická baze





Eczema contactum – guma hadice (antioxidant IPPD)
– obráběč kovů





Eczema contactum – PPD – barva na vlasy






Eczema contactum – PPD, 4-aminofenol – barva na vlasy



antiperspirant



voda po holení

Eczema contactum – fragrance-mix






Eczema contactum – fragrance
(voda po holení)






Eczema contactum – peru balzám,
tea tree, levandulový, eukalyptový,
rozmarýnový a jalovcový olej, borový
a smrkový extrakt, fragrance-mix II,
kalafuna, limonen, alkoholes adipis lanae,
nikl (přípravky lidového léčitelství,
přípravky farmaceutické, přezka hodinek)
– atopická baze





Eczema atopicum et contactum
– extr. Chamomillae
(farmaceutické a kosmetické
přípravky) – impetiginizace






Eczema contactum – extr. Calendulae
(přípravky lidového léčitelství)

Eczema atopicum impetiginisatum
Eczema contactum – měsíčková mast



Eczema contactum – chryzantéma, arnika, heřmánek, alcoholes adipis lanae, neomycin, Peru balzám, propolis (rostliny, dermatologická externa, kosmetické přípravky, přípravky lidového léčitelství)



Eczema contactum – heřmánek, propolis, formaldehyd, alcoholes adipis lanae, clioquinol (dermatologická externa, přípravky lidového léčitelství, kosmetické přípravky) (základní dg – chronická venózní insuficience – ulcus cruris)




Eczema contactum – neomycin
(O-Framykoin)



Eczema contactum – neomycin (oční kapky)



Eczema contactum – kortikosteroidy
– tixokortolpivalát





Eczema contactum
– kortikosteroidy,
nikl, propylenglykol, propylgalát


Eczema contactum – parabeny,
alcoholes adipis lanae (přípravky
farmaceutické)





Eczema contactum – parabeny,
alcoholes adipis lanae,
formaldehyd, kyselina sorbová
(kosmetické přípravky) – susp.
atopická báze





HERMAL

TROLAB

Peruánský balzám

Synonyma a jiné názvy:
Peruvian balsam, Indian ba-
oil, Black balsam, Indian ba-
Surinam balsam

Peruánský balzám
cicho (tlejúčeho)
xylon balsamu
ve střední
množství
všechny
sah r

micky
části jiný.
Z tohoto du.

HERMAL

TROLAB

Epoxidová pryskyřice (živica)

Synonyma a jiné názvy:

Epoxy resin, 4,4-isopropylidene-
diphenol.epichlorohydrin, Digl-
her, Bisphenol A, Epichloroh-
Diphenylpropane, 8-chloro

Pro pacienty s alergií

bezpečný zejména k

nebo nedokonale v

Epoxidové pryskyřice

v elektrotechnice

izolačních m

a elektropř

kých prot

liarov)-

materiály, j

HERMAL

TROLAB

Sesquiterpenlakton - směs

Směs stejných dílů alantolactonu, c
nolidu a dehydrocostunolidu.

Tato směs obsahuje 3 látky, k
skytují velmi často v mnoh
tých rostlinách. Některou
látek směsi obsahují na
řebříček (myší chvo
na), heřmánek, šat
baba (margarét
jevy kontaktní
nebo její
kontakt

Názy a synonyma:
Methyl parahydroxybenzoát, Ethyl parahydro-
tybenzoát, Propyl parahydroxybenzoát, Butyl
parahydroxybenzoát: Nipagin, Perservaben,
Liqua par, Gemaben, Nipastat, Phenonip,
Undebezofene C

Estery kyseliny parahydroxybenzoové jsou
konzervační látky často používané při výrobě
kosmetických přípravků (krémy, pleťová mléka,
růžky aj.) a léků k zevnímu použití. Jako kon-
zervans se mohou vyskytovat i v některých po-
travinách (limonády, mošty, rybi produkty,
omáčky, dressingy na saláty, hotčice, majoné-
zy). V průmyslu se parabeny používají jako
konzervans v olejích, tucích, lepidlech a leště-
kách na boty a nábytek.

HERMAL

Parabeny PABA

TROLAB










100% COTTON





B - ZKOUSKA





