

Otázky k praktické státní zkoušce z předmětu Diferenciální diagnostika – simulovaná výuka

1. Kar. léze na meziální ploše moláru v HČ. (MO) Materiál volby – amalgám.
První premolár v HČ. Dg. necrosis pulpae. Popište ošetření kořenového systému včetně plnění .
2. Kar. léze na meziální ploše moláru v HČ. (MO) Materiál volby – amalgám.
Druhý premolár HČ. Dg. pulpitis acuta. Popište ošetření.
3. Kar. léze na distální ploše moláru v HČ. (OD) Materiál volby – amalgám.
První řezák v DČ. Dg. periodontitis chronica circumscripta. Popište ošetření kořenového systému včetně plnění.
4. Kar. léze na meziální i distální ploše ploše moláru v DČ. (MOD) Materiál volby – amalgám.
První molár v DČ. St.p. vitální exstirpaci. Zub bez klinických projevů. Popište definitivní ošetření včetně plnění.
5. Kar. léze na meziální i distální ploše moláru v DČ. (MOD) Materiál volby – amalgám.
První premolár v HČ. Dg. periodontitis chronica circumscripta acute exacerbans. Popište ošetření.
6. Kar. léze na meziální i distální ploše premoláru v DČ. (MOD) Materiál volby – kompozit.
Druhý premolár v HČ. Dg. periodontitis chronica circumscripta. Popište ošetření kořenového systému včetně plnění.
7. Kar. léze na meziální ploše premoláru v DČ. (MO) Materiál volby – kompozit.
První molár v HČ. Dg. periodontitis chronica circumscripta. Popište ošetření kořenového systému včetně plnění.
8. Kar. léze na horním středním řezáku meziálně i distálně bez poškození incizální hrany. Materiál volby – kompozit.
Druhý premolár v HČ. Dg. periodontitis chronica diffusa. Popište ošetření kořenového systému včetně plnění.
9. Kar. léze na meziální a distální ploše moláru v HČ. (MOD) Materiál volby – kompozit.
První řezák v HČ. Dg. periodontitis acuta, periodontální fáze. Popište ošetření od počátku až do fáze plnění kořenového systému včetně.
10. Kar. léze na meziální i distální ploše premoláru v HČ. (MOD) Materiál volby – kompozit.
První molár v HČ. Stav po vitální exstirpaci, klinicky bez projevů. Dokončení ošetření - popište včetně plnění kořenového systému.
11. Horní střední řezák v HČ, kar. léze na meziální i distální ploše bez poškození incizální hrany. Materiál volby – kompozit.
První premolár v HČ. Dg. periodontitis chronica diffusa. Popište ošetření od počátku až do fáze plnění kořenového systému.
12. Horní střední řezák v HČ, kar. léze na meziální a distální ploše bez poškození incizální hrany. Materiál volby – kompozit.
První premolár v HČ. Dg. pulpitis acuta. Popište možnosti ošetření včetně plnění kořenového systému.
13. Kariézní léze na distální ploše moláru v HČ. (OD) Volba materiálu – amalgám.
První premolár v HČ. Dg. pulpitis acuta. Druhá návštěva, popište další ošetření včetně plnění.
14. Kar. léze na meziální ploše moláru v HČ. (MO) Volba materiálu kompozit. .
Špičák v HČ s rozsáhlými defekty na meziální a distální ploše, zub devitální. Popište ošetření.

15. Kar. léze na meziální i distální ploše moláru v HČ. (MOD) Materiál volby – amalgám.
První molár v DČ. Dg. pulpitis acuta, stav po vitální exstirpaci. V současné době klinicky bez projevů. Popište další ošetření včetně plnění.
16. Kar. léze na distální ploše moláru v HČ. (OD) Materiál volby – amalgám.
První premolár v HČ. Dg. Pulpitis acuta. Popište možnosti ošetření včetně plnění.
17. Kar. léze meziální, distální i okluzální ploše premoláru v DČ. (MOD) Materiál volby kompozit.
První premolár v HČ. Dg. periodontitis chronica circumscripta acute exacerbans, submukózní absces. Popište ošetření.
18. Kar. léze na distální ploše moláru v HČ. (OD) Materiál volby amalgám.
První premolár v DČ. Dg. periodontitis chronica circumscripta. Popište ošetření kořenového systému včetně plnění.
19. Kar. léze na distální ploše premoláru v DČ. (OD) Materiál volby – amalgám.
První molár v HČ. Dg. Periodontitis chronica circumscripta. Popište ošetření kořenového systému včetně plnění..
20. Kar. léze na meziální i distální ploše horního středního řezáku, bez poškození incizální hrany. Výborná hygiena. Materiál volby - kompozit.
První molár v DČ. Dg. periodontitis chronica diffusa Popište možnosti ošetření včetně plnění.
21. Kar. léze na meziální i distální ploše moláru v DČ. (MOD) Materiál volby – amalgám.
Druhý premolár v HČ. Dg. periodontitis acuta, periodontální fáze. Popište ošetření.