

MUNI
MED

Polytrauma

Jiří Hlaváč

Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno

Úvod:

Trauma je stále jednou z nejvýznamnějších příčin morbidity a mortality jedinců mladších 45 let

V ČR cca 500 000 úrazů za rok, 10 000 těžkých úrazů, cca 2000 polytraumat

dopravní nehody

různé pády z výše


pády těles na lidské tělo

násilné trestné činy

současně může být komplikováno popálením + poraněním elektrickým proudem + intoxikací

nejčastěji k poranění končetin a pánve > 80%, hlavy 30-70%, hrudníku 20-35%, břicha 10-15%, páteře 10-20%

Mechanism úrazu: distribuce



Obr. 1

Definice

Polytrauma - současné poranění nejméně dvou tělesných systémů, z nichž postižení alespoň jednoho z nich nebo jejich kombinace ohrožují základní životní funkce


Sdružené poranění - poranění dvou a více orgánových systémů, které přímo neohrožuje život těžce poraněného

Mnohočetné poranění - vícero poranění jednoho systému, které není přímo život ohrožující

tělesné systémy: hrudník, břicho + orgány malé pánve, pánevní kruh + končetiny, všechny měkké tkáně, hlava + krk, obličej

Definice

- *Trimodální distribuce úmrtí u polytraumatu*
- *Bezprostřední*
- *Časná*
- *Pozdní*



Skórovací systémy

- *Glasgow Coma Scale - GCS*
- *Mangled extremity severity score - MESS*

Obr. 3

Regions	AIS	AIS meaning
Head, neck and C-spine	1	Minor
Face including nose, mouth, eyes, ears	2	Moderate
Thorax, thoracic spine, diaphragm	3	Serious
Abdomen and lumbar spine	4	Severe
Extremities including pelvis	5	Critical
External soft tissue injury	6	Maximal (untreatable)

Calculate AIS for most severely injured body part in each region. ISS is calculated as sum of square of AIS for the 3 most injured body regions. Maximum score is 75. If any body region is assigned a 6, the overall ISS is automatically 75.

Legend: AIS – abbreviated injury scale

Obr. 5

Skeletal / soft-tissue injury	score
Low energy (stab; simple fracture; pistol gunshot wound)	1
Medium energy (open or multiple fractures, dislocation)	2
High energy (high speed MVA or rifle GSW)	3
Very high energy (high speed trauma + gross contamination)	4
Limb ischemia	
Pulse reduced or absent but perfusion normal	1*
Pulseless; paresthesias, diminished capillary refill	2*
Cool, paralyzed, insensate, numb:	3*
Shock	
Systolic BP always > 90 mm Hg	0
Hypotensive transiently	1
Persistent hypotension	2
Age (years)	
< 30	0
30-50	1
> 50	2
* Double the score in cases of ischemia >6 hours	

MESS score: A score above 7 increases the chance of amputation.

Patofyziologie:

- *Hemorhagický šok*
- *Koagulopatie*
- *Hypotermie*
- *Zánětlivá reakce organismu*

Patofyziologie:

- *Hemorhagický šok*

akutní ztráta 25% cirkulujícího volumu krve

- centralizace krevního oběhu
- hypotenze (STK < 90 mm Hg), tachykardie,
- porucha prokrvení periferie, tachypnoe
- oligurie (diuréza \square 25 ml $\frac{1}{2}$ hod.)

Algowerův šokový index (ASI) - ASI < 1 - normální stav

ASI = 1.0 - hrozící šok

ASI = 1.2 - lehký šok

ASI = 1.5 - středně těžký šok

ASI > 2 - těžký šok

Patofyziologie:

- *Hemorhagický šok*

3 stupně šoku

- *mírný*: ztráta cca 10- 20 % cirkulujícího objemu
- *střední*: ztráta cca 20- 40 % cirkulujícího objemu
- *těžký*: ztráta > 40 % cirkulujícího objemu

Cílem terapie je zastavit krvácení, zajistit perfúzi orgánů, nahradit objem ztracené krve


„Trigger“ pro podání transfuze krve je hodnota HGB 70-90 g/l (kraniotraumata - HGB 90-100 g/l).

Patofyziologie:

- *Koagulopatie*

„Traumatem indukovaná koagulopatie“ (TIC): následek hemodiluce - krystaloidy, uvolnění tkáňových faktorů z poškozených endoteliálních buněk, dysfunkce trombocytů, konzumpce koagulačních faktorů, aktivace fibrinolytického systému, hypotermie

- cíl terapie: substituce ztracených a zředěných faktorů koagulační kaskády
- **Koagulopatie - součást „letální triády“!**



Obr. 6

Patofyziologie:

- Polytraumatizovaný pacient potřebuje v první fázi dopravit do tkání kyslík, potřebuje koagulační faktory a krevní destičky.
- Erymasa (EM) v kombinaci s čerstvou mraženou plazmou (FFP)

při podání □ 10 EM- poměr: 2 EM / FFP

při podání □ 10 EM- poměr: 1 EM / FFP

**EM + FFP + trombonáplav 1:1:1 + 4g fibrinogenu + 1g TXA
(tranexamová kyselina - Exacyl)**

= „Masivní transfuzní protokol“ (massive transfusion protocol - MTP)

- **aplikací MTP se v důsledku můžeme vyhnout masivnímu podáváníí transfuzí**
- **všechny transfuzní přípravky je nutno před podáním zahřát!!!**

Patofyziologie:

- *Hypotermie*

součástí „letální triády“!

podílí se na rozvoji dalších patologických stavů

- hypotermická koagulopatie - těl. teplota pod 34°C
- periferní vazokonstrikci, ischemie tkání
- suprese imunitní reakce
- příčina maligní arytmie

Zajistit tepelný komfort a zabránit ztrátám tepla!!!

Infuzní roztoky ohřáté!

Patofyziologie:


- Syndrom systémové zánětlivé odpovědi (*Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS*)

- dle klinických markerů: teplota > 38 °C nebo < 36 °C
tepová frekvence > 90/min
tachypnoe > 20/min nebo nutnost UPV
leukocytóza > 12 nebo < 4 x 10⁹/l

arteriální hypotenze + tkáňová hypoxie + metabolická acidóza

- Syndrom kompenzační protizánětlivé odpovědi (*Compensatory Antiinflammatory Response Syndrome - CARS*)




- dominuje-li SIRS - septický šok a multiorgánové selhání (ARDS, DIC, selhání ledvin...)
- dominuje-li CARS - insuficientní protiinfekční obrana



„Letální triáda“

- bludný kruhu dramaticky zvyšuje mortalitu!

Hypotermie + Koagulopatie + Metabolická acidóza!



Obr. 6

Vyšetření:


- **Principy ATLS (*Advanced Trauma Life Support*)**
- Primární + sekundární zhodnocení
- Primární zhodnocení - ABCDE:
 - identifikace emergentních život ohrožujících stavů (masivní krvácení, tenzní pneumothorax, srdeční tamponáda...)
 - **Airway control** - kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest + zajištění, resp. ochrana krční páteře
 - **Breathing + ventilation** - zajištění přiměřené ventilace
 - **Circulation with hemorrhage control** - zhodnocení oběhu a stavění krvácení
 - **Disability: neurological status** - zhodnocení neurologického stavu
 - **Exposure/Environmental control** - úplné obnažení nemocného

Primární zhodnocení - ABCDE

- Airway control - kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest + zajištění, resp. ochrana krční páteře
 - ✓ porucha vědomí → jsou dýchací cesty průchodné a bezpečné?
 - ✓ uvolnění dýchacích cest, průchodnost → předsunutí dolní čelisti, airway, CombiTube, orotracheální intubace, koniotomie
 - ✓ stabilizace krční páteře - Stiff Neck, manipulace s poraněným → logroll manévr



Obr. 11





Obr. 12

Primární zhodnocení - ABCDE

▪ Breathing + ventilation - zajištění přiměřené ventilace

- ✓ vyšetříme pohmatem a poslechem →
- ✓ vyšetříme krk → krepitus chrupavek, emfyzém, deviace trachei přeplnění jugulárních vén
- ✓ kritické stavy → tenzní pneumothorax, masivní hemothorax, penetrující poranění hrudníku, srdeční tamponáda, vlající hrudník



Obr. 14

Primární zhodnocení - ABCDE

- Circulation with hemorrhage control - zhodnocení oběhu a stavění krvácení
 - ✓ zástava masivního zevního krvácení, rychlá identifikace krvácení vnitřního do dutiny břišní či retroperitonea, malé pánve, z dlouhých kostí
 - ✓ nutno zajistit 2 žilní vstupy tekutinová resuscitace oběhu
 - ✓ vyšetřujeme pulzaci na a. carotis, kapilární návrat, při zástavě oběhu KPR,
 - ✓ zástava krvácení turniket na končetinách, poranění pánve → pánevní svorka, pánevní pás, dlouhé kosti - trakční dlahy, dutinová poranění → u indikovaných, oběhově stabilních pacientů (embolizace pánevních tepen, sleziny...)

Obr. 15



Obr. 16



Obr. 17



Primární zhodnocení - ABCDE

- **Disability: neurological status** - zhodnocení neurologického stavu
 - ✓ vyšetřujeme přítomnost kvantitativní (GCS) a kvalitativní poruchy vědomí
 - ✓ stav zornic (mioza, mydriaza, anizokorie, reakci na osvit...)
 - ✓ volní motoriku končetin, symetrii kožní citivosti, lateralizaci, senzorké a sfinkterové deficity
 - ✓ porucha vědomí vždy značí poranění CNS a to až do jejího vyloučení
 - ✓ CAVE: mimo trauma i mozková hypoxie, intoxikace, rozvrat vnitřního prostředí...

- **Exposure/Environmental control** - úplné obnažení nemocného
 - ✓ kompletně pacienta vysvléknout z oděvu
 - ✓ prevence hypotermie
 - ✓ důkladně prohlédnout i na záda!
 - ✓ využít „logroll“ manévr

Vyšetření:

- *Sekundární zhodnocení*

Až po kompletním dokončení primárního zhodnocení a po celkové stabilizaci základních životních funkcí pacienta

- Detailní vyšetření „od hlavy k patě“ + odběr anamnézy

- anamnéza: **AMPLE** - (Alergie) Allergies, (užívaná medikace) Medications currently used, (sledované choroby, těhotenství) Past illnesses / Pregnancy, (poslední jídlo) Last meal, (události, okolnosti, prostředí před úrazem) - Events / Environment related to injury)

- fyzikální vyšetření vyšetření kraniokaudálním směrem - hlava, maxilofaciální struktury, krční páteř, hrudník, břicho, perineum / rectum / vagina, muskuloskeletální systém

- závěrem orientační neurologické vyšetření

Vyšetření:


- *Radiologická vyšetření*

následují po klinickém vyšetření

- vyšetření pro traumaprotokol patří FAST, celotělové CT vyšetření a tzv. „celotělové“ RTG vyšetření
- FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) - přítomnost volné tekutiny perihepaticky + perirenálně, perisplenicky, v malé pánvi, perikardu + plicních bazí
- celotělové CT (trauma protokol) - nativně mozek a krční páteř, s i.v. kontrastní látkou (v tzv. trifázickém protokolu) zobrazí hrudník, břicho a pánev
- „Celotělové“ RTG vyšetření - u oběhově stabilního pacienta, anamnéza vysokoenergetického úrazu, negativní FAST, klinicky bez suspekce na nitrobřišní a nitrohruďní poranění

Management:


- Filozofie a princip prvního a druhého „úderu“ (first hit, second hit)



Obr. 10

Management:

- *K minimalizaci následků „second hit“ protokoly managementu*
- **Damage Control Resuscitation (DCR) + Damage control surgery (DCS) + Damage Control Orthopaedics (DCO)**
- **Damage Control Resuscitation (DCR)**
 - řídí anesteziolog, cílem je léčba a prevence rozvoje komplikací polytraumatu →
„letální triáda“



Obr. 22

Management:

- Damage control surgery (DCS)

- dočasné život zachraňující operace u hemodynamicky nestabilních pacientů, s cílem kontroly krvácení a dekontaminaci dutiny břišní,


RYCHLOST! - ideálně do 60-90 minut, případný „second look“ za 24-48 hodin

- „DCS“ laparotomie → splenektomie, perihepatický packing, staplerová resekce střev, Pringleho manévr, nefrektomie...


Perihepatický packing



Obr. 18




Obr. 19



Pringleho manévr

Obr. 21

Staplerová resekce střeva



Obr. 20

Management:

- Damage Control Orthopaedics (DCO)
 - 3 fáze, cílem je ošetřit skeletární i měkkotkáňové poranění končetin, dokončení traumatické amputace

1. emergentní / resuscitační fáze

kontrola krvácení, chirurgická stabilizace exsanguinace oblasti páneve, dokončení amputací

2. urgentní fáze (do 12 hodin po poranění)

stabilizace fraktur zejména dlouhých kostí, debridement ran, kompartment syndrom → fasciotomie

3. elektivní fáze (nad 24 hodin po poranění)

operační stabilizace fraktur horních končetin, konverze zevních fixátorů na vnitřní fixaci, definitivní ošetření nitrokloubních a měkkotkáňových poranění



Obr. 23

Techniky DCO: zevní fixace, ošetření měkkých tkání a krytí defektu dočasným kožním krytem.



Obr. 24

Take home message:

- Trauma je nejvýznamnější příčina morbidity a mortality jedinců mladších 45 let
- „*Trimodální distribuci úmrtí*“
- Jako prediktory morbidity a mortality a některých terapeutických postupů slouží skórovací systémy
- Polytrauma - 4 patologické cykly, které bez adekvátní léčby rezultují v tzv. „letální triádu“
- Vyšetření a ošetření v první fázi využívá ATSL postupu s rychlou identifikací život ohrožujících stavů
- Princip ošetření nestabilního pacienta spočívá v užití postupů „Damage control“
- Cílem veškerého snažení je především zastavit krvácení, nahradit objem ztracené krve včetně koagulačních faktorů, zajistit maximální možnou perfúzi orgánů okysličenou krví

- **Seznam obrázků:**
- 1 - Světová distribuce mortality dle příčiny poranění: Polytrauma - Krtička, Ira
- 2 - Trimodální distribuce úmrtí: https://aneskey.com/wp-content/uploads/2016/07/B9780323044189500059_gr1.jpg
- 3 - AIS + ISS score: <https://www.researchgate.net/profile/Luis-Da-Luz-Md-Msc/publication/304039518/figure/tbl2/AS:668787321884672@1536462731054/The-Injury-Severity-Score.png>
- 4 - GCS score: <https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Olsen-2/publication/272176279/figure/tbl1/AS:614212829188110@1523451158818/Glasgow-coma-scale-GCS.png>
- 5 - MESS score: <https://www.researchgate.net/publication/334845740/figure/tbl1/AS:789570488647683@1565259682581/Mangled-Extremity-Severity-Score-MESS.png>
- 6 - „Triad of Death“: <https://image.slidesharecdn.com/finaldco-copy-140918173200-phpapp01/95/damage-control-orthopaedics-dco-19-638.jpg?cb=1411061695>
- 7 - SIRS + CARS v čase: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lg4_S3YdOWVZW7-R41fCQ6i7gUqVtlhdwQ-u3Dyy_UNNNxmkmUVA36292_y_bj2BimHccRAXnGEVwHdLGuvzim7e7vxQOwxIDCaj1XKSDUvTIOm8rgOrcqZGFg
- 8 - Vliv SIRS/CARS: <https://www.researchgate.net/publication/290453949/figure/fig2/AS:342352532131844@1458634612469/SIRS-CARS-model-of-the-inflammatory-response-in-sepsis-adapted-from-40-This-biphasic.png>
- 9 - First + second „hit“: https://1.bp.blogspot.com/-1gi2NRUGt_0/WLvNU0-5lu/AAAAAAAAAC7Q/-CCTOgXmgM45mNy6UC40H2ebYK1CLSiagCLcB/s1600/Screen%2BShot%2B2017-03-05%2Bat%2B2.02.45%2BPM.png
- 10 - SIRS + „HITS“
<https://slideplayer.com/slide/2803779/10/images/8/Two+Hit+Model+MOF+MOF+Infection+Severe+SIS+Moderate+SIRS+Moderate.jpg>
- 11 - Předsunutí dolní čelisti:
<https://lh3.googleusercontent.com/proxy/49HnskXI7BNJAonkqVyGjVrr4TOZ7a8IMmtzjiXTzv8g4FWijRhKFS6Xqqg9S9TgfPZujOyl12fVo21Es3AI5II5E1o h3mOkgwKi-nIMhgrL9xoxxaPErUEVrv1N2oozfHO6j1Yo>
- 12 - Užití CombiTube:
https://i0.wp.com/aneskey.com/wp-content/uploads/2017/04/B9781437727647000270_f027-011af-9781437727647.jpg?fit=650%2C428&ssl=1
- 13 - Tenzní pneumothorax: <https://cdn.lecturio.com/assets/Tension-pneumothorax-1200x770.png>
- 14 - Thorakostomie:
https://www.researchgate.net/profile/Mahmut-Tokur-2/publication/291138260/figure/fig2/AS:320579505803265@1453443518936/Schematic-presentation-of-tube-thoracostomy-A-While-the-patient-is-in-straight_Q320.jpg
- 15 - Pánevní pás: <https://europepmc.org/articles/PMC6434492/bin/gr3.jpg>
- 16 - Turniket: <https://www.promednor.no/wp-content/uploads/2019/04/Amputation-Tourniquet-8-1-of-1-no-tourniquet.jpg>
- 17 - Trakční dlahy: <https://docplayer.cz/docs-images/92/109378119/images/27-3.jpg>
- 18 - Perihépatický packing: https://basicmedicalkey.com/wp-content/uploads/2017/03/B9780702044816000170_f17-01-9780702044816-1.jpg
- 19 - Perihépatický packing: https://abdominalkey.com/wp-content/uploads/2016/10/A304811_1_En_16_Fig11_HTML.jpg
- 20 - Uzávěr střeva staplerem: https://files.brief.vet/migration/article/46432/gi-anastomosis_step-4-46432-article.png
- 21 - Pringleho manévr: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Pringle_manoeuvre_EN.svg/1200px-Pringle_manoeuvre_EN.svg.png
- 22 - <https://www.myamericannurse.com/wp-content/uploads/2019/07/transfusion-featured.jpg>
- 23 - Stabilizace devastačního poranění dolní končetiny zevní fixací: my archive
- 24 - Krytí kožního defektu při devastačním poranění dočasným kožním krytem: my archive