

Epileptický záchvat

Z. Rozkydal

Epilepsie je onemocnění mozku
s opakovanými záchvaty:

Porucha vědomí

Porucha motorických, senzoričských,
senzitivních a vegetativních funkcí

Patologické EEG

Příčina:

Idiopatická, posttraumatická, nádorová,
po zánětu

Grand mal – velký epileptický záchvat

Předchází aura:

- Senzitivní- mrtvění, pálení, svědění, hučení
- Senzorická- zvláštní pocity zrakové, sluchové aj.
- Viscerální- palpitace, říhání, tlak v břiše
- Psychická- podrážděnost, nedůtklivost
příznaky již viděného a slyšeného

Vlastní záchvat:

Náhlé bezvědomí, pacient upadá na zem

Tonicko klonické křeče – nejdříve flekční,
později extenční

Pomočení, pokálení

Tonická křeč dýchacích svalů- apnoická pauza

Pěna u úst, pohyby očních bulbů

Namáhavé dýchání

Na konci upadá do hlubokého spánku

Pozáchvatový stav:

Spavý, mráкотný, unaven, amnézie

Petit mal – malý epileptický záchvat

Trvá obvykle několik vteřin

Záklon hlavy, rozhození končetin, bleskové křeče

Akinetické záškuby

Absence- zahledění, ztrnulost

Myoklonické záškuby- rozhození, upuštění věci
z ruky

Psychomotorický záchvat

Pacient jeví nezvyklé chování –

Zmatené pobíhání, neadekvátní pohyby, zívě

Status epilepticus

Hluboké bezvědomí, opakující se záchvaty
vícekrát za den

Prevence

Medikace, životospráva, pravidelný spánek

Zákaz alkoholu, jídlo pravidelně a přiměřené množství

Nepoužívat větší množství tekutin

Vhodné pracovní zařazení, psychoterapie

První pomoc

Uložit nemocného, aby se neporanil

Vložit do úst kapesník

Sledovat dýchání

Diazepam i.v.

Léčba

Antiepileptika (Sanepil, Sodanton, Biston,
Mysoline, Heminevrin,
Succilep, Depakine,...)

Životospráva

Operace- odstranění epileptogenního fokusu