

MUNI  
MED

# Neuron, mícha a reflexy

Fyziologie pro bakalářské obory (podzim 2023)



What's the wildest thing you ever did  
for money?

Me:



**Dej si  
kávičku**

**a dělej blbosti  
intenzivněji  
rychleji a  
s větší  
energií!**




**MUNI  
MED**

**MUNI**  
**MED**

# Nervový systém

- Nervová soustava
  - Centrální nervový systém (CNS)
    - mozek
    - mícha
  - Periferní nervový systém (nervy)
- Základní stavební jednotky
  - Neuron – přenos a zpracování informací
  - Gliové buňky – péče o neurony




Převzato z: Atlas fyziologie člověka, S. Silbernagl



# Hematoencefalická bariéra

- Bariéra mezi krví a nervovou tkání CNS
  - Velice těsné spojení mezi buňkami kapilár, bez fenestrací („děr“), s velmi omezenou možností transportu látek stěnou kapiláry prostou difuzí a endocytózou
  - Cévy jsou obalené výběžky astrocytů (neuroglie), které zprostředkovávají kontakt mezi kapilárou a neuronem
  - **Omezuje průchod většiny látek stěnou cévy – ochrana CNS před patogeny**
  - Buňky cév obsahují hodně enzymů rozkládajících xenobiotika (jedy i léky) – **špatně prochází jedy (ochrana), ale i léky (omezené možnosti terapie)**
- Prostup látek
  - Volně prochází
    - Plyny - **O<sub>2</sub>**, **CO<sub>2</sub>**, N<sub>2</sub>O
    - Malé molekuly rozpustné v tucích – **alkohol**, kofein, nikotin
  - Prochází jen pomocí specifických přenašečů
    - Glukóza**, aminokyseliny
  - Neprochází – velké molekuly (bílkoviny, lipidy) – jediným **zdrojem energie pro mozkové buňky je glukóza** (během hladovění také ketolátky), lipidy neprojdou




[http://images.slideplayer.cz/8/2020577/slides/slide\\_12.jpg](http://images.slideplayer.cz/8/2020577/slides/slide_12.jpg)

**Při patologických stavech** (zánět, úrazy) je bariera **propustnější** – prochází buňky imunitního systému, ale taky je větší prostup bílkovin a vody → **riziko otoku mozku**

# Neurogliové buňky


- Neurony jsou citlivé na výkyvy ve stálosti vnitřního prostředí (hladiny iontů, pH, O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, glukózy...)
- **Péče o neurony** – neuroglie jsou „chůvy a ošetřovatelky“ neuronů
  - **metabolická, ochranná, imunitní, homeostatická a oporná funkce** (CNS nemá pojivové tkáně)
  - zajištění co nejvýhodnějšího prostředí
  - Výživa a odvádění metabolitů (neurony mají vysokou energetickou spotřebu, vyžadují hodně ATP – vysoká spotřeba O<sub>2</sub> a glukózy)
  - Ochrana před choroboplodnými látkami – fagocytóza
  - Tvorba myelinové pochvy
  - Odstranění neuromediátoru – podíl na vedení vzruchu



[http://images.slideplayer.cz/8/2020577/slides/slide\\_12.jpg](http://images.slideplayer.cz/8/2020577/slides/slide_12.jpg)


# Neurogliové buňky

- **Astrocyty:** přesun látek z krve, opora neuronu, podpora met glukózy, udržují kalcémii, metabolismus mediátorů
- **Oligodendrocyty:** tvorba myelinu v mozku a míše
- **Schwanova bunika** – tvorba myelinu na periferních nervech
- **Mikroglie:** fagocytoza bakterií a odpadu
- **Bunky ependymu:** kubický/cilindrický tvar, často řasinky, výstelka mozkových dutin






# Stavba neuronu (nemyelinizovaný)




# Stavba neuronu (myelinizovaný)



# Vlastnosti a typy neuronů

- Stavba neuronu je dána jeho funkcí (neurony mozkové kůry jsou bohatě větvené, senzory mohou být bez dendritů)
- Axon je vždy jeden (ale může se větvit), počet dendritů může být libovolný
- Neurony se (až na velmi vzácné specifické výjimky) neobnovují (nejsou schopny se dělit) – mohou však regenerovat axonové výběžky
  - dorůstání nervových výběžků a tvorba nových spojů mezi neurony je podstatou nervové plasticity – schopnosti učení
  - nebo můžeme postupně získat zpět schopnost pohybu končetiny přišité po amputaci




# Vlastnosti neuronu

**Neurony mají obrovskou spotřebu energie** (pro tvorbu akčního napětí, syntézu látek a jejich transport)

- Obsahují mnoho mitochondrií pro tvorbu ATP
- I mírný pokles ve zdroji kyslíku a glukózy vede ke ztrátě funkčnosti neuronů
  - **Nedostatek kyslíku vede k odumírání neuronu už za 3-5 minut** (mozek v klidu spotřebuje cca 25% kyslíku z celkové spotřeb těla)
  - **Pokles hladiny cukru pod 3,3 mmol/l začíná vést k poruše vědomí**
- Neuron obsahuje velké množství mitochondrií pro tvorbu ATP
  - obrovská spotřeba energie pro tvorbu akčního napětí, syntézu látek a jejich transport
- má velké jádro
  - velká proteosyntéza
- a velký Golgiho aparát
  - úprava látek (včetně neuromediátorů)

Zajímavost: Na hypoxii jsou víc citlivější buňky mozkové kůry (evolučně mladší), než buňky mozkového kmene (evolučně starší a odolnější). Proto po hypoxii způsobené například zástavou oběhu utrpí nejdřív kognitivní funkce.





# Elektrické jevy na neuronu

- Neuron je excitabilní buňka – díky specifickým napěťově vrátkovaným iontovým kanálům je schopna generovat a vést akční napětí
- Elektrické jevy na neuronu
  - Klidové membránové napětí
  - Místní odpověď membránového napětí – postsynaptický a ploténkový potenciál
  - Akční napětí

## Klidové membránové napětí


- na membráně buňky za klidových podmínek - uvnitř buňky je záporný náboj, na povrchu buňky je kladný náboj
- **mimo buňku** (extracelulárně) je **větší koncentrace Na<sup>+</sup>**, membrána je **pro Na<sup>+</sup> nepropustná**  
→ Na<sup>+</sup> „chce“ vstoupit do buňky na základě elektrického i chemického (koncentračního) gradientu
- **v buňce je větší koncentrace K<sup>+</sup>** (intracelulární iont), kanály pro K<sup>+</sup> v membráně jsou otevřené, **pohyb K<sup>+</sup> je dán elektrochemickou rovnahou** (K<sup>+</sup> je elektricky tažen do buňky, ale koncentračním gradientem z buňky)
- po celý čas pracuje **Na/K-ATPáza**, který za spotřeby ATP vyhazuje 3 Na<sup>+</sup> z buňky a 2 K<sup>+</sup> do buňky – klíčová pro udržení klidového napětí

# Akční napětí

- dojde k dostatečné kladné výchylce napětí na membráně
- je překročena **prahová hodnota** membránového napětí (cca -55 mV)
- **Otevřou se** napěťově vrátkované sodíkové kanály
- **Zákon vše nebo nic**

## Depolarizace:

- **Na<sup>+</sup> vstupuje** velice rychle do buňky na základě svého elektrochemického gradientu
- napětí membrány se překmitne do kladných hodnot (uvnitř +, venku -)
- Konec depolarizace: Na<sup>+</sup> kanály se inaktivují kladným napětím na membráně




# Akční napětí

## Repolarizace:

- Na<sup>+</sup> kanály jsou inaktivované, kladný náboj v buňce vyžene **K<sup>+</sup> z buňky ven** po elektrochemickém gradientu
- Napětí buňky se vrací zpět k záporným hodnotám
- Zároveň **Na/K-ATPáza** navrácí rozložení iontů do původní rovnováhy

Hyperpolarizace – napětí na membráně přechodně klesne k zápornějším hodnotám



**Svodná a lokální anestezie** – blokátory sodíkových kanálů (např. bupivacain u epiduralu nebo mezokain při lokální anestezii) Nedochází k přenosu vzruchu nervovým vláknem. Lze tak např. operovat končetinu jen po vpíchnutí anestetika do nervu bez nutnosti použít celkovou anestezii.



# Vedení akčního napětí

## Nemyelinizované vlákno

- Například nervová vlákna C z receptorů bolesti
- Pomalé vedení (0,5-2 m/s)




## Myelinizované vlákno

- Saltatorní vedení vzruchu
- Například nervová vlákna Ia a II z proprioreceptorů
- Rychlé vedení (80-120 m/s)




# Synapse


- Spojení mezi neurony nebo neuronem a kosterním svalem (nervosvalová ploténka)
- Elektrická synapse – neurony jsou přímo spojené kanály a vzruch rovnou přejde z jednoho na druhý – je jich málo, evolučně starší
- **Chemická synapse** (na obrázku) – vzruch je přenášen ze synaptického zakončení jednoho neuronu na další pomocí neuromediátoru (neurotransmiteru) evolučně mladší, častější



## Klid



## Příchod akčního napětí a vylití neuromediátoru



postsynaptická membrána (na buňce neuronu, svalu, žláze,...)

## Navázání neuromediátoru na receptor

Neuromediátor navázaný na svůj specifický receptor spouští sekvenci dalších dějů na postsynaptické buňce (otevření iontových kanálů nebo spuštění metabolických drah)

vyklízení mediátoru zpět do synaptického zakončení

deaktivace mediátoru a jeho rozklad enzymy

Neuromediátor je následně po svém vylití velice rychle „uklizen“ ze synaptické štěrby různými způsoby (štěpení nebo zpětné vstřebání)


## Vyklízení neuromediátoru – ukončení přenosu

Navázání neuromediátoru na receptory

# Nervosvalová ploténka

- Akční napětí přijde alfa-motoneuronem na synapsi
- Dojde k vylití **acetylcholinu** do synaptické štěrbině
- Acetylcholin (**Ach**) se naváže na **nikotinové receptory**
- Receptory jsou spojené s iontovým kanálem pro  $\text{Na}^+$  (ligandem vrátkované kanály)
- $\text{Na}^+$  vstoupí do buňky a vytvoří **ploténkový potenciál** (lehká podprahová depolarizace)
- Potenciály se sčítají a doputují k sarkolemě – překročí prahovou hodnotu pro napětově vrátkované  $\text{Na}^+$  kanály
- $\text{Na}^+$  vstupuje do buňky a vzniká **akční napětí**, které se rozšíří po svalovém vlákně a spustí kontrakci

Acetylcholin je deaktivován **acetylcholinesterázou (AChE)** a štěpen na acetyl a cholin



# Drogy/jedy/léky a receptory

- Mno se m nebc
- Velk pojrn (opic
- Znal



files/du  
002013/cincibuchpecker/00101111  
r:Amanita\_muscaria\_3\_vliegenzwammen\_op\_rij.jp



Kat idobis-keuini-unluk-perudataripakai





# Drogy/jedy/léky a receptory

- Mnohé látky mající podobný tvar molekuly jako naše přirozené neuromediátory se mohou vázat na jejich specifické receptory... a buď je stimulovat (agonista) nebo blokovat (antagonista)
- Velká část receptorů a jejich účinků na organismus byla popsána a pojmenována díky drogám (opioidní, nikotinové, kanabinoidní, muskarinové receptory)
- Znalost receptorů a jejich účinků je důležitou součástí farmakodynamiky



<https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/46948>



<https://www.hmetro.com.my/rencana/2021/11/781332/dah-tiba-masa-halalkan-kanabis-ketum-untuk-perubatan-pakar>



[https://www.gymberoun.cz/uploads/web\\_files/dud/dud2013/cincibuchpecka/Opium.html](https://www.gymberoun.cz/uploads/web_files/dud/dud2013/cincibuchpecka/Opium.html)

[https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amanita\\_muscaria\\_3\\_vliegenzwammen\\_op\\_rij.jpg](https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amanita_muscaria_3_vliegenzwammen_op_rij.jpg)



# Drogy/jedy/léky a receptory

## – Opioidní receptory (*Papaver somniferum*)

- Vnitřní opioidy (neuromediátory) – endorfiny, enkefaliny... modulace přenosu vzruchu
- Látky vázající se na receptory – morfin, heroin, sufentanyl, fentanyl,....
- Rychle se adaptující receptory – snižuje se počet receptorů na synaptické membráně a citlivost receptoru k mediátoru/droze – k dosažení stejného účinku je třeba vyšší dávka – podstata rychlého vzniku závislosti

## – Muskarinové receptory (muchomůrka *Amanita muscaria*)

- Receptory parasymptického nervového systému

## – Nikotin (*Nicotiana tabakum*)

- Váže se na nikotinové receptory v mozku v sympatických i parasymptických gangliích, stimuluje sympatickou i parasymptickou aktivitu

## – Atropin (*Atropa belladonna*)

- Blokuje muskarinové receptory – inhibice aktivity parasymptického systému
- Léčba bradykardie, rozkapání zornic v oftalmologii, útlum slinění (při endoskopii)
- Antiditum muskarinu, neostigminu, organofosfátů

## – Ketamin

- Antagonista NMDA receptorů – analgetikum, anestetikum, halucinogen


## – Kyselina lysergová a ergometrin

### (*Paličkovice nachová* - námel)

- LSD se váže na serotoninové receptory (ale je to složitější) - halucinogen
- Metylergometrin – kontrakce hladké svaloviny dělohy – zástava poporodního krvácení, vyšší dávky mají neurologické důsledky



<https://studmed.uio.no/journalwiki/index.php?title=Fil:Mioseandreas.jpg>



<https://www.diastyl.cz/rulik-jako-lek-i-obavana-droga-pravdy/>

<https://www.monoculturencyclopedia.com/atropa-belladonna/?lang=en>



<https://www.cojeco.cz/palickovice>





# Nervosvalová aktivita a drogy/jedy/léky

aneb co vás nezabije, to dostane šanci příště

## – Botulotoxin (*Clostridium botulinum*, klobásový jed)

- inhibice vylíčení acetylcholinu na nervosvalové ploténce – nedochází ke kontrakci svalů – ochablost, udušení

## – Tetrodotoxin –

- blokátor Na<sup>+</sup> kanálů
- kompletní paralýza všech svalů, udušení (ryba fugu – adrenalinová gastronomie)



## – Kurare (*Strychnos toxifera*, šípový jed)

- blokuje nikotinové receptory na nervosvalové ploténce – svalová ochablost
- Léčba tetanu a otravy strychninem
- Deriváty – **rocuroonium**, cisatracúriumbesilát (nimbex) nedepolarizující myorelaxancia, dlouhodobě působící, při řízené ventilaci

Nedepolarizující neuromuskulární blokátor – antidotum neostigmin

## – Strychnin (*Strychnos nux vomica*, křečový jed)

- Jako inhibitor glycinového receptoru blokuje **retardéry synaptického** přenosu zadních kořenů míšního kmenu, umožňuje rozsáhlé rozšíření podráždění, používá se na otravy a podpory chuti k jídlu



[https://www.agstepanska.cz/cs/site/n\\_predmety/ag\\_bi\\_ch\\_ze/biche\\_studentske\\_prace/ch\\_prace\\_bartova.pdf](https://www.agstepanska.cz/cs/site/n_predmety/ag_bi_ch_ze/biche_studentske_prace/ch_prace_bartova.pdf)

<https://www.alamy.de/das-bundel-von-volle-pralle-alte-blechdosen-krankte-essen-garbage-image228392850.html?imageid=91D019EA-94C6-4566-B356-4950AE7521F78p=184586&pn=1&searchId=f19203ac310c358a460375a8ec4af14c&searchtype=0>

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurare>

<https://www.priznaky-projevy.cz/otravy/672-tetrodotoxin-otrava-tetrodotoxinem-rybou-fuga-pliznaky-projevy-symptomy>

<https://www.slevomat.cz/akce/1477562-botox-pro-vyhazeni-vrsek-na-cele-i-okolo-oci>

[https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Clostridium\\_botulinum\\_Neurotoxins](https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Clostridium_botulinum_Neurotoxins)

# Nervosvalová aktivita a drogy/jedy/léky

aneb co vás nezabije, to dostane šanci příště

## – Inhibitory acetylcholinesterázy (AChE) -


- Organofosfáty – bojové látky (sarin, novičok), pesticidy - akumulace acetylcholinu v nervosvalové ploténce vede k trvalé kontrakci svalů - udušení
- Terapie myastenia gravis - onemocnění, kdy jsou autoimunitně ničené receptory v nervosvalové ploténce (lek piridostigmin, neostigmin)
- Terapie onemocnění, kdy se tvoří málo Ach (různé druhy demence) – rivastigmin
- Ukončení účinku nedepolarizujících myorelaxancií (rocuronia) – např. ukončení řízené ventilace na konci operace
- Terapie otravy atropinem – a atropin je terapií otravy AChE

## – Depolarizující myorelaxancia (sukcynylcholin) – krátkodobě působící

- Váže se na Ach receptor, ale není rozkládán AChE. Vyvolávají dlouhodobější depolarizaci membrány, po které následuje opožděná repolarizace, která brání kontrakčním účinkům Ach. Výsledkem jejich působení je přechodná aktivace svalu, po které následuje svalová paralýza.

## – Tetanus (*Clostridium tetani*) – inhibice uvolňování inhibičních neurotransmiterů (GABA, glycin) na neuronu


- selhání inhibice motorických reflexů na stimulaci sensorů – hyperreaktivita svalů, tetanické kontrakce



<https://www.istockphoto.com/cs/fotky/intubace>

MUNI  
MED

# Drogy/jedy/léky a místa účinku na nervosvalové ploténce







# Postsynaptický potenciál (PSP)

- Neurotransmitery navázané na určité typy receptorů postsynaptické membrány způsobí k otevření iontových kanálů a přesun iontů z/do buňky
- změna napětí na postsynaptické membráně - postsynaptický potenciál



## Postsynaptický potenciál

**Závisí na typu receptoru, zda se bude jednat o IPSP nebo EPSP**

- je slabý (mnohem slabší než akční napětí)
- šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)
- Může se sčítat – informace je kódována do amplitudy





Např. acetylcholin navázaný na **nikotinový receptor** způsobí otevření kanálu pro Na<sup>+</sup> a vstup Na<sup>+</sup> do buňky – slabá depolarizace membrány.



Např. GABA navázaná na GABA<sub>A</sub> způsobí otevření kanálu pro Cl<sup>-</sup> a vstup Cl<sup>-</sup> do buňky. Nebo acetylcholin navázaný na muskarinový M2 receptor otevírá K<sup>+</sup> kanál a K<sup>+</sup> vystupuje z buňky. Vzniká slabá hyperpolarizace membrány.

# IPSP a EPSP


- je slabý, šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)
- EPSP a IPSP se sčítají
- souhrnné PSP



Pokud výsledný PSP doputuje až na iniciální segment axonu a překročí prahovou hodnotu, vzniká akční napětí. Větší počet EPSP přicházející ve stejný čas vedou k rychlejšímu vzniku akčního napětí. IPSP blokují přenos a vznik akčního napětí.

# Součet a přenos PSP

Pokud výsledný PSP doputuje až na iniciální segment axonu a překročí **prahovou hodnotu**, vzniká akční napětí. Větší počet EPSP přicházející ve stejný čas vedou k rychlejšímu vzniku akčního napětí. IPSP blokují přenos a vznik akčního napětí.





# Akční napětí vs. postsynaptický potenciál

- Akční napětí
  - Konstantní amplituda
  - Šíří se bez dekrementu
  - Zákon vše nebo nic
  - nemůže se sčítat
  - Informace je kódovaná do frekvence potenciálů
- Postsynaptický potenciál
  - Amplituda slabší a různá, závisí na počtu kanálů aktivovaných receptory
  - šíří se s dekrementem
  - Může se sčítat
  - Informace je kódovaná do amplitudy
  - Z PSP se stává akční napětí, jen pokud je překročena prahová hodnota pro otevření napěťově vrátkovaných sodíkových kanálů

# EEG



- Vzniká součtem Excitačních postsynaptických potenciálů






# Prostorová sumace

Čím více je na neuronu excitačních synapsí, na které ve stejný čas přišel AP, tím více vzniklo EPSP a tím snadněji je dosaženo prahu pro vznik AP na postsynaptickém neuronu




# Časová sumace

Čím vyšší je frekvence AP přicházejících na synapsi, tím větší je souhrnný PSP a tím dříve je dosaženo prahové hodnoty pro vznik AP na postsynaptickém neuronu



# Kódování informace

- Kódování - intenzita podnětu zaznamenaná receptorem je překódovaná do frekvence AP
- Dekódování - na synapsi je frekvence AP převedena do PSP
- Rekódování - pokud součet všech PSP překročí práh, vzniká AP



Převzato z: Atlas fyziologie člověka, S. Silbernagl

