

M U N I  
M E D

## **Somatosenzitivita, viscerosenzitivita, propriocepce a bolest II**

# Viscerosenzitivita

- Přenos informací z viscerální oblasti a kardiovaskulárního systému
- Vázána na autonomní nervový systém
- Většina informací končí nejvýše v hypothalamu
- Většina informací nepřechází do vědomí

# Viscerosenzitivita

- Přenos informací z viscerální oblasti a kardiovaskulárního systému
- Vázána na autonomní nervový systém
- Většina informací končí nejvýše v hypothalamu
- Většina informací nepřechází do vědomí

✓ Parasympatikus (VII., IX., X., sakrální parasympaticus)  
– „Provozní informace“ (např. o krevním tlaku, pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>)

✓ Sympatikus  
– „Potenciální nebezpečí“ (tlak, bolest, chlad)

# Propriocepce

- Informace ze
  - Svalů
  - Šlach
  - Kloubních pouzder
- Význam
  - Přesnost pohybu
  - Ochranná
- Viz motorika

# Somatosenzitivní systém - dráhy

- Tři systémy
- (Archispinotalamický systém)
  - Propojení sousedních segmentů (tr. Spinospinalis)
- Paleospinotalamický
  - tr. Spinoreticularis, tr. Spinotectalis...
- Neospinotalamický
  - tr. Spinothalamicus
- Systém zadních provazců
  - tr. Spinobulbaris

# Somatosenzitivní systém - dráhy

- Tři systémy
- (Archispinotalamický systém)
  - Propojení sousedních se
- Paleospinální systém
  - tr. Spino-thalamicus
- Neospinální systém
  - tr. Somatosensoryczny
- Systém vnitřního povrchu (SVP)
  - tr. Spinotectal

**Během evoluce nedocházelo k nahrazení starých systémů novými, ale staré bylo zachováno a nové struktury zajišťující sofistikovanější funkce byly přidány**

**EVOLUCE....**

# Somatosenzitivní systém - dráhy

- Paleospinotalamický
  - Low resolution – bolest („pomalá bolest“)
- Neospinotalamický
  - High resolution – bolest („rychlá bolest“), teplota
  - Low resolution – kožní citlivost
- Systém zadních provazců
  - High resolution – kožní citlivost

# Somatosenzitivní systém - dráhy


- Paleospinotalamický
  - Low resolution – bolest („pomalá bolest“)
- Neospinotalamický
  - High resolution – bolest („rychlá bolest“), teplota
  - Low resolution – kožní citlivost
- Systém zadních provazců
  - High resolution – kožní citlivost

Bezprostřední přežití

Dlouhodobé přežití


# Paleospinotalamický systém

- Tr. Spinoreticularis, spinotectalis...




# Paleospinotalamický systém

- Tr. Spinoreticularis, spinotectalis...
- Vzniká u živočichů, u kterých není ještě vyvinuta kůra
- Primární napojení na podkorové struktury zůstává i u člověka




# Paleospinotalamický systém

- Tr. Spinoreticularis, spinotectalis...
- Vzniká u živočichů, u kterých není ještě vyvinuta kůra
- Primární napojení na podkorové struktury zůstává i u člověka
- Základní obranné reakce a reflexy - vegetativní odpověď, reflexní lokomoce (opto-akustické reflexy, atd.)




# Paleospinotalamický systém

- Tr. Spinoreticularis, spinotectalis...
- Vzniká u živočichů, u kterých není ještě vyvinuta kůra
- Primární napojení na podkorové struktury zůstává i u člověka
- Základní obranné reakce a reflexy - vegetativní odpověď, reflexní lokomoce (opto-akustické reflexy, atd.)
- Se vznikem neokortexu dochází k napojení na korové oblasti (tr. Spino-reticulo-thalamicus), avšak rozlišovací schopnost je malá – tupá a obtížně lokalizovatelná bolest...




# Paleospinotalamický systém

- Tr. Spinoreticularis, spinotectalis...
- Vzniká u živočichů, u kterých není ještě vyvinuta kůra
- Primární napojení na podkorové struktury zůstává i u člověka
- Základní obranné reakce a reflexy - vegetativní odpověď, reflexní lokomoce (opto-akustické reflexy, atd.)
- Se vznikem neokortexu dochází k napojení na korové oblasti (tr. Spino-reticulo-thalamicus), avšak rozlišovací schopnost je malá – tupá a obtížně lokalizovatelná bolest...
- Trakt není „designován na tak výkonný procesor jakým je neokortex“





# Paleospinotalamický systém

- Tr. Spinoreticularis, spinotectalis...
- Vzniká u živočichů, u kterých není ještě vyvinuta kůra
- Primární napojení na podkorové struktury zůstává i u člověka
- Základní obranné reakce a reflexy - vegetativní odpověď, reflexní lokomoce (opto-akustické reflexy, atd.)
- Se vznikem neokortexu dochází k napojení na korové oblasti (tr. Spino-reticulo-thalamicus), avšak rozlišovací schopnost je malá – tupá a obtížně lokalizovatelná bolest...
- Trakt není „designován na tak výkonný procesor jakým je neokortex“
- Asi polovina traktu kříží střední rovinu




# Paleospinothalamický systém




# Neospinothalamický systém

- Tr. Spinothalamicus




# Neospinothalamický systém

- Tr. Spinothalamicus
- Mladší systém primárně napojen na neokortex
- „Vysoká kapacita“




# Neospinothalamický systém

- Tr. Spinothalamicus
- Mladší systém primárně napojen na neokortex
- „Vysoká kapacita“
- Detailní informace o bolesti (ostrá, dobře lokalizovaná)
- Informace o teplotě




# Neospinothalamický systém

- Tr. Spinothalamicus
- Mladší systém primárně napojen na neokortex
- „Vysoká kapacita“
- Detailní informace o bolesti (ostrá, dobře lokalizovaná)
- Informace o teplotě
- Informace o hrubé kožní citlivosti




# Neospinothalamický systém

- Tr. Spinothalamicus
- Mladší systém primárně napojen na neokortex
- „Vysoká kapacita“
- Detailní informace o bolesti (ostrá, dobře lokalizovaná)
- Informace o teplotě
- Informace o hrubé kožní citlivosti
- Kříží střední rovinu na úrovni vstupního segmentu




# Neospinothalamicický systém




# Systém zadních provazců

- Tr. Spinobulbaris




# Systém zadních provazců

- Tr. Spinobulbaris
- Evolučně nejmladší
- Vysoká kapacita – detailní informace




# Systém zadních provazců

- Tr. Spinobulbaris
- Evolučně nejmladší
- Vysoká kapacita – detailní informace
- Taktilní čití
- Vibrace




# Systém zadních provazců

- Tr. Spinobulbaris
- Evolučně nejmladší
- Vysoká kapacita – detailní informace
- Taktilní čití
- Vibrace
- Důležité pro poznávání a jemnou motoriku




# Systém zadních provazců

- Tr. Spinobulbaris
- Evolučně nejmladší
- Vysoká kapacita – detailní informace
- Taktilní čití
- Vibrace
- Důležité pro poznávání a jemnou motoriku
- Lepší adaptace v daném prostředí
- Kříží střední rovinu na úrovni prodloužené míchy




# Sytém zadních provazců



# Dermatomy



- Somatotopická organizace somatosenzitvních nervových vláken



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Dermatomy



- Somatotopická organizace somatosenzitvních nervových vláken



<http://www.slideshare.net/CsillaEgri/presentations>

# Trigeminální systém

- Nucleus tractus spinalis NT
  - Bolest, teplota
- Nucleus sensorius principalis NT
  - Kožní citlivost



# Somatosenzitivní systém - dráhy


Table I The Sensory Modalities Represented by the Somatosensory Systems				
Modality	Sub Modality	Sub-Sub Modality	Somatosensory Pathway (Body)	Somatosensory Pathway (Face)
Pain	sharp cutting pain		Neospinothalamic	Spinal Trigeminal
	dull burning pain		Paleospinothalamic	
	deep aching pain		Archispinothalamic	
Temperature	warm/hot		Paleospinothalamic	Main Sensory Trigeminal
	cool/cold		Neospinothalamic	
Touch	itch/tickle & crude touch		Paleospinothalamic	
	discriminative touch	touch		
		pressure		
		flutter		
		vibration		
Proprioception	Position: Static Forces	muscle length	Tr. spinobulbaris	Main Sensory Trigeminal
		muscle tension		
		joint pressure		
		muscle length		
	Movement: Dynamic Forces	muscle tension		
		joint pressure		
		joint angle		

<http://neuroscience.uth.tmc.edu/s2/chapter02.html>

# Trigeminální systém


© 2000 UTHSCH

- Nucleus tractus spinalis NT
  - Bolest teplota
- Nucleus sensorius principalis NT
  - Dotek, propriocepce



# Thalamus a neokortex


- Téměř všechny aferentní informace se přepojují v thalamu
- Výjimka - čich
- Spoje talamu a kůry jsou obousměrné




<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Neokortex

- Somatotopická organizace
- Kortikální zvětšení




<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>



[http://www.shadmehrlab.org/Courses/physfound\\_files/wang\\_5.pdf](http://www.shadmehrlab.org/Courses/physfound_files/wang_5.pdf)

# Bolest

- Nepříjemný smyslový a pocitový zážitek spojený s reálným nebo potenciálním poškozením organizmu
- Senzorická x psychologická komponenta
- ✓ Fyziologická bolest (aktivace nociceptoru)
- ✓ Patologická bolest (vzniká mimo nociceptor)
- ✓ Akutní (do 6měsíců) – „aktivační“
- ✓ Chronická (nad 6 měsíců) – „devastující“




[https://www.cheatography.com/uploads/davidpol\\_1460561912\\_Pain\\_Scale\\_\\_Arvin61r58.png](https://www.cheatography.com/uploads/davidpol_1460561912_Pain_Scale__Arvin61r58.png)

# Bolest a limbický systém

Navratilova E, Porreca F.  
Reward and motivation  
in pain and pain relief.  
*Nat Neurosci.*  
2014;17:1304–1312.


**Figure 1** The corticolimbic circuit integrates motivationally salient information, including pain, and makes decisions about action selection. The NAc receives afferent nociceptive information through connections with the thalamus, parabrachial area (PB), amygdala (Amy) and ACC. Direct projections from the spinal cord to the NAc may be postulated on the basis of findings in rodents<sup>47</sup> (red lines). VTA dopaminergic inputs to the NAc signal saliency, as well as the value of pain or relief. Corticostriatal connections from prefrontal, orbitofrontal and anterior cingulate cortices contribute to affective, emotional and cognitive control of pain perception and are involved in motivational decision-making. In the NAc, glutamatergic outputs from the amygdala converge on dopaminergic terminals from the VTA and influence motivated behavior in response to stress and anxiety (black lines). A descending pathway from the NAc that can modulate spinal nociceptive signals, possibly via the RVM, has been suggested<sup>109</sup> (gold dotted line). Chronic pain states are characterized by anatomical and functional reorganization of the corticolimbic circuit, including changes in gray matter density in the PFC, ACC and NAc and increased functional connectivity between the PFC and NAc<sup>108</sup>.



NAc – nucleus accumbens  
ACC – ant. Cingulate cortex.  
RVM – rostral ventromedial medulla

# Descendentní dráhy modulující bolest


- Somatosenzorický kortex
- Hypotalamus
- Periaquaeduktální šed'
- Nuclei raphe



<http://www.slideshare.net/drpsddeb/presentations>



# Modulace bolesti na spinální úrovni

## Vrátkování bolesti




[https://en.wikipedia.org/wiki/Gate\\_control\\_theory](https://en.wikipedia.org/wiki/Gate_control_theory)

# Přenesená bolest



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

# Fantomová bolest



<http://www.slideshare.net/drpsdeb/presentations>

## 73. Základní srovnání funkce somatosenzitivního systému, viscerosenzitivního systému a propriocepce. Význam senzitivity z hlediska bezprostředního a dlouhodobého přežití organismu.

- ✓ Somatosenzitivita vs. viscerosenzitivta vs. propriocepce
  - Definice, srovnání
- ✓ Dráhy somatosenzitivního systému (tři systémy)
  - Funkce/rozlišení
  - Význam z hlediska přežití (bezprostřední přeití vs. adaptace)
- ✓ Možno krátce o propriocepci
  - Svalová vřeténka vs. Golgiho šlachová vřeténka (Motorický systém I)

## 74. Bolest

- ✓ Definice
- ✓ Klasifikace (fyziologická, patologická, akutní, chronická)
- ✓ Dráhy bolesti
  - Rychlá vs. pomalá
- ✓ Modulace bolesti
  - Přehled struktur zapojených v modulaci bolesti
  - Vrátkování bolesti
- ✓ Přenesená bolest vs. fantomová bolest

M U N I  
M E D