

1 ZORNÉ POLE - PERIMETRIE

Klíčová slova

Zorné pole, monokulární a binokulární zorné pole, macula lutea, fovea centralis, foveola, vrstvy sítnice.


Pracovní část

Potřeby

Perimetr, schéma zorného pole, barevné terčíky.

Postup práce


1. Vyšetřovaná osoba sedí na židli, bradu opřenou o posuvnou desku, vzdálenost očí od oblouku perimetru asi 10 cm. Zavře jedno oko a celou dobu vyšetření nehýbe hlavou ani vyšetřovaným okem, tím pouze fixuje bílý terčík uprostřed perimetru.
2. Vyšetřující posunuje po vnitřním oblouku perimetru od periferie ke středu pomalým a přerušovaným pohybem terčíků jedné barvy. V určité úhlové vzdálenosti od středu vyšetřovaný začne terčík vidět.



Obrázek 23-1 Ukázka práce s perimetrem


Komentář: Měřící posunuje červený terčík od periferie směrem ke středu. Vyšetřovaná osoba nejdříve hlásí pohyb a poté i barvu. Začínáte v 90° poté bez pohybu perimetru můžete provést i 270°, poté posuňte perimetr do dalších úhlů.

3. V první chvíli vnímá pohyb, ale nerozezná dosud barvu, neboť periferní oblasti sítnice jsou fyziologicky barvoslepé. V tomto okamžiku odečtete na perimetru úhel. Zjištěnou hodnotu zakreslete černou značkou do předtištěné úhlové sítě na spojnici odpovídající kruhové souřadnici a poledníku, který se shoduje se sklonem roviny oblouku. Posunujeme-li terčík dále směrem ke středu, rozpozná náhle vyšetřovaný jeho barvu. Tento bod označte na úhlové síti příslušnou barvou (Obrázek 23-3, Obrázek 23-4).



Obrázek 23-2 Práce s perimetrem – postupné otáčení o 30°.

5. Vyšetření provedte pro jedno oko (pravé či levé) a pro jednu vybranou barvu (modrou, žlutou, červenou nebo zelenou) v rovinách: vodorovné (0–180°), 30–210°, 60–240°, 90–270°, 120–300° a 150–330° skloněné. Ze zakreslených bodů aproximujte obalovou křivku zorného pole zvlášť pro periferní (pohyb) a barevné vidění (viz Obrázek 23-5) .




Obrázek 23-3 Výsledný perimetr zahrnující měření vnímání barev a pohybu.

Hodnocení a výsledky

Výsledky perimetrie

Zaneste nejdříve hranice černobílého vidění a poté různými barvami hranice barevného vidění.



Závěr

2 VYŠETŘENÍ ZRAKOVÉ OSTROSTI A BARVOCITU

Klíčová slova

Optický aparát oka, skladba sítnice, tyčinky, čípky, mezní rozlišovací schopnost oka, teorie barevného vidění.

Pracovní část

Potřeby – zraková ostrost

Snellenovy optotypy.

Postup práce – zraková ostrost

1. Zrakovou ostrost určujeme pro každé oko zvlášť. Postavte se do vzdálenosti 5 m od vyšetřovací tabule a čtete nahlas písmena, na která ukazuje vyšetřující (ve směru od shora dolů).
2. Nejmenší písmena, která ještě zkoušený přečte bez chyby, jsou směrodatná pro určení tzv. vizu. Aby byl řádek optotypu uznán jako přečtený, musí vyšetřovaný správně přečíst alespoň 60 % znaků. Vizus je pak poměr vzdálenosti, z níž zkoušená osoba přečte znaky dané velikosti, tj. zde 5 m, ke vzdálenosti, z níž je přečte zdravé oko, což je číslo uvedené na tabuli. Zlomek udávající vizus nekrátíme.

Potřeby – barvocit

Tabulky pro vyšetřování barvocitu.

Postup práce – barvocit

1. Pro vyšetření barvocitu bylo stanoveno několik zásad, které musíme dodržet, chceme-li se vyvarovat mylných závěrů: vyšetřovaný sedí obrácen zády k oknu.
2. Tabulky umísťujeme ve výši očí do vzdálenosti jednoho metru. Umělé světlo, i tzv. „denní“, není pro přesná měření vhodné. Myop při vyšetřování brýle neodkládá, hypermetrop ano. Tam, kde vyšetřujeme ze vzdálenosti 30 cm (tab. F1-F4 Stilling-Hertelových tabulek), je tomu naopak.
3. Každou tabulku exponujte 5 až 15 vteřin. Všimněte si též, zda při expozici vyšetřovaná osoba projevuje rozpaky, váhavost, či zda čte obrazec snadno bez váhání. Tabulky nedovolte ohmatávat a neponechávejte je nikdy ležet otevřené na světle (trpí tím barevný tón tabulek). S těmito zásadami proveďte vyšetření u několika členů pracovní skupiny.

Výsledky a hodnocení

Zraková ostrost	
Měřená osoba
Proveďte měření zrakové ostrosti na dálku dle návodu a zanepte výsledky do tabulky.	
Levé oko vizus
Pravé oko vizus
Byla u měřené osoby pozorována snížená zraková ostrost?	

Hodnocení barvocitu

Měřená osoba

.....

Byla u měřené osoby rozpoznána porucha barvocitu?

Závěr

4 AKOMODACE A SCHEINERŮV POKUS

Klíčová slova

Čočka, závěsný aparát čočky, inervace ciliárních svalů, akomodace, optická mohutnost oka, refrakční vady, punctum proximum, punctum remotum.

Pracovní část

Potřeby


Scheinerův optometr.

Postu práce

Určení blízkého a vzdáleného bodu

1. Pozorujte oběma otvůrkami špendlík, který posouváte směrem k oku tak dlouho, až se začne jevit dvojitě. Vzdálenost špendlíku od oka je v tomto okamžiku rovna vzdálenosti pro punctum proximum, tj. nejbližšího bodu, na který ještě můžeme akomodovat. Hodnotu vzdálenosti přímo odečtete na pravítku. (Obrázek 26-8).

Pohled z boku




Obrázek 26-1 Pohled z boku na Scheinerův optometr.

Komentář: Oko se dívá přes dvě tenké štěrbinu tak, aby do oka vstupovalo omezené množství paprsků.

2. Vzdálenost bodu punctum remotum, který je u normálního oka v nekonečnu, lze na Scheinerově optometru určit jen u krátkozrakých osob. Postupujte opačně: od místa, kde vyšetřovaná osoba vidí špendlík jednoduše, se vzdalujte ke konci pravítka až se špendlík právě začíná rozdvíjet. V této vzdálenosti je punctum remotum (Obrázek 26-9).

Pohled od záklopky




Obrázek 26-2 Schéma pohledu přes štěrbinu Scheinera optometru.

Komentář: Vyšetřovaný hledí přes tenký průhled na špendlík. V maximální vzdálenosti metru hlásí, zda vidí nebo nevidí špendlík rozdvojeně. U zdravého oka je punctum remotum cca 5 metrů,

Průkaz akomodace -Scheinerův pokus

1. Použijte dvou jezdců se špendlíky, které umístíte do vzdálenosti 15 a 60 cm. Zaostřete na vzdálenější špendlík, bližší uvidíte dvojité.

Pohled z boku




Obrázek 26-3 Rozložení špendlíků při průkazu akomodace.

Komentář: Vyšetřovaný fixuje vzdálenější špendlík (červený), bližší špendlík vnímá dvojité z důvodu neoptimální akomodace čočky s ohledem na sledování bližších předmětů.

2. Zakryjte jeden z otvorů a zapište, který z obrazů (pravý/levý) bližšího špendlíku zmizí. Akomodujete-li naopak na bližší špendlík, jeví se vzdálenější dvojité. Opět zakryjte jeden z otvorů a zapište, který z obrazů (pravý / levý) vzdálenějšího špendlíku zmizí.

Hodnocení a výsledky



Obrázek 26-4 Příklad Scheinerova pokusu při zavřené pravé záklopce



Komentář: Příklad Scheinerova pokusu při zavřené pravé záklopce: uvažovány jsou obě oči při fixaci jak na bližší, tak i vzdálenější špendlík. Kruhá hlavička označuje špendlík, který je zrakem fixován, a tedy vnímán ostře (nezdvojeně). Půlkruhá hlavička označuje špendlík vnímán zdvojeně. Chybějící polovina naznačuje, který ze zdvojených obrazů zmizí při uzavěru příslušné záklopky.

2.Scheinerův pokus



Scheinerův pokus – ukázka pro blízký bod

Zakreslete výsledek měření pro obě oči podle ukázky. Začněte nákresem špendlíků (lokalizace, který zmizí apod.), poté mohutnost čočky (vypuklá/oploštěná s ohledem na bod, který byl fixován), nakonec dokreslete světelné paprsky a jejich cestu přes otvůrky clony, oční bulbus až po dopad na sítnici.



2.a Scheinerův pokus – Blízký bod, zavřená pravá záklopka

Levé oko	
Pravé oko	



2.b Scheinerův pokus – Blízký bod, zavřená levá záklopka

Levé oko	
Pravé oko	

2.c Scheinerův pokus – Vzdálený bod, zavřená pravá záklopka

Levé oko	
Pravé oko	

2.d Scheinerův pokus – Vzdálený bod, zavřená levá záklopka

Levé oko	
Pravé oko	

Závěr

5 ASTIGMATISMUS

Klíčová slova

Refrakční vady, fyziologický astigmatismus, korekce astigmatismu.

Pracovní část

Pomůcky

Keratoskopy.

Postup práce

1. V ideálním případě provádějte vyšetření jak Placidovým keratoskopem, tak pomocí Fuchsových obrazců na jedné osobě, aby bylo možné vzájemně porovnat výsledky.
2. Postavte se do vzdálenosti 3 metrů od Fuchsova obrazce a sledujte jedním okem střed obrazu. Při přítomném astigmatismu se budou paprsky kružnice deformovat nebo budou některé její úseky rozostřené.
3. Není-li fyziologický astigmatismus vašeho oka dosti zřetelný při této zkoušce, můžete jej simulovat. Zatlačte zlehka přes okraj horního víčka dvěma prsty na rohovku z obou stran, čímž ji lehce zdeformujete. Stačí nepatrný tlak, aby se objevil astigmatismus.
4. Vyšetření opakujte i na druhém oku.
5. Pokračujte ve vyšetření Placidovým keratoskopem. Vyšetřující osoba se dívá přes střed keratoskopu do oka vyšetřované osoby a postupně se přibližuje tak dlouho, dokud nevidí v zornici vyšetřované osoby odražené kruhy keratoskopu. V případě, že vyšetřující zaznamená deformaci kružnice, jedná se o nález přítomnosti astigmatismu.
6. Vyšetření opakujte i na druhém oku.
7. Výsledky zanepte do výsledné tabulky.

Hodnocení a výsledky

	Astigmatismus	
	Levé oko	Pravé oko
Subjektivní hodnocení Fuchsovým obrazcem		
Objektivní hodnocení Placidovým keratoskopem		

Závěr

Podářilo se prokázat pŕítomnost fyziologického nebo patologického astigmatismu? Jak se koriguje tato vada?