

M U N I
M E D

POROD MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

PRVNÍ POMOC (BSPP011)
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
- PŘEDNÁŠKA + CVIČENÍ (MRPP0111p)
+ MRPP0111c)
LF MU, ÚZV
Podzim 2023



Příznaky porodu


- Pravidelné kontrakce s intervaly do sedmi minut
- Odtok plodové vody
- Slabé krvácení



První doba porodní

– 1. doba porodní

- Zkracování děložního hrdla až do úplného zániku
- U prvorodičky trvá 10 - 12 hodin
- U vícerodičky 6 - 8 hodin



– Otevírací fáze

- Kontrakce nejsou nahodilé
- Pravidelné intervaly do 7 minut
- Zkracování a roztahování děložního hrdla
- Končí zánikem děložního hrdla

– Přechodná fáze

- Zesílení stahů
- Hlavička začíná rotovat
- Sestupuje do porodních cest (nejnáročnější fáze porodu)

První doba porodní (doba otevírací)



Druhá doba porodní


– 2. doba porodní (vypuzovací)

- Začíná v okamžiku otevření hrudního dýchaní
- Hlavice sestupuje k pánevnímu dnu, kde provede vnitřní rotaci a až po té žena může tlačit
- Hluboký nádech, zadržení dechu a silné zatlačení do konečníku v době kontrakce, zatlačení opakuje třikrát během kontrakce
- Mělké zrychlené dýchání mezi kontrakcemi

Druhá doba porodní



Druhá doba porodní



Třetí doba porodní

– 3. doba porodní

- Porod placenty
- Asi 15 minut po porodu dítěte



Překotný porod

- Porod trvající méně než dvě hodiny a probíhající spontánně
- Zkracuje se první doba porodní
- V terénu je nutné provést porod, jakmile započnou velmi silné kontrakce v rychlém sledu, které nutí rodičku tlačit
- Z hlediska zachránce je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu
- Okamžitě volat ZZS a rychle improvizovat

Výskyt překotného porodu

- U vícerodiček
- Měkčí porodní cesty
- Nedostatečný uzávěr děložního hrdla
- Silné děložní stahy
- Malý plod



Nebezpečí překotného porodu pro matku

– Žena je ohrožena

- Poraněním děložního hrdla či pochvy
- Rizikem vzniku krevních výronů
- Trhlinami hráze



Nebezpečí překotného porodu pro dítě

– Dítě je ohroženo

- Nitrolebečním krvácením, když plod příliš spěchá, na jeho hlavičku působí nadměrný tlak silných a častých děložních kontraktcí nebo matka tlačí příliš brzy do nedostatečně otevřených porodních cest
- Přetržením pupečníku, dítě může snadno a rychle vykrvácat
- Rychlým vyklouznutím z porodních cest, dítě se může silně uhodit o tvrdou podložku




Co dělat při překotném porodu

- Zavoláme zdravotnickou záchrannou službu (asistence operátora)
- Nahlásíme
 - Prvorodička / vícerodička
 - Týden těhotenství
 - Frekvence kontrakcí
 - Plodová voda
 - Připravíme se na porod



Příprava na porod

- Zabránit zanesení infekce
 - Umýt ruce, čistá látka
- Udržení teploty novorozence
 - Ručníky, prostěradlo, deka, oblečení...
- Zaujmout vhodné polohy rodičky
 - Nejlépe na podlahu (prevence pádu rodičky i dítěte)



Porod

- Je vyvíjena snaha zpomalit porod, překonávat děložní kontrakce
 - Prevence nitrolebečního poranění plodu, prodýchávat kontrakce, netlačit hned
- Nutno chránit hráz
 - Mírná tlak prstů
- Dítě nikdy nevytahujeme z porodních cest násilím



Porod

- Omotaná pupeční šňůra okolo krku - zasuneme prst pod šňůru a jemným tahem ji přetáhneme přes hlavičku
- Pozor! Porovené dítě je mokré, velké riziko vyklouznutí



Péče o novorozence



Péče o novorozence

- Dítě uložíme na bok mezi nohy rodičky a vyčistíme ústa od plodové vody, **v této fázi NIKDY nezvedáme dítě nad úroveň břicha matky** - působením gravitace by krev natekla zpět do placenty a došlo by k vykrvácení dítěte
- Dítě začne samo dýchat - nemusí vždy křičet
- Vždy je nutné zkontolovat dýchání
- V případě poruch dýchání zahájíme KPR

Péče o novorozence

- Pupečníkovou šňůru nestříháme, pokud pulzuje (vykrvácení dítěte)
- Až dopulzuje, ve vzdálenosti cca 20 cm od bříška dítěte podvážeme na dvou místech vzdálených od sebe cca 10 cm
- S přestřížením je vhodný počkat na příjezd záchranářů
- Dítě neotíráme, neumýváme, zabalíme, přikryjeme, uložíme na břicho rodičky

Porození placenty

- Porození placenty
 - Většinou spontánně, do $\frac{1}{2}$ hodiny po porodu dítěte
 - Za pupečníkovou šňůru netaháme
- Po porodu placentu uschováme pro kontrolu (kotyledonů), zabalíme nejlépe do igelitového obalu



Poporodní péče o rodičku

- Necháme rodičku odpočívat
- Kontrolujeme vitální funkce a krvácení z rodidel
- Odvoz do zdravotnického zařízení



Překotný porod

- Panika nikam nevede
- Rodící ženě pomáháme s co největším klidem
- Zaznamenáváme časové údaje průběhu porodu



Použité zdroje

— Obrázky - pixabay.com

