

Huhňavost (rinolalia)

- patologicky změněná nosovost
- výskyt u 18% dětí předškolního a mladšího školního věku
- lékařská terminologie - rhinofonia

Zavřená huhňavost (rinolalia clausa, hyporinolalia, hyporinofonia)

- následek orgánových změn zmenšením prostoru dutiny nosní a nosohltanové
- nedostatek podílu nazality na tvorbě hlasu a řeči
- změny – přechodné, trvalé

Otevřená huhňavost (rinolalia aperta, hyperrinolalia, hyperrinofonia)

- patologicky zvýšená nosovost
- přebytek podílu nazality na tvorbě hlasu a řeči
- silné nosní zbarvení orálních hlásek
- příčiny – orgánové/ funkční, vrozené/ získané

Smíšená huhňavost (rhinolalia mixta)

- kombinace otevřené a zavřené huhňavosti (orgánová překážka v nose a současně insuficientní velogaryngeální mechanismus)
- existuje 302 smíšených forem

1. Rhinolalia clausa – etiologie:

PŘÍČINY ORGÁNOVÉ

- vrozené:**
 - deformace nosní přepážky
 - úzké nosní průduchy
- získané:**
 - zduření nosní sliznice
 - adenoidní vegetace
 - nádory, polypy, cysty
 - hypertrofie tonsil
 - deformace po úrazech

•PŘÍČINY FUNKČNÍ

- funkční poruchy svalstva měkkého patra – způsobující zvýšenou činnost a sílu VF závěru

2. Rhinolalia aperta – etiologie:

PŘÍČINY ORGÁNOVÉ

- vrozené:
 - rozštěpy patra
 - submukózní rozštěpy
 - vrozené zkrácení měkkého patra
 - nedostatečný vývoj svalstva měkkého patra
 - patologická činnost svalstva měkkého patra
- získané:
 - perforace tvrdého patra
 - centrální, periferní obrny
 - obrny měkkého patra po CMP

PŘÍČINY FUNKČNÍ

- při hysterii, neurózách
- u neslyšících
- při MR
- návyková (habituální) huhňavost – po adenotomii, tonzilektomii
- důsledek nesprávného mluvního vzoru

3. Rhinolalia mixta – etiologie:

- kombinace hypernazality a hyponazality
- hypertrofie sliznice při rýmě a nedostatečná funkce patrohltanového závěru
- zvětšená nosní mandle a organicky podmíněná velofaryngeální insuficience....