

Podkmen: **Obratlovci** Vertebrata

Obecné znaky:

1. **Metamerní segmentace** těla i v dospělosti
(nervová soustava, páteř, trupové svalstvo)
2. Podélné rozčlenění těla na nejméně **tři oddíly**:
hlava, trup a ocas
3. Nervová soustava v podobě **míšní trubice s** vystupujícími
párovými míšními nervy
4. **Uzavřená cévní soustava** podobná stavbou bezlebečným

Obratlovci - zvláštní znaky:

- aktivně pohybliví, bilaterálně symetričtí
- oporná soustava: náhrada chordy **páteří z obratlů**, vyvíjí se chrupavka a kost. **Redukce chordy** k nepatrným zbytkům (savci) až úplnému zániku (ptáci)
- končetiny s vnitřní kostrou v podobě **ploutve** (*ichtyopterygium*) nebo **nohy** (*chiropterygium*)
- **mnohorstevná pokožka** a škára s různými útvary (pancíře, šupiny, peří, srst) a opatřená deriváty
- diferenciace **mozku do oddílů**, zvyšování významu **koncového** mozku, spinální **ganglia** na dorzálních kořenech míšních nervů
- výkonné **smyslové orgány** soustředěné na **hlavovou část** (uložení v lebce)
- **uzavřená cévní soustava se srdcem**, hemoglobin v erytrocytech
- párové **ledviny mezodermového** původu
- složitá soustava **žláz s vnitřní sekrecí**, z endostylu štítná žláza zajišťující spolu s NS integraci životních pochodů
- vývoj **zárodečných obalů** (kromě vaječných o.) k zajištění reprodukce v podmínkách souše
- nárůst počtu genů, zesložitění genů Hox

Nadtřída:


BEZČELISTNÍ Agnatha

- nejprimitivnější, nejstarší obratlovci rybího tvaru
 - chybí čelisti
 - primitivní mozek a smyslové orgány (2, resp. 1 polokružné chodby ve vestibulokochleárním ústrojí)
 - nepárový čichový orgán ústí spolu s hypofýzou nazohypofyzárním kanálem
 - 5 - 15 párů žaberních štěrbin (žaberní kanálek, žaberní váček)
- Fosilní - ordovik, devon - vymírají, dodnes pouze asi 100 druhů

Třída:


ŠTÍTNATCI Ostracodermi

- rybí tvar
- hypo-, hetero-cerkní ploutev, párové hrudní
- kožní pancíř i šupiny
- bentičtí mikrofágové do 1,5 m, většinou 30 cm
- sladké i slané vody
- vymřelí



Hlavoštítí *Osteostraci* (*Cephalaspides*)


dorzoventrálně zploštělý, štít, heterocerkní ocasní ploutev,
hlavový elektrický orgán
Hemicyclaspis (A), *Cephalaspis*



Birkenie *Anaspida*

Vřetenovití, dorzoventrálně zploštělí, s pancířem i bez, šupiny a
destičky, náznaky endoskeletu a ploutevních paprsků


Pterolepis, *Birkenia* (B)



Ploutvoštítí *Heterostraci* (*Pteraspides*)

Vřetenovití s dorzoventrálním zploštěním, kostěnný štít i na prsních
přívěscích (rozpad), párové nosní jamky?, šupiny s dentinem

Pteraspis (C), *Anglaspis*



Arandaspida,

Gondwanská (J. Amerika, Austrálie) endemická fauna příbojových
zón v ordoviku – *Anatolepis*


Astraspida

Thelodonti – šupinaté pokročilé formy (žaludek)

Obr. 73 Schéma tělesné stavby konodonta a jeho orofaryngeálního aparátu. A – tělo, B – detail hlavové části, C – elementy orofaryngeálního aparátu. 1 – nervový provazec, 2 – chorda, 3 – myomery. Podle Kardonga (2002).

KONODONTI Conodonta



- úhořovité tělo (cm)
- chorda, dermální skelet, paprsky ocasní ploutve, sluchová pouzdra
- ústně-hltanový (oro-faryngeální) aparát. Mineralizovaná tkáň z apatitu jako dentin a sklovina.
- velké oči, neuromasty
- marinní sedimenty starších prvohor (pozdní kambrium) až triasu (stratigrafický význam). Mezi vymřelými bezčelistnatci a kruhoústými.





Třída:

KRUHOÚSTÍ Cyclostomata

- válcovité tělo s druhotními zjednodušeními (lysá kůže, ploutevní lem, bez párových přívěsků)
- skelet: hlavový (chrupavčitá baze lebky)
osní (chorda), horní oblouky obratlů
útrobní (8 párů viscerálních oblouků)
- primitivní mozek, jednoduché vnitřní ucho
- modifikace predátorství, ústní dutina s odontoidy, antikoagulanty, chybí žaludek, řasa ve střevě
- žaberní štěrbiny (7) s váčky a lamelami
- prvoledviny






Kruhoústí (Cyclostomata: D larva (minoha), E samec, F samice mihule potoční (*Lampetra planeri*), G sliznatka *Myxine*)

Obr. 67. Schéma tělesné stavby kruhoústých (Cyclostomata): A – larva mihule, B – dospělá mihule, C – sliznatka, D – kostra mihule. 1 – nosní otvor, 2 – mozek, 3 – ústní dutina, 4 – chorda, 5 – hiltan, 6 – žaberní štěrbiny, 7 – endostyl, 8 – břišní a 9 – hřbetní aorta, 10 – srdce, 11 – nasohypofyzární vak, 12 – mícha, 13 – rohovité zuby, 14 – dýchací část hiltanu, 15 – vousky (tentaculae), 16 – nasohypofyzární chodba, 17 – různé chrupavky pololebky mihule, 18 – čichové pouzdro, 19 – mozkovna, 20 – „sluchové“ pouzdro, 21 – horní oblouky obratlů, 22 – podočnicový oblouk, 23 – podjazyková chrupavka, 24 – žaberní oblouky, 25 – osrdečníková chrupavka. Podle Schimkewitsche, Remaneho a spol. a Matvejeva a Gurcového.

MIHULE Petromyzoniformes (řád)

(třída) **MIHULE Petromyzoniformes**

- ve vestibulokochleárním ústrojí 2 polokružné chodby
- nespojené alternující kořeny míšních nervů
- slepý žaberní vak
- slepý nasohypofyzární vak
- gonochoristé, pohlavní žlázy nepárové a bez vývodu, larva (bezoká minoha). Malé druhy málo (3 000), velké mnoho (300 000) jiker. Hynou.
- larva holonefros, dospělci opistonefros
- převážně anadromní, sladkovodní zástupci
- výživa: modifikovaná predace
- 44 druhů



Mihule říční *Lampetra fluviatilis* – 40-50 cm, evropská moře mimo Černé
M. mořská *L. marinus* – 1 m, Atlantik, sladkovodní americká forma
M. potoční *L. planeri* – sladkovodní, nepřijímá potravu
M. ukrajinská *Eudontomyzon mariae*, sladkovodní, nepřijímá potravu
M. karpatská *E. danfordi* – povodí Dunaje, sladkovodní, přijímá potravu

SLIZNATKY Myxiniformes (Myxini)

SLIZNATKY Myxiniformes (Myxini)

- hvězdicovitý ústní otvor, tykadla (4 páry), rohovité odontoidy na jazyku
- kožní žlázy
- otevřený nasohypofyzární kanál
- mohutný dvoulaločný jazyk
- různý počet žaberních otvorů – *Bdellostoma* 6 – 14 párů, *Paramyxine* 6 p. vzadu, *Myxine* 7 p. s jediným vývodem
- redukce skeletu (chybí žaberní skelet, chorda bez oblouků obratlů)
- atrofie očí (chybí zrakový a okohybné nervy)
- spojené kořeny míšních nervů
- ve vestibulokochleárním ústrojí 1 polokružná chodba
- mesovarium + mesorchium s funkčností jediné
- izoosmotičtí, v mládí holonefros, dospělci opistonefros
- vývoj přímý (polylecitální 1 cm vejce s háčky), převaha F
- více než hrabavých 60 druhů na kontinentálním shelfu s vysokou hustotou

Sлизnatка цізопасна (G) *Myxine glutinosa* – Атлантик, $\frac{1}{2}$ м предацьний некрофаг

Sлизнатка *Bdellostoma* – Тихий океан, Індія

