

Trávící soustava

Klinické projevy onemocnění:

→ zvracení

- příznak: náhlých příhod břišních, anomálie TS (zvracení spastické – obloukem)
zvýšeného nitrolebního tlaku (zvracení bez nauzey)
neuróz (opakovaná zvracení)
virové infekce (3.-7.rok)

→ nechutenství

- příznakové nechutenství (infekce - inkubač. doba, skrytá infekce, probíhající inf., anémie
- návykové nechutenství – psychické příčiny - při nucení do jídla

→ přejídání (bulimie)

- přejídání + následné zvracení
- ohrožená sk. - dospívající dívky

→ bolesti břicha

- projev: psychické poruchy
náhlé příhody břišní aj.
- malé děti špatně lokalizují bolest (většinou ji lokalizují do obl. pupku)
- kojenci – pláčí, přitahují nožičky k bříšku, bolest často vyvolána spolykaným vzduchem při pití
 - kojenecké koliky - při výrazném hromadění plynů (meteorismus)
- určujeme: charakter bolesti, lokalizaci a propagaci, frekvenci a faktory vyvolávající nebo zmírňující bolest

→ průjem

- kojenci: řídké stolice (normální – fyziologicky podmíň.)
- pozorujeme: hlen, krev, hnus ve stolici
 - frekvenci stolice
 - charakter
 - teplotu (příznak infekce)
- přirozeně průjem po změně kvality nebo kvantity stravy

→ zácpa

- útlum pocitu potřeby na stolici
- stolice je tuhá a vyprazdňování delší než 48 hod.
- může docházet k mimovolnému odchodu stolice (častěji u chlapců, tzv. umazávání)

→ neprospívání

- soubor příznaků

Choroby ústní dutiny

→ **moučnívka (soor)**

- kandidóza (přemnožení kvasinek *Candida albicans*)
- kojenci, oslabení jedinci
- projevy: bílé povlaky na sliznici ústní dutiny
bolestivost
- léčba: širokospektr. antibiotika
- prevence: hygienické návyky

Péče o zuby:

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/212411058130002/video/>

Choroby jícnu

→ **tracheoezofageální pištěl**

- vrozená vývojová vada (25% anomálií TS) – neprůchodnost jícnu
- pištěl (= fistula) - abnormální kanálek tvořící komunikace mezi dutinou a jejím povrchem
- často spojení jícnu s průdušnicí
- léčba: chirurgická
- příznaky : salivace, cyanóza (po podání potravy – strava do jícnu a průdušnice!!), dechové potíže

→ **reflexní choroba jícnu**

- zpětné proudění kyselého žaludečního obsahu do jícnu → ublinkávání, zvracení
- příčina : hypotonus jícnové svěrače
- dgs: vyloučit organické postižení, metabolit. vadu, infekci, neurolog. onem.
 - měření pH v jícnu
 - ultrazvuk, endoskopie
- následky: zánět jícnu, aspirace žalud. obsahu – infekce DS, astma
- příznaky : zvracení, neprospívání, bolest na hrudníku, anémie, záněty DS
- léčba: úprava stravy , polohování, zahuštění stravy, léky (prokinetika – urychlují pasáž TS)

→ **jícnové varixy**

- z nich krvácení do TS (okultní = skryté → masivní, až smrt)
- u pacientů s chronic. jater. nemoc. (portální hypertenze – oběh jícen – žaludek)
- dgs.: endoskopie, rtg
- léčba: zástava krvácení (tamponáda, farmakologicky, sklerotizace = aplikace látky, uzavření varixů)

→ **vrozené brániční hernie (kýly)**

- defekty bránice → přesun břišních orgánů (tenké a tlusté střevo, žaludek, játra, slezina, ledvina) do hrudníku
- projevy: cyanóza, dušnost, tachykardie, propadlé břicho, zvracení
- léčba: chirurgická

Onemocnění žaludku

→ **peptický vřed a gastritida (zánět žaludku)**

- nejčastěji mezi 12.- 18. rokem, častěji u chlapců
- **vřed:** při agresivním působení na žalud. sliznici, při porušení žaludeční bariéry (hluenu)
→ dochází k vlastnímu trávení sliznice
- vliv infekce Helicobacter pylori → vředy a nádory v dospělosti
- výskyt vředů u dětí : vliv stresu
- **gastritida:** poškození buněk vylučujících HCl nebo hlen
- příznaky : nechutenství, zvracení, neklid po jídle, krvácení do TS
- dgs. : klinické příznaky, endoskopie, krev – protilátky na Hel.pyl. (pokud ano – antibiotika)
- léčba: úprava diet. Režimu, odstranění stresu, léky (antacida = ↓ kyselost, léky na sniž.tvorby HCl), popř. chirurgic.zásah

Onemocnění tenkého střeva

→ **malabsorpční syndrom:**

- skupina chorob, při které dochází k poruše trávení, vstřebávání, sekrece nebo motility (pohybu) tenkého střeva

→ **celiakie** (nesnášenlivost lepku)

- 1: 300 – 15 000 (ČR 1: 6000)
- první příznaky do 2 let
- atrofie klků tenkého střeva - porucha resorpce
- příčina : autoimunitní rce. na lepek
- příznaky: objemné a páchnoucí stolice, průjmy – až dehydratace, acidóza, ŠOK (viz. 1.pomoc), hypotrofie, vyklenuté bříško, anemie, hypovitaminóza (křivice), psychické změny (negativismus, apatie, mrzutost)
- častější výskyt u diabetiků 1.typu
- dgs. : enterobiopsie (= odběr kousku střevní sliznice sondou zavedenou ústy do tenkého střeva), zjištěování protilátek v krvi
- léčba: dieta (bez mouky – tj. i masné výrobky, kečupy...) – nahrazuje je sójou, rýží a bramborami

TEP 24: autoimunitní onemocnění (celiakie, Crohnova choroba, fenyketonurie)

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/211411058130001/video/>

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/202327274210023-diagnoza/>

→ **cystická fibróza** (postižení slinivky) → porucha trávení

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/212411058130001/video/>

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095946610-diagnoza/210572241500006-cysticka-fibroza/>

Onemocnění tlustého střeva

→ zánět slepého střeva (appendicitida)

- častá u dětí školního věku
- příznak : akutní bolest břicha
 - zvracení
 - lehce zvýšená teplota
 - napětí břišní stěny v oblasti jámy kyčelní
 - neklid
 - zácpa, průjem
- dgs.: per rektum
- léčba: chirurgická
- komplikace: perforace střeva, u dívek – zánět přejde na vaječníky (probl. s otěhot.)

→ Crohnova choroba

- postihuje děti ve školním věku a mladistvé
- autoimunitní onemocnění
- chronický zánětlivý proces celé střevní stěny
- příznaky: teplota, bolesti břicha (kolem pupku), nechutenství, poruchy růstu, anémie
 - mimostřevní příznaky : artritida, ekzémy
- dgs.: endoskopie, biopsie
- léčba: dieta, léky, chirurgická léčba

→ zácpa (obstipace)

- obtížné, méně časté a málo vydatné vyprazdňování stolice
- vliv: psychologické faktory, technika vyprazdňování, kvalita stravy
- akutní zácpa: při změně místa pobytu, cestování, nezvyklé skladby stravy
- organická zácpa: anatomické změny tlustého střeva (polypy, záněty, nádory)
- sekundární zácpa: při používání léků
- návyková zácpa: útlum až vyhasnutí defekačního reflexu (při vědomém potlačování stolice) + nevhodná strava (málo vlákniny) + málo tekutin
- spastická zácpa: porucha nervové regulace, časté křeče břicha
- psychogenní zácpa: batolata, projev emocionálních poruch
- léčba: příjem vlákniny
 - defekační režim (lačno – tekutiny, tvorba podmíněných reflexů)
 - projímadla (krátce)

→ průjmová onemocnění

- časté vyprazdňování řidší stolice
 - příčiny u kojenců: predispozice: umělá výživa, chyby při kojení, oslabení organismu, výchovné a hygienické chyby, kolektivní péče
- 1) **infekční průjmy:**
 - a) střevní (enterální) infekce: bakterie (Escherichia coli, salmonela), viry, paraziti (*Lamblia intestinalis*), kvasinky
 - b) mimostřevní (parenterální) infekce: kombinace respirační a průjmov.onemocnění

2) neinfekční průjmy:

- vznikají při změnách skladby a množství potravy
- příčiny: potrava s vysokým obsahem tuků
 - podvýživa (hladové průjmy)
 - karence bílkovin
 - malabsorpční syndrom

- příznaky: nechutenství, neklid, zvracení, vzedmuté břicho, subfebrilie, příznaky celkové metabolické poruchy (dehydratace, acidóza, šok, oligurie), vpadlé oči, kožní turgor snížen
- léčba: dieta, rehydratační roztoky, kojení nepřerušovat, léky (dle potřeby antibiotika)

Parazitární onemocnění trávícího traktu

→ **roupy (oxyuriasis)**

- zdroj : (ovovce, zelenina) – OMÝT!!!! vajíčka → trávící soustava → konečník řitní otvor → kladení vajíček → svědění → škrábání → nehty → ústa → REINFEKCE
- léčba: léky, důkladná hygiena

→ **škrkavky (ascariasis)**

- zdroj: nedostatčená komunální hygiena (pískoviště)
- trávící soustava → larvy → kapiláry → plíce → ústní dutina → spolknutí
- příznaky: nauzea, nechutenství, zvracení, bolest břicha, podráždění slepého střeva aj.
- dgs.: paraziti ve stolici
- léčba: antihelmintika

→ **tasemnice (taeniasis)**

- zdroj: nedostatečně upravené hovězí maso
- projevy: bolest břicha, průjem, hubnutí, anémie
- léčba: léky

→ **lamblie střevní (lambliasis)**

- zdroj: kontaminovaná potrava nebo voda
- dvanáctník
- příznaky: chronický průjem (zápech, pěna, světlá barva), hubnutí, vzedmuté břicho, plynatost – mechanická blokáda, nutriční kompetice lamblí
- dgs.: parazit ve stolici
- léčba: léky
-

Hemeroidy:

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/212411058130004/video/>

Krev ve stolici:

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/212411058130004/video/>

Onemocnění jater

→ **virová hepatitida A**

- inkub.doba : 15 – 45 dnů
- příznaky : únavnost, nechutenství, bolest hlavy, kloubů, svalů, bolest v jaterní krajině, zvracení

→ **hepatitida B, C** → přechod do chronicity → cirhóza

- ohrožená skupina: narkomani, prostitutky → přenos při porodu (matka – dítě)

→ **cirhóza**

- vzniká i při poruchách látkové přeměny

→ **jaterní onemocnění při** : infekčních nemoc. př.monomukleóza, nemoc. TS, vrozených a získaných poruchách látkové přeměny, při užívání některých léků, při otravách

- příznaky : nechutenství, slabost, nauzea, zvracení, bolest břicha, horečka, světlá stolice, tmavá moč

- dgs.: pohmat – zvětšená játra, zmenšená játra (cirhóza)

zvýšená krvácivost

krevní zk.

→ ***hepatopatie novorozenců a kojenců***

- hepatitidy (55%): hep.B (od matky), toxoplasmóza, rubeola → hepatitida
- malformace žlučových cest (15%) – neprůchodnost žluč.cest → vznik jaterní cirhózy
- při poruchách látkové přeměny (u galaktosemie – mléčný cukr, intolerance fruktózy)