

## Somatometrie, klinická antropometrie


### **Teorie:**



Somatometrie je základní výzkumná metoda v antropologii. Jedná se o měření tělesných proporcí a rozměrů na živém jedinci. Pravidla, rozdelení, hranice a klasifikace, které somatometrie zahrnuje, jsou vytvořeny uměle a jsou věcí dohody a úmluvy. Každý výzkumník musí mít možnost zvolit si a použít pozorování a míry, které jsou pro jeho práci nevhodnější a které sledovanému účelu nejlépe vyhovují. Tzn. ještě před měřením probanda, si musíme položit tři základní otázky:

1. Co chceme měřit a čeho chceme dosáhnout, neboli jaký údaj chceme měřením získat?
2. Jakým způsobem chceme dané rozměry zjistit? Stanovíme si tedy antropometrické body, které vymezují antropometrický rozměr.
3. Jaký zvolit instrumentář?

### **Pomůcky:**

- a) antropologická měřidla – antropometr – využívá se pro měření výšky těla
- b) koordinátní měřidlo
- c) dotykové měřidlo (kefalometr) měření rozměrů hlavy a jiných menších rozměrů na těle, pelvimetru – měření šířkových a hloubkových rozměrů, torakometr
- d) kaliper – měření kožních řas
- e) posuvné měřidlo
- f) pásová míra - při měření obvodových a obloukových rozměrů
- g) váha – pro zjišťování tělesné hmotnosti
- h) dynamometr – užívá se k zjištění svalové síly, zejména stisku ruky
- ch) vzorníky podle autorů – Fischer, Saller, Broca....





### Vybrané rozměry hlavy

**Zdroj:** Bláha P., Vignerová J. et ali (1999): Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16), SZÚ Praha.


**Vybrané body na hlavě:**

- Euryon (eu): bod ležící na hlavě nejvíce laterálně, v oblasti temenní nebo spánkové kosti, stanovuje se při měření největší šířky hlavy
- Glabella (g): bod ležící nejvíce vpředu v mediální rovině nad nosním kořenem na dolní části čela mezi obočím.
- Nasion (n): bod ležící v mediální rovině na kořeni nosu v místě *sutura frontonasalis* na horním okraji nosních kůstek (*osse nasalia*). Tento bod tudíž neleží vždy nejvíce ve skleslině nosního kořene. Zjistíme jej palpací, při zjišťování mělké brázdy švu můžeme použít nehtu.
- Opistocranion (op): bod ležící v týlní části hlavy v mediální rovině, nejvíce vzdálený bod od bodu glabella.
- Gonion (go): bod na úhlu dolní čelisti, který leží nejvíce dole a nejvíce laterálně.
- Zygion (zy): bod na jařmovém oblouku ležící nejvíce laterálně. Stanovuje se při měření největší šířky obličeje.
- Alare (al): bod ležící nejvíce laterálně na nosním křídle. Stanovuje se při měření šířky nosu.
- Subnasale (sn): bod ležící v úhlu, který svírá nosní přepážky a horního rtu.

**Základní rozměry a indexy klinické antropometrie na hlavě**


**Délka hlavy** – vzdálenost bodu g od bodu op, měříme pelvimetrem nebo kefalometrem.

U dospělého muže    16,9 – 19,4 cm  
U dospělé ženy       16,1 – 18,5 cm



**Šířka hlavy** - vzdálenost eu-eu

Muži    13,9 – 16,4 cm  
Ženy    13,4 – 15,8 cm




**Délkošírkový index**


$$\text{Délkošírkový index} = \frac{\text{největší šířka hlavy} \times 100}{\text{největší délka hlavy}}$$

vyhodnocení:

- x-75,9 ..... hlava dlouhá
- 76,0-80,9 ..... hlava střední
- 81,0-85,4 ..... hlava krátká
- 85,5-x ..... hlava velmi krátká



**Šířka úhlu dolní čelisti** – vzdálenost go – go, měříme kefalometrem nebo pelvimetrem



**Šířka obličeje** – vzdálenost zy – zy, měříme kefalometrem nebo pelvimetrem

**Šířkový index obličeje**

$$\text{Šířkový index obličeje} = \frac{\text{šířka úhlu dolní čelisti} \times 100}{\text{šířka obličeje}}$$

## Praktická cvičení č. 5+6

Jméno:


Hodnocení:

Obličej	muži	ženy
Velmi úzký	x-69,9	x-67,9
Úzký	70,0-74,9	68,0-72,9
Střední	75,0-79,9	73,0-77,9
Široký	80,0-84,9	78,0-82,9
Velmi široký	85,0-x	83,0-x



**Šířka nosu (nosních křidélek) – vzdálenost al – al, měříme posuvným měřítkem**

**Výška nosu – vzdálenost n – sn, měříme posuvnám měřítkem**




**Výškošířkový index nosu**

$$\text{Výškošířkový index nosu} = \frac{\text{šířka nosu} \times 100}{\text{výška nosu}}$$

Hodnocení:

Velmi úzký nos	x-54,9
Úzký nos	55,0-69,9
Střední nos	70,0-84,9
Široký nos	85,0-x



**Morfologická výška obličeje – přímá vzdálenost mezi body nasion a gnathion (n – gn).**

Používá se pro výpočet Indexu morfologické výšky obličeje (n-gn) a šířky obličeje bizygomatické (zy – zy)

$$\text{Morfologický obličejoový index} = \frac{\text{morfologická výška obličeje} \times 100}{\text{šířka zygomatického oblouku}}$$

Hodnocení:

< 78,9	velmi široký
79,0 – 83,9	široký
84,0 – 87,9	střední
88,0 – 92,9	úzký
≥ 93,0	velmi úzký

**Obvod hlavy – pásová míra, obvod měřený přes body glabella a opisthokranion.**

Pásová míra přiléhá těsně k hlavě a je po obou stranách hlavy stejně vysoko.



Hodnocení:

Norma u dospělého muže	54-59(60)cm
Norma u dospělé ženy	52-57(59)cm

### Proporce krásy


O matematické zhodnocení fyzické krásy se pokusil Cunningham (1986). Hodnotil 50 žen, z nichž více než polovina byly finalistky mezinárodních soutěží krásy. Ideální proporce obličeje dle jeho výsledků by měly být:

- šířka obličeje měřena v úrovni očí se rovná trojnásobné šířce oka (obr. 10.)
- výška brady by měla být pětina celkové výšky obličeje (obr. 11.)
- vzdálenost od středu oka k hranici obočí by měla být desetina obličeje (obr. 12.)
- výška viditelné části oční koule by měla být jedna čtrnáctina výšky obličeje (obr. 12.)
- celková plocha nosu by neměla přesahovat 5 % celkové plochy obličeje (obr. 13.)
- ideální ústa by měla tvořit polovinu šířky obličeje měřené v úrovni úst (obr. 14.)


Cunninghamova zjištění tak vytváří obraz ideálního ženského obličeje, jehož podstatou jsou velké oči, malý nos a brada, vysoké lícní kosti a velký rovnoramenný úsměv. Podobně i hezký mužský obličej bude mít tyto atributy s jistými modifikacemi, a to husté obočí a výrazná brada (Cunningham 1986).




Obr. 10.




Obr. 11.



Obr. 12.



Obr. 13.



Obr. 14.

Obr. 10. – 14. Ideální proporce obličeje.

**Úkol č. 1: Změřte základní rozměry lidské hlavy a spočítejte jednotlivé indexy**

**Záznamový list**

Jméno a příjmení probanda: .....

Věk: .....

Pohlaví:.....

**Základní rozměry lidské hlavy**

Délka hlavy .....

Šířka hlavy:.....

**Obvodové rozměry**

Obvod hlavy:.....

**Šířkové a délkové rozměry**

Šířka úhlu dolní čelisti:.....

Šířka obličeje:.....



Šířka nosu:.....

Výška nosu:.....

Morfologická výška obličeje.....


**Indexy a relativní rozměry**

- délkošířkový index hlavy.....
- šířkový index obličeje.....
- výškošířkový index nosu.....


**Základní rozměry klinické antropometrie na postkraniálním skeletu****a) Základní somatické rozměry**

**Tělesná výška** – je vertikální vzdálenost nejvyššího bodu na temeni hlavy (vertex) od podložky. Předepsaný postoj - nutný je vzprímený postoj u stěny, přičemž hlava probanda musí být v takové úrovni jako by se díval do dálky. Měřený jedinec musí být bez bot. Měří se s přesností na 0,5 cm. Pomůcky - antropometr, posuvné měřidlo připevněné ke stěně nebo pásový metr připevněný na stěnu.

**Tělesná hmotnost** – pro zjištění hmotnosti by měl být proband ve spodním prádle. Pomůcky – páková váha, Měří se s přesností měření 0,1 kg

**b) Obvodové rozměry – měří se pásovým měřidlem**

**Obvod hrudníku** – měříme tak, že pásová míra probíhá vzadu těsně pod dolními úhly lopatky, vpředu těsně nad prsními bradavkami. Přesnost měření - 0,1 cm. Pro doplnění se měří také obvody hrudníku v exspiriu a v inspiriu.



**Obvod břicha** – měří se tak, že pásová míra probíhá vodorovně ve výši pupku

**Obvod gluteální** – měří se ve výši nejmohutněji vyvinutého hýžďového svalstva

**Obvod paže** – měří se uprostřed paže mezi loktem a nadpažkem, paže volně visí


**Obvod paže kontrahované** – paže je pokrčená (přibližně 90 stupňů), flexory i extenzory paže jsou v maximálním napětí, měří se v místě největšího vyklenutí svalstva

**Obvod předloktí** – měříme v místě nejvíce vyvinutých svalů předloktí (asi 1/4 délky pod loketním kloubem)

**Obvod stehna gluteální** – měříme při mírném rozkročení probanda těsně pod rýhou gluteálního svalstva


**Obvod stehna střední** – měříme uprostřed délky stehenní kosti

**Obvod lýtku** – měříme v místě největšího vyklenutí lýtkového svalu

**c) Šířkové a délkové rozměry**

**Šířka biakromiální** (šířka ramen) je vzdálenost mezi nadpažky (acromion). Jako měřidlo používáme torakometr nebo pelvimetru. Přesnost měření - 0,5 cm.

**Šířka bikristální** (šířka pánve) je vzdálenost mezi pravým a levým nejvzdálenějším bodem horní hrany kosti kyčelní. Měříme stejnými měřidly, se stejnou přesností.




## Praktická cvičení č. 5+6

Jméno:

*Rozpětí paží* – je vzdálenost koncových bodů prostředních prstů na pravé a levé ruce při upažení.

Probandi stojí zády u stěny, upaží s dotykem hřbetů rukou na stěně, prostřední prst jedné ruky se opírá o pevnou hranu (nulový bod), druhá ruka je položena na papírové míře na stěně. Odečítáme s přesností 0,1 cm.

*Výška v sedě* – je to vzdálenost nejvyššího bodu na temeni hlavy od rovné podložky, na které proband vzpřímeně sedí.



*Délka dolních končetin* – je rozdíl mezi tělesnou výškou probanda a jeho výškou v sedě.

## Výpočet indexů:

Absolutní rozměry nedávají dostatečnou představu o příčinách tvarových a jiných odlišností na lidských tělech. Proto se v antropologii využívá antropologických ukazatelů neboli indexů.

**Antropologický index se nejčastěji vypočítává poměrem (dělením) dvou rozměrů**

**většinou vynásobeným 100.** Indexy jsou počítány až po skončení vlastního měření. Některé antroposkopické ukazatele, jako je např. barva oční duhovky, se nepočítají, ale porovnávají se standardními tabulkami.

## Indexy a relativní rozměry

- Index biakromiální šířky k výšce těla
- Index bikristální šířky k výšce těla
- Index obvodu hrudníku k výšce těla
- Index obvodu paže k výšce těla
- Index obvodu břicha k výšce těla
- Index obvodu gluteálního k výšce těla
- Index obvodu stehna k výšce těla
- Index obvodu lýtka k výšce těla
- Index akromiokristální: (šířka bikristální \* 100): šířka biakromiální
- Index tělesné plnosti (Rohrer): (hmotnost v gramech \* 100): (výška v cm)<sup>3</sup>

*optimální hodnoty pro muže jsou mezi 1,2 až 1,4 a pro ženy 1,25 až 1,50*

Indexy tělesných segmentů:

**A) Délka trupu** - poměr (rozdílu výšky vsedě a výšky židle) s výškou postavy - vynásobeno 100.

Tedy:  $\frac{\text{Výška vsedě od země po vrchol hlavy} - \text{výška židle po sedák}}{\text{Výška postavy}} \times 100$

Kategorie:

	Muži	Ženy
<b>Krátký trup</b>	x - 51,0	X - 52,5
<b>Střední trup</b>	51,1 - 52,0	52,6 - 53,0
<b>Dlouhý trup</b>	52,1 - x	53,1 - x

**B) Relativní délka horních končetin** – poměr mezi výškou nadpažku od podložky zmenšenou o výšku konce prostředníčku (znovu od podložky) a celkovou tělesnou výškou a vynásobíme 100. Jedná se o poměr absolutní délky horní končetiny a celkové výšky probanda vyjádřený v procentech.

Kategorie:

	Muži	Ženy
<b>Krátké horní končetiny</b>	x - 44,0	x - 43,5
<b>Střední horní končetiny</b>	44,1 - 44,5	43,6 - 44,0
<b>Dlouhé horní končetiny</b>	44,6 - x	44,1 - x

**C) Délka celé dolní končetiny k výšce těla** - výška předního kyčelního trnu (*iliospinale*) od země

Tedy:  $\frac{\text{výška předního kyčelního trnu}}{\text{výška těla}} \times 100$

Pro různou tělesnou výšku dospělých osob se doporučuje odečít od rozměru:

U výšky těla	do 130 cm:	15 mm
U výšky těla	131 do 150 cm:	20 mm
U výšky těla	151 do 165 cm:	30 mm
U výšky těla	166 do 175 cm:	40 mm
U výšky těla	nad 176 cm:	50 mm

Kategorie:

	Muži	Ženy
<b>Krátké dolní končetiny</b>	x - 53,5	x - 53,9
<b>Střední dolní končetiny</b>	53,6 - 54,0	54,0 - 54,5
<b>Dlouhé dolní končetiny</b>	54,1 - x	54,6 - x

**D) Relativní šířka ramen** - poměr mezi šírkou ramen (biakromální šířka) a celkovou tělesnou výškou a vynásobené 100.

Kategorie:

	<b>Muži</b>	<b>Ženy</b>
<b>Úzká ramena</b>	x - 22,0	x - 21,5
<b>Střední ramena</b>	22,1 - 23,0	21,6 - 22,5
<b>Široká ramena</b>	23,1 - x	22,6 - x

**E) Relativní šířka pánev** - poměr absolutní šířky páneve (bikristální šířka) k celkové tělesné výšce vynásobené 100.

Kategorie:

	<b>Muži</b>	<b>Ženy</b>
<b>Úzká pánev</b>	x - 16,5	x - 17,5
<b>Střední pánev</b>	16,6 - 17,5	17,6 - 18,5
<b>Široká pánev</b>	17,6 - x	18,6 - x

Výško-váhové indexy pro určování množství tuku v těle:

**A) Modifikovaný Brocův index:** zjišťuje, kolik kg hmotnosti přebývá nad krajní hranicí doporučené váhy (kladná čísla), resp. kolik kg do této hranice chybí (záporná čísla).

**Výpočet:**

**Modifikovaný Brocův index =  $m - (v - 100)$**

$m$  ..... hmotnost (kg)

$v$  ..... výška (cm)

**B) Body-Mass Index (BMI):** poměr mezi tělesnou hmotností v kg a druhou mocninou výšky v m.

**Výpočet:**

**BMI =  $m / v^2$**

$m$  ..... hmotnost (kg)

$v^2$  ..... druhá mocnina tělesné výšky (m)

Pomocí BMI můžeme stanovit doporučené rozmezí váhy na základě výšky, pohlaví a doporučeného rozmezí BMI. U žen je doporučení rozmezí v intervalu 17,5 - 23,9, u mužů je v intervalu 18,5 - 24,9.

**Doporučené kategorie:**

<b>Kategorie</b>	<b>Muži BMI</b>	<b>Ženy BMI</b>
Velká podváha	x - 18,4	x - 17,4
Podváha	18,5 - 19,9	17,5 - 18,4

Praktická cvičení č. 5+6

Jméno:

Normální	20,0 - 24,9	18,5 - 23,9
Nadváha	25,0 - 29,9	24,0 - 28,9
Obezita 1. stupně	30,0 - 34,9	29,0 - 33,9
Obezita 2. stupně	35,0 - 39,9	34,0 - 38,9
Obezita 3. stupně	40,0 - x	39,0 - x

Doporučený váhový interval:

$$m^d = [ \text{BMI 1} * v^2 ] - [ \text{BMI 2} * v^2 ]$$

$m^d$  .....doporučený váhový interval (kg)

BMI 1.....dolní hranice intervalu kategorie BMI, BMI 1 = 18,5 (ženy), 20,0 (muži)

BMI 2.....horní hranice intervalu kategorie BMI, BMI 2 = 23,9 (ženy), 24,9 (muži)

$v^2$ .....druhá mocnina výšky (m)

**C) Waist-Hip Ratio (WHR):** nejužívanějším ukazatelem distribuce tuku.

Poměr obvodu pasu v cm a obvodu gluteálního, rovněž v cm. Tento index je vhodné doplňovat s BMI.

Výpočet:

$$\text{WHR} = \text{obvod pasu (cm)} / \text{obvod boků (cm)}$$

Kategorie	Muži WHR	Ženy WHR
Spíše periferní	x - 0,84	x - 0,74
Vyrovnанá	0,85 - 0,89	0,75 - 0,79
Spíše centrální	0,90 - 0,94	0,80 - 0,84
Centrální (riziková)	0,95 - x	0,85 - x

**Úkol č. 2: Změřte základní somatické rozměry lidského těla a spočítejte jednotlivé indexy**

**Záznamový list**

Jméno a příjmení probanda: .....

Věk: .....

Pohlaví:.....

**Základní rozměry lidského těla**

Tělesná výška. ....

Tělesná váha:.....

**Obvodové rozměry**

Obvod hrudníku:.....

Obvod břicha: .....

Obvod gluteální:.....

Obvod paže:.....

Obvod paže kontrahované :.....

Obvod předloktí:.....

Obvod stehna gluteální:.....

Obvod stehna střední:.....

Obvod lýtka:.....

**Šířkové a délkové rozměry**

Šířka biakromiální (šířka ramen):.....

Šířka bikristální (šířka pánve):.....

Rozpětí paží:.....

Výška v sedě:.....

Délka dolních končetin:.....

**Indexy a relativní rozměry**

- Index biakromiální šířky k výšce těla.....
- Index bikristální šířky k výšce těla.....
- Index obvodu hrudníku k výšce těla.....
- Index obvodu paže k výšce těla.....
- Index obvodu břicha k výšce těla.....
- Index obvodu gluteálního k výšce těla.....
- Index obvodu stehna k výšce těla.....
- Index obvodu lýtka k výšce těla.....
- Index akromiokristální: (šířka bikristální \* 100): šířka biakromiální .....
- Index tělesné plnosti (Rohrer): .....

**Indexy tělesných segmentů:**

A) Délka trupu .....

Kategorie: .....

B) Relativní délka horních končetin:.....

Kategorie:.....

C) Relativní délka dolních končetin:.....

Kategorie:.....

D) Relativní šířka:.....

Kategorie:.....

E) Relativní šířka pánve:.....

Kategorie:.....

**Výško-váhové indexy pro určování množství tuku v těle:**

A) Modifikovaný Brocův index:.....

B) Body-Mass Index (BMI):.....

Kategorie:.....

Praktická cvičení č. 5+6

Jméno:

Doporučený váhový interval:.....

C) Waist-Hip Ratio (WHR):.....

Kategorie: .....

### **Úkol č. 3**

#### **Metody odhadu tělesného složení**

Používá se pro zjištění, jakou hmotnost v našem těle zabírají komponenty jako kosti, svalovina, tuk nebo voda.

Postup při měření některých rozměrů:

*Kožní řasa nad tricepsem* – měří se tloušťka kožní řasy na pravé paži vzadu uprostřed mezi loktem a nadpažkem

*Kožní řasa pod lopatkou* (subscapulární) – měří se pod dolním úhlem lopatky, vytažená řasa směřuje šikmo dolů

*Kožní řasa suprailiakální* – měří se asi 3 cm nad pravým trnem kyčelním

*Kožní řasa na lýtce* – měří se v místě největšího vyklenutí trojhlavého lýtkového svalu

#### **Kaliperací metoda:**

Je založena na měření 10 kožních řas a jejich následné logaritmizace. Tím zjistíme procentní podíl tuku v těle.

Kožní řasy nutné k výpočtu jsou:

na tváři.....

na břiše.....

na bradě.....

na hrudníku pod prsním svalem.....

na hrudníku nad prsním svalem.....

na boku (nad kyčelní kostí).....

na tricepsu paže.....

na stehně.....

na zádech (pod lopatkou).....

na lýtce.....

**Výpočet:**

Pro muže ( 17 - 45 let):      **% tuku = 28,96 \* log x - 41,27**

Pro ženy ( 17 - 45 let ):      **% tuku = 35,572 \* log x - 61,25**

x..... součet 10 kožních řas

**Kategorie:**

x - 21%	Nízký
21 - 27%	Normální
27% - x	Vysoký

Diskuze a závěr: