

přednáška 07:
některá význačná
diskrétní i spojitá
rozdělení psti

Literatura:

Fajmon, Růžičková: Matematika 3, kapitoly 11-12.

Otipka, Šmajstrla: Pravděpodobnost a statistika – online text z Ostravy na adrese home1.vsb.cz/~oti73/cdpast1/

Kapitola: **Rozdělení p-sti DNV (diskrétní náhodná veličina)**
Rozdělení p-sti SNV (spojitá náhodná veličina)

Při matematickém popisu jakékoli náhodné veličiny zhruba potřebujeme projít šest základních otázek

i) $X = \dots$ co daná veličina měří

○ ii) $X \in \{\dots\}$... jakých hodnot veličina nabývá
(podotázka – je to veličina diskrétní nebo spojitá?)

iii) $P(X \in (a; b]) = F(b) - F(a) = \sum_{k \in (a; b]} p(k) \dots$ pro diskrétní velič.

$(p(k)$ je pstní funkce)

○ $= \int_a^b f(x) dx \dots$ pro spojitou veličinu

$(f(x)$ je hustota psti)

+ nakreslete graf pstní funkce nebo hustoty

iv) Kumulativní pstí funkce = distribuční funkce $F(x)$:

$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p(k) \dots$ pro diskrétní velič.

$(p(k)$ je pstní funkce)

○

$= \int_{-\infty}^x f(t) dt \dots$ pro spojitou veličinu

$(f(t)$ je hustota psti)

+ nakreslete graf distribuční funkce

EX = expected value of X

v) Střední hodnota veličiny X:

$$EX = \sum_{k \in X(\Omega)} k \cdot p(k) \dots \text{pro diskrétní velič.}$$

○

$(p(k))$ je pstní funkce)

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \dots \text{pro spojitou veličinu}$$

$(f(t))$ je hustota psti)

DX = dispersion of X

vi) Rozptyl veličiny X (definice a způsob výpočtu):

$$DX = E (X - EX)^2 = \left(\sum_{k \in X(\Omega)} k^2 \cdot p(k) \right) - (EX)^2 \dots \text{ pro diskř. velič.}$$

(p(k) je psní funkce)

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - (EX)^2 \dots \text{ pro spoj. velič.}$$

(f(t) je hustota psí)

Podívejme se na pět základních diskrétních rozdělení psti, která jsou tak důležitá, že mají svůj vlastní název:

D1: diskrétní rovnoměrné rozdělení psti
(discrete uniform distribution)

i) $X =$ nějaká z konečně mnoha hodnot, které všechny mají stejnou šanci nastat

ii) $X \in \{1, 2, \dots, n\}$

D1: diskrétní rovnoměrné rozdělení psti (discrete uniform distribution)

$$\text{iii) } P(X \in (a; b]) = \sum_{k \in (a; b]} \frac{1}{n}$$

- o vlastně se jedná o model klasické psti, kde Ω je konečná množina (reálných) čísel

$$(p(k) = \frac{1}{n} \text{ pro každé } k)$$

Obrázek – popřípadě na tabuli

D1: diskrétní rovnoměrné rozdělení psti (discrete uniform distribution)

iv) Kumulativní pští funkce = distribuční funkce $F(x)$:

$$F(x) = \sum_{k \leq x} \frac{1}{n}$$



distribuční funkce – viz obr na tabuli:

(kumulativní funkce s pravidelnou výškou všech schodů)

D1: diskrétní rovnoměrné rozdělení psti (discrete uniform distribution)

v) Střední hodnota veličiny X:

$$\circ EX = \sum_{k \in \Omega} k \cdot \frac{1}{n} = \dots = \frac{n+1}{2}$$

vi) Rozptyl veličiny X:

$$DX = \left(\sum_{k \in X(\Omega)} k^2 \cdot \frac{1}{n} \right) - \left(\frac{n+1}{2} \right)^2 = \dots = \frac{n^2-1}{12}$$

Příklad D1 = diskrétního rovnoměrného rozdělení psti:

X = co padne na kostce

Značíme zhruba: $X \sim Ro(1, 2, \dots, n)$

D2: alternativní rozdělení psti: (*alternative distribution*)

- i) X = odpověď na otázku, která nabývá pouze dvou hodnot (odpovědi se navzájem vylučují)
(či výsledek experimentu, který nabývá pouze dvou výsledků: 0 při „neúspěchu“, 1 při „úspěchu“ ... tyto výsledky se navzájem vylučují)

- ii) $X \in \{0,1\}$

D2: alternativní rozdělení psti: (*alternative distribution*)

iii) Pstní funkce: $p(1) = p$
 $p(0) = 1 - p$

Obrázek – popřípadě na tabuli

D2: alternativní rozdělení psti: (*alternative distribution*)

iv) Kumulativní pstí funkce = distribuční funkce $F(x)$:

Má pouze dva schody obecně různých výšek $(1-p)$ a p

viz obr na tabuli

D2: alternativní rozdělení psti: (alternative distribution)

v) Střední hodnota veličiny X:

$$EX = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

○

vi) Rozptyl veličiny X:

$$DX = (0^2 \cdot (1 - p) + 1^2 \cdot p) - p^2 = p \cdot (1 - p)$$

Příklady D2 = alternativního rozdělení psti:

- a) X = počet šestek, které padnou při jednom hodu kostkou (0 nebo 1)
- b) X = počet voličů, kteří budou volit kandidáta AB na prezidenta, pokud se ptáme jen jednoho voliče (tj. nabývá pouze hodnot 0 nebo 1)
- c) X = počet „úspěchů“ při jednom opakování experimentu (nabývá pouze hodnoty 0 = neúspěch, 1 = úspěch)

Značíme zhruba: $X \sim \text{Alt}(p)$

D3: binomické rozdělení psti: (binomial distribution)

i) X = počet „úspěchů“ při N nezávislých opakováních experimentu, který má dva navz. se vylučující výsledky „úspěch“ nastávající s pstí p a „neúspěch“ nastávající s pstí $(1-p)$

(nezávislé opakování znamená, že výskyt úspěchu při předchozím opakování experimentu nemá vliv na to, zda při dalších opakováních nastane úspěch či neúspěch)

ii) $X \in \{0, 1, 2, 3, \dots, N\}$

D3: binomické rozdělení psti: (binomial distribution)

iii) Pstní funkce: $p(k) = \binom{N}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{N-k}$

pro $k = 0, 1, 2, \dots, N$



Obrázek – popřípadě na tabuli nebo v jazyku R – viz příklad,
co bude následovat

D3: binomické rozdělení psti: (*binomial distribution*)

iv) Kumulativní pstí funkce = distribuční funkce $F(x)$:

Má schody různých výšek

viz obr na tabuli nebo obdelníčkový graf BARPLOT v jazyku R

D3: binomické rozdělení psti: (binomial distribution)

v) Střední hodnota veličiny X:

$$EX = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1) + \dots + N \cdot p(N) = N \cdot p$$

○

vi) Rozptyl veličiny X:

$$DX = (0^2 \cdot p(0) + 1^2 \cdot p(1) + \dots + N^2 \cdot p(N)) - N^2 p^2 = N \cdot p \cdot (1 - p)$$

Příklady D3 = binomického rozdělení psti:

- a) $X =$ počet šestek z N hodů kostkou ... př 11.1- str. 169
- b) $X =$ počet voličů, kteří budou volit kandidáta AB na prezidenta, pokud se ptáme N nezávislých (náhodně vybraných) voličů ... př.11.2.str. 170
- c) $X =$ počet „úspěchů“ při N nezávislých opakováních experimentu

Značíme zhruba: $X \sim Bi(N,p)$

Bi (N,p) v jazyku R:

X = počet šestek z N hodů kostkou ... př 11.1- str. 169

- `px <- dbinom(0:4,4,1/6) # spocte psti Bi (N=4, p=1/6)`
- `plot(px,pch=16) # nakresli pstni funkci, "pch=16" jsou tucne tecky`

Popis osy x je posunutý, nevím jak to spravit

- `Fx <- pbinom(0:4,4,1/6) # spocte schody distribucni funkce (kumul.fce)`
- `barplot(Fx, col=6:7) # nakresli distrib fci F – horni strany tech obdelnicku`
col=6:7 ... pouze meni barvu obdelnicku ... strida barvy 6 a 7

Bi (N,p) v jazyku R: kvantily a generování hodnot

- `qbinom(0.95, 4, 1/6)` # spočte 0.95-kvantil hodnot rozd Bi (N=4, p=1/6)
- `genbi <- rbinom(1000,4,1/6)` # do vektoru `genbi` nahodne vygeneruje 1000 hodnot rozdeleni Bi(4, 1/6) ... `rbinom` = random binom
- `table(genbi)` # spocitaji se cetnosti nahodne gener hodnot velic X

D4: geometrické rozdělení p stí: (geometric distribution)

- i) $X =$ počet „úspěchů“ před prvním neúspěchem při nezávislých opakováních experimentu, který má dva navz. se vylučující výsledky „úspěch“ nastávající s p stí p a „neúspěch“ nastávající s p stí $(1-p)$

- ii) $X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ teoreticky až do nekonečna

D4: geometrické rozdělení psti: (geometric distribution)

iii) Pstní funkce: $p(k) = p^k \cdot (1 - p)$

pro $k = 0, 1, 2, \dots$

(tyto psti tvoří geometrickou posloupnost, odtud název
rozdělení)

Obrázek – popřípadě na tabuli nebo v jazyku R – viz příklad,
co bude následovat

D4: geometrické rozdělení psti: (geometric distribution)

iv) Kumulativní pstí funkce = distribuční funkce $F(x)$:

Má schody různých výšek, schodů je nekonečně mnoho, ale nesměřují až „do nebe“, nýbrž jsou stále menší a schodiště stoupá pouze k hodnotě 1

viz obr na tabuli nebo obdelníčkový graf BARPLOT v jazyku R

D4: geometrické rozdělení psti: (geometric distribution)

v) Střední hodnota veličiny X:

$$EX = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1) + \dots = \frac{p}{1-p}$$

o (výpočet integrací řady člen po členu ... podobné řešenímu př. 9.12 v kapitole 9)

vi) Rozptyl veličiny X:

$$DX = (0^2 \cdot p(0) + 1^2 \cdot p(1) + \dots) - \left(\frac{p}{1-p}\right)^2 = \frac{p}{(1-p)^2}$$

Příklady D4 = geometrického rozdělení psti:

- a) X = počet hodů kostkou před prvním padnutím šestky
- b) X = počet dnů bezporuchového provozu před první poruchou linky (pst poruchy linky v každém dni je stále stejná a nezávislá na předchozích dnech ... podobný př. 9.12 z kapitoly 9, ale s tím rozdílem, že hodnoty jsou posunuty o jednu jednotku, protože veličina X tam do počtu dnů zahrnuje i den, ve kterém nastala první porucha

Značíme zhruba: $X \sim \text{Geom}(p)$

Geom(p) v jazyku R: pozor, ve vzorcích $p=5/6$, ale R potřebuje $p=1/6$ (tj. R užíva spíše $1-p$)

X = počet hodů kostkou před prvním padnutím šestky

- `x <- c(0:30)` # je def pro nekonecne mnoho x, ale pocitac se musi omezit na konecne mnoho
- `px <- dgeom(x, 1/6)` # spocte psti Geom ($p=1/6$) pro hodnoty z vekt x
- `plot(px, pch=16)` # nakresli pstni funkci, "pch=16" jsou tucne tecky

Popis osy x je posunutý, nevím jak to spravit

- `Fx <- pgeom(x, 1/6)` # spocte schody distribucni funkce (kumul.fce)
- `barplot(Fx, col=6:7)` # nakresli distrib fci F – horni strany tech obdelnicku
`col=6:7` ... pouze meni barvu obdelnicku ... strida barvy 6 a 7

Geom(p) v jazyku R: kvantily a generování hodnot

- `qgeom(0.95, 1/6)` # spočte 0.95-kvantil hodnot rozd Geom ($p=1/6$)
- `gengeom <- rgeom(1000, 1/6)` # do vektoru `gengeom` nahodne vygeneruje 1000 hodnot rozdeleni Geom($1/6$) ... `rgeom` = random geom
- `table(gengeom)` # spocitaji se cetnosti nahodne gener hodnot velic X

D5: Poissonovo rozdělení psti: (Poisson distribution)

- i) X = počet výskytů jisté nepravidelné „náhodné události“ (příchod zákazníka do fronty v supermarketu, narození dítěte v jisté porodnici, apod.) za jednotku času; přičemž λ = průměrný počet těchto výskytů za jednotku času
- Předpoklady modelu: a) zdroj událostí je dosti velký (tisíce a víc)
b) Následující výskyt události je nezávislý na předchozím výskytu
c) Počet událostí v intervalu $(t; t+h)$ nezávisí na počtu výskytů před okamžikem t (tzv. forgetfulness property = zapomnětlivost)
- ii) $X \in \{0,1,2,3, \dots\}$ teoreticky až do nekonečna

D5: Poissonovo rozdělení psti: (Poisson distribution)

iii) Pstní funkce: $p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$

pro $k = 0, 1, 2, \dots$

o Přesné odvození viz kap. 12, str. 188-190

Obrázek – popřípadě na tabuli nebo v jazyku R – viz příklad,
co bude následovat

D5: Poissonovo rozdělení psti: (Poisson distribution)

iv) Kumulativní pstí funkce = distribuční funkce $F(x)$:

Má schody různých výšek, schodů je nekonečně mnoho, ale nesměřují až „do nebe“, nýbrž jsou stále menší a schodiště stoupá pouze k hodnotě 1

viz obr na tabuli nebo obdelníčkový graf BARPLOT v jazyku R

D5: Poissonovo rozdělení psti: (Poisson distribution)

v) Střední hodnota veličiny X :

$$EX = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1) + \dots = \lambda$$

○ (s využitím rozvoje funkce e^x v Taylorovu řadu)

vi) Rozptyl veličiny X :

$$DX = (0^2 \cdot p(0) + 1^2 \cdot p(1) + \dots) - \lambda^2 = \lambda$$

Příklady D5 = Poissonova rozdělení psti:

- a) X = počet návštěvníků restaurace za jednotku času
- b) X = počet narozených dětí v jisté porodnici za jednotku času
- c) X = počet průjezdů auta jistým místem na silnici za jednotku času

Značíme zhruba: $X \sim Po(\lambda)$

Po(λ) v jazyku R:

X = počet návštěvníků restaurace za jednotku času

➤ `x <- c(0:50)` # je def pro nekonecne mnoho x, ale pocitac se musi omezit na konecne mnoho

➤ `px <- dpois(x,20)` # spocte psti Po($\lambda=20$) pro hodnoty z vekt x

➤ `plot(px,pch=16)` # nakresli pstni funkci, "pch=16" jsou tucne tecky

○ *Popis osy x je posunutý, nevím jak to spravit*

➤ `Fx <- ppois(x,20)` # spocte schody distribucni funkce (kumul.fce)

➤ `barplot(Fx, col=6:7)` # nakresli distrib fci F – horni strany tech obdelnicku
col=6:7 ... pouze meni barvu obdelnicku ... strida barvy 6 a 7

Po(λ) v jazyku R: kvantily a generování hodnot

- `qpois(0.95,20)` # spočte 0.95-kvantil hodnot rozd $Po(\lambda=20)$
- `genpois <- rpois(1000,20)` # do vektoru `genpois` nahodne vygeneruje 1000 hodnot rozdeleni $Po(\lambda=20)$ `rpois` = random pois
-
- `table(genpois)` # spočitaji se četnosti nahodne gener hodnot velic X

Rekapitulace otázek:

19: diskrétní rovnoměrné rozdělení psti

20: Alternativni rozdělení psti

21: Binomické rozdělení psti

22: geometrické rozdělení psti

23: Poissonovo rozdělení psti

Nyní se podívejme na tři spojitá rozdělení psti

S1: Exponenciální rozdělení psti (exponential distribution)

- i) X = doba mezi dvěma následnými výskyty jisté nepravidelně se vyskytující „náhodné události“

(příchod zákazníka do fronty v supermarketu, narození dítěte v jisté porodnici, apod.); přičemž λ = průměrný počet těchto výskytů za jednotku času

Tatáž situace jako u Poissonova rozd, ale měříme jinou veličinu

S1: Exponenciální rozdělení psti (exponential distribution)

Předpoklady modelu: a) zdroj událostí je dosti velký (tisíce a víc)
b) Následující výskyt události je nezávislý na předchozím výskytu
c) Počet událostí v intervalu $(t; t+h)$ nezávisí na počtu výskytů před okamžikem t (tzv. forgetfulness property = zapomnětlivost)

ii) $X \in R^+$ (teoreticky jakékoli kladné reálné číslo)

S1: Exponenciální rozdělení psti (exponential distribution)

$$\text{iii) } P(X \in (a; b]) = \int_a^b f(x) dx$$

kde f je hustota psti daná vzorcem

$$\circ f(x) = 0 \dots x < 0$$

$$\lambda \cdot e^{-\lambda x} \dots x \geq 0$$

Přesné odvození viz kap. 12, str.186-188

Obrázek – popřípadě na tabuli nebo za chvíli v jazyku R

S1: Exponenciální rozdělení psti (exponential distribution)

iv) Kumulativní pští funkce = distribuční funkce $F(x)$:

$$F(x) = 0 \dots \dots \dots x < 0$$

- $1 - e^{-\lambda x} \dots x \geq 0$

distribuční funkce – viz obr na tabuli:

S1: Exponenciální rozdělení psti (exponential distribution)

v) Střední hodnota veličiny X:

$$\circ EX = \int_{-\infty}^0 0 \cdot f(x) dx + \int_0^{\infty} x \cdot f(x) dx = \frac{1}{\lambda}$$

vi) Rozptyl veličiny X:

$$DX = \int_{-\infty}^0 0^2 \cdot f(x) dx + \int_0^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx - (EX)^2 = \dots = \frac{1}{\lambda^2}$$

Příklad S1 = exponenciálního rozdělení psti:

- a) X = doba mezi dvěma následnými příchody zákazníků do restaurace
- b) X = doba mezi dvěma narozeními dítěte v jisté porodnici
- c) X = doba mezi dvěma následnými průjezdy aut jistým místem na silnici

Značíme zhruba: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

Exp (λ) v jazyku R:

X = doba mezi dvěma narozeními dítěte ... $\lambda = 4$ za den

- `x <- seq(0,3,0.01)` # vytvoří vektor hodnot od 0 do 3 s krokem 0.01
- # *teorie vede až do ∞ , ale počítač se musí omezit na konečné mnoho*
- `plot(x,4*exp(-4*x),type="l")` # nakreslí hustotu, spojí body v "l" = linku

- `plot(x,1-exp(-4*x), type="l")` # nakreslí distrib fci F

Exp(λ) v jazyku R: kvantily a generování hodnot

- `qexp(0.95, 4)` # spočte 0.95-kvantil hodnot rozd Exp ($\lambda = 4$)
- `genexp <- rexp(1000,4)` # do vektoru `genexp` nahodne vygeneruje 1000 hodnot rozdeleni Exp(4) `rexp` = random exponential
- `table(genexp)` # spocitaji se cetnosti nahodne gener hodnot velic X

S2: Rovnoměrné spojité rozdělení psti **(uniform distribution)**

i) X = veličina, kterou měříme v intervalu $(a;b)$... každá z hodnot intervalu má stejnou šanci být naměřena

ii) $X \in (a;b)$

S2: Rovnoměrné spojité rozdělení psti (uniform distribution)

$$\text{iii) } P(X \in (a;b]) = \int_a^b f(x) dx$$

kde f je hustota psti daná vzorcem

○ $f(x) = 0$... mimo interval $(a;b)$

$$\frac{1}{b-a} \dots x \in (a;b)$$

Obrázek – popřípadě na tabuli nebo za chvíli v jazyku R

S2: Rovnoměrné spojité rozdělení psti (uniform distribution)

iv) Kumulativní pští funkce = distribuční funkce $F(x)$:

$$F(x) = 0 \dots \dots \dots x \leq a$$

- $\frac{x-a}{b-a} \dots \dots x \in (a;b)$
- $1 \dots x \geq b$

S2: Rovnoměrné spojité rozdělení psti (uniform distribution)

v) Střední hodnota veličiny X:

$$\circ EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx \dots = \frac{a+b}{2}$$

vi) Rozptyl veličiny X:

$$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - (EX)^2 = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \dots \text{atd.}$$

Příklad S2= rovnoměrného rozdělení psti:

- a) X = doba příchodu člověka, o které nemáme žádnou informaci, pouze že přijde v daném intervalu
- b) X = množství zboží koupeného v daný den MĚŘENO NA VÁHU – a prodáváme nově v dané lokalitě, nemáme informaci o tom, kolik se prodá ... jakékoli prodané množství je stejně pravděpodobné

Značíme zhruba: $X \sim Ro(a;b)$

Ro(a;b) v jazyku R:

X = blíže neurčená doba dodání balíku v intervalu (8 hod; 16 hod)

- `x <- seq(8, 16, 0.01)` # ulozi do vektoru x dostatecne mnoho bodu z int
- `plot(x, x-x+1/8, type="l")` # oklamani R, aby nakreslil konstantni funkci 1/8
- `w <- seq(0, 8, 0.01); y <- seq(16, 24, 0.01)`
- # w, x, y ... intervaly pro ruzne vzorce distribucni funkce
- `plot(c(w, x, y), c(w-w+0, x/8-1, y-y+1))` # nakresli distrib fci F ... museli jsme ji spocitat a zadat vzorcem

Ro(a;b) v jazyku R: kvantily a generování hodnot

- `qunif(0.95, 8, 16)` # spočte 0.95-kvantil hodnot rozd $Ro(8:16)$
- `genunif <- runif(1000, 8, 16)` # do vektoru `genunif` nahodne vygeneruje 1000 hodnot rozdělení $Ro(8, 16)$ `runif` = random uniform

Pro vytvoření rozumných četností bychom museli z vektoru `genunif` vytvořit intervalové rozdělení četností – viz cvičení 2

S3: Normální rozdělení psti (normal distribution)

i) X = veličina, která vznikne jako součet řady různých vlivů (např. IQ, výška člověka, výška stromů v lese, teplota v daném místě, atd.)

○

ii) $X \in \mathbb{R}$

Značíme zhruba: $X \sim No(\mu; \sigma^2)$

S3: Normální rozdělení psti (normal distribution)

$$\text{iii) } P(X \in (a; b]) = \int_a^b f(x) dx$$

kde f je hustota psti daná vzorcem

○

$$f(x) = 0 \dots \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \dots \text{ pro jakékoli reálné } x$$

S3: Normální rozdělení psti (normal distribution)

iv) Kumulativní pstí funkce = distribuční funkce $F(x)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \dots \text{pro } x \text{ reálné}$$

Hodnoty tohoto integrálu nelze vyjádřit konečným vzorcem – musíme rozvinout v nekonečnou řadu, nebo integrovat

- numericky (= rozdělit obsah plochy na malé obdélníčky a spočítat přibližně součet jejich obsahů)

$$P(X \in (a; b]) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \dots \text{takto budeme počítat!!}$$

S3: Normální rozdělení psti (normal distribution)

v) Střední hodnota veličiny X:

$$\circ EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \dots = \mu$$

vi) Rozptyl veličiny X:

$$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - (EX)^2 = \dots = \sigma^2$$

$N(\mu; \sigma^2)$ v jazyku R:

X = výška stromu v lese se střední hodnotou 50 m a směro odchylkou 5 m

- `x <- seq(30, 70, 0.01)` # ulozi do vektoru x dostatecne mnoho bodu z intervalu (30; 70)
- `plot(x, dnorm(x, mean=50, sd=5))` # vykresleni hustoty f
- `plot(x, pnorm(x, mean=50, sd=5))` # nakresli distrib fci F

$No(\mu; \sigma^2)$ v jazyku R: kvantily a generování hodnot

- `qnorm(0.95, mean=50, sd=5)` # spočte 0.95-kvantil rozd $No(50; 16)$
- `gennorm <- rnorm(1000, mean=50, sd=5)` # do vektoru `gennorm` nahodně vygeneruje 1000 hodnot rozdělení $No(\mu=50; \sigma^2 = 25)$
- `rnorm` = random normal

Pro vytvoření rozumných četností bychom museli z vektoru `gennorm` vytvořit intervalové rozdělení četností – viz cvičení 2

Rekapitulace otázek:

24: exponenciální rozdělení psti

25: spojité rovnoměrné rozdělení psti

26: normální rozdělení psti ... tato otázka ještě není ukončena