

Cvičení z matematické analýzy 3

Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty

13. 3. 2019

Literatura

- Hájek, J., Dula, J.; *Cvičení z matematické analýzy - Obyčejné diferenciální rovnice*. MU Brno, 1998.
- Kuben, J.; *Obyčejné diferenciální rovnice*. UP Olomouc, 1995.

Opakování z minulého cvičení

- Při řešení homogenní lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty $ay'' + by' + cy = 0$ (*) postupujeme tak, že vyřešíme tzv. charakteristickou rovnici $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, tzn. najdeme kořeny λ_1, λ_2
 - jsou-li λ_1, λ_2 dva různé reálné kořeny, má obecné řešení homogenní rovnice (*) tvar $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
 - má-li charakteristická rovnice dvojnásobný kořen $\lambda_1 = \lambda_2$, má obecné řešení homogenní rovnice (*) tvar $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 x e^{\lambda_1 x}$
 - je-li $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$, má obecné řešení homogenní rovnice (*) tvar $y = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$

Řešení metodou variace konstant

Řešení metodou variace konstant

- Platí: $O\check{R}NLD R = O\check{R}HLD R + P\check{R}NLD R$
(O – obecné, Ř – řešení, N – nehomogenní, H – homogenní)

Řešení metodou variace konstant

- Platí: $O\check{R}NLD = O\check{R}HLD + P\check{R}NLD$
(O – obecné, Ř – řešení, N – nehomogenní, H – homogenní)
- Při řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty s pravou stranou $ay'' + by' + cy = f(x)$ postupujeme následovně:

Řešení metodou variace konstant

- Platí: $O\check{R}NLD R = O\check{R}HLD R + P\check{R}NLD R$
(O – obecné, \check{R} – řešení, N – nehomogenní, H – homogenní)
- Při řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty s pravou stranou $ay'' + by' + cy = f(x)$ postupujeme následovně:
 - 1 najdeme $O\check{R}HLD R: y = C_1 y_1 + C_2 y_2$

Řešení metodou variace konstant

- Platí: $O\check{R}NLD R = O\check{R}HLD R + P\check{R}NLD R$
(O – obecné, \check{R} – řešení, N – nehomogenní, H – homogenní)
- Při řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty s pravou stranou $ay'' + by' + cy = f(x)$ postupujeme následovně:
 - 1 najdeme $O\check{R}HLD R: y = C_1 y_1 + C_2 y_2$
 - 2 $P\check{R}NLD R$ hledejme ve tvaru $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$

Řešení metodou variace konstant

- Platí: $O\check{R}NLD R = O\check{R}HLD R + P\check{R}NLD R$
(O – obecné, \check{R} – řešení, N – nehomogenní, H – homogenní)
- Při řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty s pravou stranou $ay'' + by' + cy = f(x)$ postupujeme následovně:
 - 1 najdeme $O\check{R}HLD R: y = C_1 y_1 + C_2 y_2$
 - 2 $P\check{R}NLD R$ hledejme ve tvaru $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$
 - 3 vypočítáme $y'_p = C'_1(x)y_1 + C_1(x)y'_1 + C'_2(x)y_2 + C_2(x)y'_2$

Řešení metodou variace konstant

- Platí: OŘNLDR = OŘHLDRL + PŘNLDR
(O – obecné, Ř – řešení, N – nehomogenní, H – homogenní)
- Při řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty s pravou stranou $ay'' + by' + cy = f(x)$ postupujeme následovně:
 - 1 najdeme OŘHLDRL: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$
 - 2 PŘNLDR hledejme ve tvaru $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$
 - 3 vypočítáme $y'_p = C'_1(x)y_1 + C_1(x)y'_1 + C'_2(x)y_2 + C_2(x)y'_2$
 - 4 klademe $C'_1(x)y_1 + C'_2(x)y_2 = 0$
(abychom v y''_p nepracovali s druhou derivací neznámých funkcí)

LDR (2. řádu) s pravou stranou (nehomogenní)

Řešení metodou variace konstant

- Platí: OŘNLDR = OŘHLDRL + PŘNLDR
(O – obecné, Ř – řešení, N – nehomogenní, H – homogenní)
- Při řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty s pravou stranou $ay'' + by' + cy = f(x)$ postupujeme následovně:
 - 1 najdeme OŘHLDRL: $y = C_1y_1 + C_2y_2$
 - 2 PŘNLDR hledejme ve tvaru $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$
 - 3 vypočítáme $y'_p = C'_1(x)y_1 + C_1(x)y'_1 + C'_2(x)y_2 + C_2(x)y'_2$
 - 4 klademe $C'_1(x)y_1 + C'_2(x)y_2 = 0$
(abychom v y''_p nepracovali s druhou derivací neznámých funkcí)
 - 5 vypočítáme $y''_p = C'_1(x)y'_1 + C_1(x)y''_1 + C'_2(x)y'_2 + C_2(x)y''_2$

Řešení metodou variace konstant

- 6 dosadíme-li do původní rovnice y_p, y'_p a y''_p , dostaneme po úpravě
 $C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$

LDR (2. řádu) s pravou stranou (nehomogenní)

Řešení metodou variace konstant

- 6 dosadíme-li do původní rovnice y_p, y'_p a y''_p , dostaneme po úpravě
 $C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$
- 7 pro $C'_1(x), C'_2(x)$ dostáváme soustavu

$$C'_1(x)y_1 + C'_2(x)y_2 = 0$$

$$C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$$

Řešení metodou variace konstant

- 6 dosadíme-li do původní rovnice y_p, y'_p a y''_p , dostaneme po úpravě
 $C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$
- 7 pro $C'_1(x), C'_2(x)$ dostáváme soustavu

$$C'_1(x)y_1 + C'_2(x)y_2 = 0$$

$$C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$$

odkud určíme $C'_1(x)$ a $C'_2(x)$

Řešení metodou variace konstant

- 6 dosadíme-li do původní rovnice y_p, y'_p a y''_p , dostaneme po úpravě
 $C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$
- 7 pro $C'_1(x), C'_2(x)$ dostáváme soustavu

$$C'_1(x)y_1 + C'_2(x)y_2 = 0$$

$$C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$$

odkud určíme $C'_1(x)$ a $C'_2(x)$

- 8 vypočítáme $C_1(x)$ a $C_2(x)$
(volíme nulové integrační konstanty)

LDR (2. řádu) s pravou stranou (nehomogenní)

Řešení metodou variace konstant

6 dosadíme-li do původní rovnice y_p, y'_p a y''_p , dostaneme po úpravě
 $C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$

7 pro $C'_1(x), C'_2(x)$ dostáváme soustavu

$$C'_1(x)y_1 + C'_2(x)y_2 = 0$$

$$C'_1(x)y'_1 + C'_2(x)y'_2 = f(x)$$

odkud určíme $C'_1(x)$ a $C'_2(x)$

8 vypočítáme $C_1(x)$ a $C_2(x)$
(volíme nulové integrační konstanty)

9 OŘNLDR má tak tvar $y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2 + y_p$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

$$[y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|]$$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

- 1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ $[y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|]$
- 2 $y'' - 7y' + 12y = 5$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

$$[y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|]$$

2 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

$$[y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|]$$

2 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

3 $y'' - 2y' + y = x^{-2} e^x$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

$$[y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|]$$

2 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

3 $y'' - 2y' + y = x^{-2} e^x$

$$[y = C_1 e^x + C_2 x e^x - e^x \ln |x| - e^x]$$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

$$[y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|]$$

2 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

3 $y'' - 2y' + y = x^{-2} e^x$

$$[y = C_1 e^x + C_2 x e^x - e^x \ln |x| - e^x]$$

4 $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice

- 1 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ $[y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln |x|]$
- 2 $y'' - 7y' + 12y = 5$ $[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$
- 3 $y'' - 2y' + y = x^{-2} e^x$ $[y = C_1 e^x + C_2 x e^x - e^x \ln |x| - e^x]$
- 4 $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$ $[y = C_1 \sin x + C_2 \cos x - x \cos x + \sin x \ln |\sin x|]$

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- nejprve se budeme věnovat rovnicím s pravou stranou ve tvaru polynomu: $ay'' + by' + cy = P(x)$, kde $P(x)$ je polynom stupně n

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- nejprve se budeme věnovat rovnicím s pravou stranou ve tvaru polynomu: $ay'' + by' + cy = P(x)$, kde $P(x)$ je polynom stupně n
- 1 najdeme OŘHLDR: $y = C_1y_1 + C_2y_2$

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- nejprve se budeme věnovat rovnicím s pravou stranou ve tvaru polynomu: $ay'' + by' + cy = P(x)$, kde $P(x)$ je polynom stupně n

1 najdeme OŘHLDRL: $y = C_1y_1 + C_2y_2$

2 PŘNLDRL hledejme ve tvaru

- $y_p = Q(x)$, jestliže 0 není kořen charakteristické rovnice
- $y_p = x^k Q(x)$, je-li 0 k-násobný kořen charakteristické rovnice

kde $Q(x)$ je polynom stupně n , avšak s neznámými koeficienty
(např. $Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \dots$)

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

3 vypočítáme y'_p a y''_p

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- 3 vypočítáme y_p' a y_p''
- 4 dosadíme y_p , y_p' a y_p'' do původní rovnice a upravíme

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- 3 vypočítáme y'_p a y''_p
- 4 dosadíme y_p , y'_p a y''_p do původní rovnice a upravíme
- 5 pokud jsme počítali správně, vyjde rovnice s polynomy na obou stranách

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- 3 vypočítáme y'_p a y''_p
- 4 dosadíme y_p , y'_p a y''_p do původní rovnice a upravíme
- 5 pokud jsme počítali správně, vyjde rovnice s polynomy na obou stranách
- 6 víme, že dva polynomy se rovnají právě tehdy, když
 - jsou stejného stupně
 - koeficienty u stejných mocnin jsou stejné

Řešení metodou neznámých koeficientů

- Metoda vychází z předchozí metody, jen partikulární řešení volíme konkrétněji, s ohledem na pravou stranu.

Pravá strana ve tvaru polynomu

- 3 vypočítáme y'_p a y''_p
- 4 dosadíme y_p , y'_p a y''_p do původní rovnice a upravíme
- 5 pokud jsme počítali správně, vyjde rovnice s polynomy na obou stranách
- 6 víme, že dva polynomy se rovnají právě tehdy, když
 - jsou stejného stupně
 - koeficienty u stejných mocnin jsou stejné
- 7 OŘNLDR má tak tvar $y = C_1y_1 + C_2y_2 + Q(x)$
($Q(x)$ má již dopočítané konkrétní koeficienty)

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

$$[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$\left[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12} \right]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

$$\left[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7 \right]$$

3 $y'' + y' - 2y = 6x^2$

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$ $[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$ $[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$

3 $y'' + y' - 2y = 6x^2$ $[y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 3x^2 - 3x - \frac{9}{2}]$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

$$[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$$

3 $y'' + y' - 2y = 6x^2$

$$[y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 3x^2 - 3x - \frac{9}{2}]$$

4 $y'' + 3y' = 9x$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

$$[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$$

3 $y'' + y' - 2y = 6x^2$

$$[y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 3x^2 - 3x - \frac{9}{2}]$$

4 $y'' + 3y' = 9x$

$$[y = C_1 + C_2 e^{-3x} + \frac{3}{2}x^2 - x]$$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

$$[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$$

3 $y'' + y' - 2y = 6x^2$

$$[y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 3x^2 - 3x - \frac{9}{2}]$$

4 $y'' + 3y' = 9x$

$$[y = C_1 + C_2 e^{-3x} + \frac{3}{2}x^2 - x]$$

5 $y'' + 4y' - 5y = 1$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

$$[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$$

3 $y'' + y' - 2y = 6x^2$

$$[y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 3x^2 - 3x - \frac{9}{2}]$$

4 $y'' + 3y' = 9x$

$$[y = C_1 + C_2 e^{-3x} + \frac{3}{2}x^2 - x]$$

5 $y'' + 4y' - 5y = 1$

$$[y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^x - \frac{1}{5}]$$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

1 $y'' - 7y' + 12y = 5$

$$[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$$

2 $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$

$$[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$$

3 $y'' + y' - 2y = 6x^2$

$$[y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 3x^2 - 3x - \frac{9}{2}]$$

4 $y'' + 3y' = 9x$

$$[y = C_1 + C_2 e^{-3x} + \frac{3}{2}x^2 - x]$$

5 $y'' + 4y' - 5y = 1$

$$[y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^x - \frac{1}{5}]$$

6 $y'' + y = 2x^3 - x + 2$

Příklady

Určete obecné řešení diferenciální rovnice:

- [1] $y'' - 7y' + 12y = 5$ $[y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{5}{12}]$
- [2] $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$ $[y = C_1 e^{-2x} \cos x + C_2 e^{-2x} \sin x + x^2 - 8x + 7]$
- [3] $y'' + y' - 2y = 6x^2$ $[y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 3x^2 - 3x - \frac{9}{2}]$
- [4] $y'' + 3y' = 9x$ $[y = C_1 + C_2 e^{-3x} + \frac{3}{2}x^2 - x]$
- [5] $y'' + 4y' - 5y = 1$ $[y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^x - \frac{1}{5}]$
- [6] $y'' + y = 2x^3 - x + 2$ $[y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2x^3 - 13x + 2]$