

Pseudooligofrenie

Etiologie mentální retardace



Pseudooligofrenie

- Neboli tzv. **Zdánlivá mentální retardace**
- Ve skutečnosti se nejedná o MR, přestože projevy jsou stejné
- Dříve pojem **Sociální debilita**
- Způsobena vlivem **vnějšího prostředí** (sociální etiologie), nikoli poškozením CNS jako u pravé MR

Etiologie pseudooligofrenie

- Nedostatek podnětové stimulace dítěte
- Výchovné zanedbání
- Psychická deprivace
- Vliv sociokulturně znevýhodněného prostředí

Projevy pseudooligofrenie

- Intelligence snížená asi o 10 – 20 bodů
- **Hraniční pásmo mentální retardace**, mentální subnorma (IQ 70-90)
- Opožděný vývoj řeči
- Potíže v sociální adaptaci, myšlení, paměti, negativismus, infantilní projevy

Projevy pseudooligofrenie

- Potreba väčšej názornosti, problém ve zobecňovaní a abstraktných pojmech
- Osvojenie učiva trvá dôle a je mene efektívny
- Preference mechanické práce, motorika není porušena
- Při podnětné intervenci a měně prostředí se nemusí jednat o trvalý stav



ETIOLOGIE MENTÁLNÍ RETARDACE

- **prenatální**
- **perinatální**
- **postnatální**

PRENATÁLNÍ PŘÍČINY

- MR vznikla **před narozením** dítěte, v prenatálním období
- Infekce matky, špatná výživa v těhotenství, působení toxických látek nebo záření, úrazy matky

PERINATÁLNÍ PŘÍČINY

- MR vznikla v průběhu porodu dítěte a bezprostředně po něm
- hypoxie (nedostatek kyslíku),
protrahovaný porod, klešťový porod,
komplikované porody

POSTNATÁLNÍ PŘÍČINY

- Vznik **do 2 let věku** života dítěte
- Infekce novorozence, záněty mozku, úrazy, špatná výživa dítěte

Další vlivy na vznik MR:

- Dědičnost (hl. lehká MR)
- Chromozomální aberace