

## Anafylaktický šok

- Je nejtěžší formou.....s náhlými příznaky a možnými smrtelnými následky ve vrcholném stádiu šoku. Až 10% pacientů anafylaktický šok nepřežije. Tato reakce je spouštěna ..... pacienta při kontaktu a některým z následujících alergenů:
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....

Klinické syndromy anafylaktického šoku nastávají bezprostředně po kontaktu s alergenem, nebo nedlouho poté. Mezi symptomy anafylaxie patří:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## První pomoc

Postiženého uložíme do .....(nohy zvýšíme asi o 30cm) a můžeme snižovat tělesnou teplotu studenými obklady. V případě celkových potíží je nutné okamžitě použít autoinjektor Epipen s adrenalinem. Při nepřítomnosti okamžité celkové reakce lze aplikovat tabletu .....-nejlépe dithiaden. Při zhoršování stavu aplikujeme Epipen. Každý alergik s rizikem anafylaktického šoku by měl nosit..... s adrenalinovou injekcí.

## Alergická reakce

Alergik má dědičnou vlnu tvořit speciální protilátky – ..... (IgE), proti neškodným látkám. Organismus zdravého jedince si těchto látek ani nevšimne, imunitní systém je k nim lhostejný, ale u alergika zpravidla dochází.....

## Nejčastější alergen

- Pyly a spory plísní
- .....

- Živočišné jedy
- Léky
- .....

## Příznaky

Závisí na typu alergenu.

- Dušnost
- .....
- Ekzém
- Bolest hlavy
- .....
- .....

## První pomoc při alergické reakci

Nejvíce používanými léky jsou .....-látky omezující působení mediátorů alergické reakce. K nejsilnějším lékům na alergii patří kortikoidy, jejich podání však musí být cíleno na....., abychom se vyhnuli nežádoucím účinkům.

Při..... podáváme inhalační léky, které by měl alergik nosit u sebe.